589.4
F99
copy
Lib

QK321.3
.S6



* Some plant names published herein and which appear in Gray's Manual, 8th ed.

p. 16 Alopecurus aequalis = A. geniculatus (G 167)
aristulatus Torr. & T. 2 ed. (G 129)

FLORA

PETROPOLITANA.

Siſtens plantas in Gubernio Petropolitano ſponte creſcentes, tam eas quae olim in Flora Ingrica Kraſcheninnikovii a Gortero enumeratae ſunt, quam novas poſt annum 1764 hucusque a variis Botanicis Petropoli degentibus detectas, nunc vero generice ac ſpecifice deſcriptas cum additione variarum obſervationum, atque Ruſſica plantarum denominatione,

Curante

Med. Doct. Conſil. Aul. Colleg. Imper. Medici et Societat. Econom. Petropolit. Sodali, nec non Botan. ac Mat. Med. Profeſſore publ. ord.

Gregorio Sobolewskj.

Cum approbatione Collegii Imperialis Medici.

PETROPOLI.

Typis Collegii Imperialis Medici.

1799.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

+QK321.3
.S6

AUGUSTISSIMO AC POTENTISSIMO

ROSSORUM IMPERATORI

PAULO PRIMO

AUTOCRATORI MODERATISSIMO,

PIETATIS AC IUSTITIAE

OBSERVATORI TUTORIQUE

STRENUISSIMO, FELICISSIMO,

SCIENTIARUM ET ARTIUM

PROMOTORI MUNIFICENTISSIMO,

PATRIAE PATRI CLEMENTISSIMO

Floram hanc Petropolitanam

Summa cum devotione

D. D. D.

Subditissimus

Auctor.

JAN 17 1973

LECTORI BOTANOPHILO

S.

Opere praetium esse putamus paucis exponere hujus opusculi rationem. Clar. vir Stephanus Krascheninnikow quondam Botanices et Historiae naturalis Professor Petropolitanus, absoluto decem annorum per Sibiriam itinere ad Botanices provinciam Petropoli administrandam evectus ex professo totam Ingriam peragrans plantas obvias studiosissime examinavit, accurate descripsit, doctisque observationibus illustravit, easque ad methodum Royeni disposuit, atque codicem suum manuscriptum plantas 506, continentem, ante mortem suam, Academiae scientiarum tradidit.

Hunc codicem clar. vir David de Gorter ex archivis Academiae protractum ex Ammanni, Buxbaumii, Gmelini et Siegesbeckii operibus auxit, plantas obvias diligenter a se observatas inseruit Methodoque Linnaeana secundum Systema Naturae editionis decimae disposuit, atque anno 1761, sub nomine Florae Ingricae prelo submittere curavit, deinde anno 1764 Appendicem plantarum a celeb. viris Erico Laxmanno, Falkio, Lomonosovio et Staehlino detectarum addidit, asserens que in sua praefatione pag. 6. „Eam publici juris facere non „ideo, quod Ingrica tellus proferat plantas in aliis „Imperii Russici, aut proximis Sveciae provinciis „desideratas, sed ut Ingrica etiam exstaret Flora, „cum europaeae fere omnes prodierunt. „ —

Nunc vero aliae ſunt rationes, cur haec Flora Petropolitana in lucem prodeat. Nam ab eo tempore ſcientia ipſa botanica maxima adepta eſt incrementa; characteres novi detecti ſunt; definitiones ac phraſes botanicae accuratiores pleniores que a cellb. viris Murrayo, Iacquino, Scopoli, Crantzio, Wildenowio, Wiggerſio, Iuſſievio, Gmelino aliisque factae ſunt, multisve obſervationibus ornatae ita, ut plurimae plantae a botanicae tyronibus facilius quam antehac dignoſci potuerint, quod coram in lectionibus publicis diſcipulis meis non ſemel demonſtavi. Deinde aucta quoque eſt neceſſitas urgentior edendae hujus Florae ob auctam multitudinem Medicnae ac Chirurgiae ſtudioſorum in duobus ampliſſimis Noſocomiis Petropolitanis, pedeſtri et maritimo, quorum ibi plus quam ducenti ſumptu Imperiali aluntur, et inter caeteras ſcientias etiam Botanicem addiſcunt, ſtirpesque indigenas cognoſcere cupiunt: exemplaria vero Florae Ingricae ſunt jam diſtrata, unde illi in hac re penuriam patiuntur. Itaque ut illis praeſtantiſſimis auditoribus meis Botanicae qué cultoribus ingenuis ſuccurrerem in animo conſtitui, plantas circa Petropolim creſcentes tam eas, quae in Flora Ingrica Kraſcheninnikovii a Gortero enumeratae ſunt, quam novas a me anno 1775, et ſequentibus, atque poſtea a celeb. viris Rudolpho, Boeberoque detectas, quae in deſcriptione Gubernii Petropolitani a clar. Georgi memorantur, aliasque curatius perluſtratas generice ac ſpecifice deſcribere, ſub nomine Florae Petropolitanae, nam plurimae earum in ipſa urbe vel non adeo procul ab urbe in hoc Gubernio proveniunt· atque non ideo, ut etiam Petropolitana exſtaret Flora, nec pro eruditis botanicis, ſed ut habeant ſtudioſi noſtri etiam tyrones elenchum, unde

plantas indigenas hujus Gubernii ſibi notas fecere poſſint.

Qua propter ex variis clariſſimis auctoribus, Murrayo Gmelino, Iuſſievio, Wildenowio, Moenchio et ex Flora auſtriaca portatili, aliisque omnia ad meum ſcopum pertinentia excerpta, eorum auctoritati innixus, quod grato animo agnoſco, ſumma qua potui cura hic in utilitatem diligentiſſimorum auditorum meorum digeſſi; diſinitiones plurimas amplificavi, iconesque plantarum ex eorum quoque operibus citavi. Locos natales ubique ſedule per viginti quatuor annos a me obſervatos eos praetuli, qui propiores ab urbe Petropoli eſſent, ne juvenes botanophili, ad ſtirpes querendas, longo itinere indigeant; attamen nonnullos breviter aſſignare coactus fui annotato nomine auctoris inventoris, ubi mihi, tam ob officium medico-practicum, quo per 15 annos in Noſocomiis quatuor legionum praetorianorum fungebar, quam ob calculum renum et veſicae, quibus ſaepe diſcrutior, occaſio non fuit data longius exſpatiari. Nihilo minus tamen his tribus ultimis annis, iterum munere Profeſſoris aſſumpto, in excurſionibus, quamvis breviſſimis, multas herboſas oras adivi, quas antea viſitare non potui, plantasque ibi florentes, aut defloratas vario tempore quantum potui ſtudioſiſſime obſervavi, dubiaeque durationis ſtirpes ſemper in meo proprio horto plantare curavi, ut inde certior eſſe poſſim an planta ſit annua, an perennis, quod in Flora Ingrica fere neglectum erat. Quo ad locos natales plantarum hic memoratu dignum eſt, eos ab anno 1764 maxime immutatos eſſe ita, ut fruſtra quaeras plantas, quae ibi indicatae fuerunt, praecipue in urbe Petropoli, uti in inſulis apotheca-

ria, crucis, lapidea, basileensi; in parte Wiburgensi, circa Nosocomium pedestre et maritimum, in ripa septentrionali Nevae fluvii prope Ochtam, dein Caterinhoffii aliisque in locis, tunc temporis vacuis et desertis incultisque, ubi nunc domus variae ac Palatia splendida aedificata sunt; horti oleracei, plantationes variae, ambulacra ve consita; ubi vero sylvae amoeniſſimae virescebant betulam nanam aliasque plantas rariores continebant, ibi nunc prata nuda et Forum publicum est, uti circa Monasterium Newsky, et circa nosocomium pedestre ubi Ledum palustre et Lichen Islandicus in totum perierunt. In arvis et agris mutatio quoque locorum satis notabilis accidit: ubi ante quindecim annos armenta pascebantur, aut prata fertiliſſima erant, aditusque omnibus patebat, nunc ibi agri culti sunt vel Praedia magnifica exstructa et sepibus obvallata sunt, uti circa viam Sarscoselienſem, et viam Ochtenſem etc: ubi antea Gentiana cruciata, Orchides, aliaeque plantae pulcherrimae crescebant, nunc ibi avena sativa, aut hordeum vulgare, secale cereale, vel solanum tuberosum locum occupant. Possessiones etiam quod attinet, nullam esse diu stabilem praeter nomina propria urbium vel pagorum aut praediorum ita, ut praedium vel villa aliqua intra paucos annos pluries permutet suos dominos possessores que; quare in hoc opusculo nullum possessorem nominare statui, sed nomina propria pagorum et locorum vulgo cognitorum indicavi. Unde patet, praeter alias causas, et harum mutationum ergo, necessitas, in tali Flora subinde locos revidendi, et iterum reindicandi, ut illa maneat semper tyronibus botanophilis ad usum idonea. Plantas officinales etiam indigitare studui. Deinde nomina ruſſica plantarum, quae jam exi-

ſtebant, ſimplici modo aſſignavi, quam plurimis vero plantis ruſſice innominatis a me inventa dedi, appoſita nota Sob. In cryptogamiis genera nonnulla, et ſpecies ad hodiernum Botanicae ſtatum accommodavi plurimas que noviter a me obſervatas inſerui. Aſt fungorum, in primis agaricorum, immenſum numerum noſtra tellus producit, uti mihi quotannis videre contigit; et multoties colligebam eorum numeroſam varietatem; ſed doleo, quod fortuna non mihi permiſit per aliquod temporis ſpatium ruri commorari, ut eos commode examinare ac ſecundum ſiſtema definire potuiſſem; ſunt enim fugaces et faciem ſuam citò immutando non permittunt diu in eodem ſtatu ſe videre: (*) interim et id fatendum eſt, quod illi a quocunque auctore facilius pro lubitu deſcribi, quam dein ab aliis definiri poſſunt, niſi cum adminiculo iconum, quae ſaepe etiam fallunt; et quis, niſi ditiſſimus, icones et figuras omnes conquirere potis eſt? Iconibus autem deſtitutus ipſe plurimas ſpecies fungorum ad naturam deſcribere tentavi, quas cum definitionibus auctorum comparans vidi paucas deſcriptiones illas exactas in libris inveniri. Nec mirum eſt, ludunt enim, praecipue agarici, varietate colorum, quos vix quisquam mortalium verbis exprimere poteſt; tum pilei magnitudine, figura orbiculari, hemiſphaerica, campanulata, conica, cylindirica, infundibuliformi; centro umbonato vel depreſſo; margine integro, ſtriato, aut lacero, lobato; ſuper-

---

(*) *Fungos non ut herbas facile exſiccari, in parvum faſciculum compingi, domum duci, ſervari poſſe; tum quod poſt exſiccationem, — vix eundem liceat dignoſcere fungum. Linnei Flora lapponica. p.* 352.

ficie tota ficca nitente, pulverulenta, maculata, fquamofa, aut glabra, humente viſcida; ſubſtantia craſſa, ſolida, carnoſa, ſpongioſa, aut coriacea, tenui, pellucida; lamellis concoloribus aut diverſi coloris, craſſis, integris, aut dentatis, crenatis, tenuibus, aequalibus, aut plurium ordinum, ramoſis, inaequalibus, denſis aut diſtantibus, ſtipiti contiguis, aut liberis, ſive abruptis, aut in ſtipitem decurrentibus; ſtipite brevi, cylindrico, craſſo, farcto, ſolido, aut elongato, tenui, fiſtuloſo, glabro, aut ſtriato, intorto, annulato, volvato, ſquamoſo, integro, aut lacero, ſupra craſſiore dilatato, aut infra bulboſo, globoſo, pileo concolore, aut vario. etc. Boleti etiam variant coloribus, ſuperficie, figura pilei ſtipitis que; tubulis vel poris integris rotundis, angulatis, aut laceris figurae variae; non dicam de aliis fungorum minutorum generibus poſt b. Linneum a variis celeb. botanicis noviter conſtitutis, quorum etiam magnam copiam dari hic certum eſt; quam ob rem, et ſi plurimos examinavi et variis momentis annotavi, ſed in definitos, in aliud tempus, vel aliis poſt me definiendos relinquere coactus ſum. Muſcorum algarum que etiam dari ſcio plures ſpecies in hoc Gubernio creſcentes, quae numerum plantarum Florae noſtrae augere poſſent, et quae itidem ob defectum occaſionis indefinitae poſteris relinquuntur. Clariſſimi viri et Botanici egregii, qui plantas Florae hujus poſt Kraſcheninnikovium detexerunt earum que numerum auxerunt, ſequenti modo indicati ſunt: (B.) Boeber. (F.) Falk. (G.) Gorter. (L.) Laxmann. (Lom.) Lomonoſſow. (P.) Patrin. (R.) Rudolph. (St.) Staehlin. a me vero detectae vel definitae hoc ſigno (Sob.) ſunt notatae. Plantas in agris et hortis cultas, quas alii interdum floris ſuis inſerere ſolent, nullas

hic memoravi ; nam ſi omnes illas quae in hortis Imperialibus Petropoli, Peterhoffii, Sarſcoſelii, Gatczinae et in Pawlowſko expreſſo juſſu AUGUSTISSIMI NOSTRI AUTOCRATORIS et CLEMENTISSIMAE IMPERATRICIS ex variis exteris regionibus, ex Anglia praeſertim, advectae ſunt ſummoque ſtudio in ambulacris et hybernaculis coluntur; tum eas, quae a Celeberrimis illuſtriſſimis que Botanophilis, uti Principe Iuſſupow, Senatore Petro Soymonow aliisve quam plurimis, praecipue hoc tempore in hortos ſuos introductae ſunt, attingere ſolum, non vero deſcribere, voluiſſem, in immenſum volumen Flora haec excreſceret; quo enim jure Triticum, Hordeum et Avenam civitate donarem, eo etiam Braſſica Lactuca, Beta et forte Bromelia Ananas donanda forent, nam omnes hae ſunt eſculentae et in maxima hic quantitate producuntur; caeterae vero plurimae in aprico fere ſpontaneae creſcunt. Ad finem indices, latinus et ruſſicus, pro facilitate inveniendi ſpecies, tyronibus adjunguntur.

Dabam Petropoli d. 5. Iulii 1799.

EPIGRAPHE.

Ut enim aliquis ſoli cujusdam plantas, ſiquidem paucas vel nullas omittere velit, deſcribat, eum oportet et pedibus et animo bene valere tum in conquirendis plantis, tum ut earum nomina rite deſignet. Dillen. Praefat. in Catalog. plantar. Giſſenſium.

CLASSIS I.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

HIPPURIS. Calyx nullus. Corolla nulla. Stamen filamentum vnicum, margini bilobo insidens. Anthera compressa. Germen oblongum, inferum. Stylus subulatus, stamine longior, stigma simplex acutum. Pericarpium nullum. Semen vnicum, subrotundum, nudum.

1. HIPPURIS VULGARIS. foliis octonis subulatis, (interdum tredecim verticillatis; similis equiseto sylvatico.) (Gorter.) Fl. dan. tab. 87.

Habitat ad ramum fluuii Neuae Carpowca vocatum, in insula apothecaria, tum in variis paludibus et aquis stagnantibus. Floret Majo, Junio. 2 Водяная сосонка обыкновенная Sobol.

DIGYNIA.

CALLITRICHE. Calx nullus. Petala duo. Capsula compressa bilocularis, tetrasperma. Semina nuda, membranaceo-marginata. (Nonnunquam flores monoici, masculus in parte superiori, infra foemineus aut hermaphroditu.)

2. CALLITRICHE VERNA. Foliis ſuperioribus ovalibus, apice integris, (floribus dioicis.) (G.) Gaertn. de fruct. et Sem. Cent. 5. t. 68. f. 4.

In foſſis aquoſis circa Noſocomium maritimum, nec non in paluſtribus et aquis ſtagnantibus. Floret Majo. ☉ Весенная водяная звѣздочка Sobol.

3. CALLITRICHE AUTUMNALIS. Foliis omnibus linearibus apice bifidis, floribus hermaphroditis. (G.) Loeſel. fl. pruſſ. tab. 38.

In fundo Nevae fluvii et paſim in foſſis cum priori. Floret autumno. ☉ Осѣнняя водяная звѣздочка. Sobol.

CLASSIS II.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

CIRCAEA. Calyx diphyllus ſuperus. Corolla bipetala. Capſula infera, bilocularis, hiſpida. Semina ſolitaria.

4. CIRCAEA LUTETIANA. Caule erecto, racemis pluribus, foliis ovatis ſubserratis hirſutis. (Fructibus villis uncinatis.) (Rudolph.) Flor. Dan. tab. 256.

In ſylvis humidis vmbroſis Caterinhoffii, et in aliis locis similibus. Floret Julio. ♃ Парижская колдунница. Sobol.

5. CIRCAEA ALPINA. Caule ramoſiſſimo depreſſo, foliis cordatis dentatis piloſis. (glabris peta-

lis albis. Caulis transparens). (G.) Flor. dan. tab. 210.

Ad radices arborum inſulae Baſillienſis, et Caterinhoffii, in locis humidis. Floret Auguſto. 24 Колдунова трава. Ruſs. Горная колдунница. Sobol.

VERONICA. Corolla limbo quadripartito: lacinia in ſima anguſtiore. Capſula bilocularis, apice emarginata. Calyx quadripartitus, aut quinquepartitus.

6. VERONICA SPURIA. Spicis terminalibus, foliis ternis aequaliter ſerratis; (calycibus quadripartitis; corolla caeruleo-purpuraſcente, fauce ſquamis villoſis. (G.) Gmelin. iter. 1. t. 39.

In paſcuis montoſis circa Krasnoje Selo. 24 Средняя вероника, ſiue подложная. Sob.

7. VERONICA MARITIMA. Spicis terminalibus, foliis ternis aequaliter ſerratis. (In ſiccioribus plerumque foliis conjugatis eſt.) (G.) Flora dan. t. 374.

Ad ripam Newae fluuii circa Caterinhof, et in littore maritimo prope Strelinam et Peterhof tum in ſylvis prope Lugam. Floret Iulio, Auguſto. 24 Синии султанчики, vel приморская вероника. Sob.

8. VERONICA LONGIFOLIA. Spicis terminalibus, foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis acuminatis in petiolum definentibus. (Caule polyſtachio, hirſuto, calyce quadrifido, ſquamula hirſuta ſuffulto, corolla violacea, albave; labio ſuperiori incumbente. Variat foliis anguſtis et

latioribus, ſpicisque ſeptem aut octo.) (B) Sabbat. h. Rom. 2. tab. 48.
In viciniis urbis Oranienbaum, et in pratis humidis, parce. Floret Julio, Auguſto. ♃ Долголистая вероника. Sobol.

9. VERONICA SPICATA. Spica terminali, foliis oppoſitis crenatis obtuſis, caule adſcendente ſimpliciſſimo. (Calycibus quinquefidis. Folia plus minus villoſa. Altitudine admodum variat: nunc vix ſpithamea, vix pollicari, nunc ultra-pedali. Spicae ſemper inflectuntur.) (G.) Flor. dan. t. 52.

In ſylua circa oſtium Narovae fluvii locis ſiccis et arenoſis abunde creſcit. Praeterea nuſquam obſeruata. Floret Julio. ♃ Андреевъ крестъ. Russ. Андреевская вероника. Sobol.

10. VERONICA OFFICINALIS. Spicis leteralibus pedunculatis, foliis oppoſitis, caule procumbente. (Geniculis radicantibus; foliis ſcabris, nunc ternis, nunc oblongis vtroque latere dentatis, nunc lanceolatis latere inferiore dentatis) (G.) Fl. dan. t. 248. Veronica officinar. Ubiuis in ſyluis opacis, gramineis. Floret Junio, Julio. ♃ Вероника аптекарская Russ. Sobol.

11. VERONICA SERPYLLIFOLIA. Recemo terminali ſubſpicato, foliis ovatis glabris, crenatis, (oppoſitis, paribus duobus; caule procumbente. Calyces quadrifidi. Corollae albidae lineis caeruleis, fauce virente.) (G.) Fl. dan. t. 492. Planta admodum varians pro natura ſoli. Varietates 6, enumerat Schmidt flor. Boëmica.
Ad ductus aquarum et vias, vt et in ſylvarum locis ſterilibus et humidiuſculis. Floret Majo et Junio. ♃ Богородичнолиſтая вероника. Sobol.

12. VERONICA BECCABUNGA. Racemis lateralibus, foliis ovatis planis, caule repente. (Foliis carnosis, denticulatis glandulosis, corolla laete caerulea, racemi oppositi, longi.) (G) Flor. dan. t. 511. Beccabunga officin.

In pratis aquosis insulae apothecariae, tum prope Sarscoje Selo, et circa montes Krasnoselii, Duderhofii, et vbique ad riuulos. Floret Junio. ♃ Вероника ручейная. Sob.

13. VERONICA ANAGALLIS. Racemis lateralibus, foliis lanceolatis serratis, caule erecto, (calycibus quadrifidis, floribus confertis erectis, caerulescentibus. Tota succulenta) (G.) Rivin. t. 100.
In rivulis insulae apothecariae, et circa fluuium Lugam, nec non in aliis locis humidis, cum praecedente. Floret Junio, Julio. ☉ Водяная вероника. Russ. Sob.

14. VERONICA SCUTELLATA. Racemis lateralibus laxis diuaricatis alternis: pedicellis pendulis, foliis linearibus subintegerrimis, (caule angulato, procumbente; calyce quadrifido, corolla rubella.) (G.) Fl. dan. t. 209.

In uliginosis insulae Basileae et in aliis locis humidis gramineis vulgatissima planta est. Floret Junio. ♃ Щитовая вероника. Sobol.

15. VERONICA CHAMAEDRYS. Racemis lateralibus, foliis ovatis sessilibus rugosis dentatis, caule bifariam piloso. (Racemis lateralibus oppositis, calycibus quadrifidis. Admodum varians: caule ascendente, prostrato, erecto, corollis albis, carneis, caeruleisve. Calycina foliola inaequalia lanceolata.) (G.) Fl. dan. t. 448.

Ubiuis in pratis copioſe prouenit, et prima omnium ſui generis, excepta veronica ſerpyllifolia, floret. 2 Дубровочная вероника. Sobol.

16. VERONICA AGRESTIS. Floribus ſolitariis, foliis cordatis, petiolatis, pedunculo breuioribus, (caule procumbente, pedunculis axillaribus longis, calycibus quadrifidis baſi gibbis, corolla ſaturate caeruleſcente. Calycina foliola ovata aequalia.) (G.) Flor. dan. t. 449.

Habitat iu locis cultis, circa Pulkovo in montoſis, et Pargelovii. ⊙ Пашенная вероника. Sobol.

17. VERONICA ARVENSIS. Floribus ſolitariis, foliis cordatis ſeſſilibus pedunculo longioribus. (Caule aſcendente, floribus axillaribus ſubſeſſilibus pallide caeruleis, calycibus quadrifidis, foliolis lanceolatis inaequalibus.) (R. Sob.) et Fl. dan. t. 515.

Habitat in arvis Craſnoſelii, Ligovi, et Murini. Floret Junio, Julio. ⊙ Полевая вероника. Sob.

18. VERONICA HEDERAEFOLIA. Floribus ſolitariis, foliis cordatis planis quinquelobis (trilobisque, caule procumbente, calycibus quadrifidis, corolla pallide caerulea rubellaue, capſula loculis diſpermis.) (R.) Fl. dan. t. 423.

Circa Petropolim in ruderatis, ſed parce. Floret Junio, Julio. ⊙ Будролистая вероника. Sobol.

19. VERONICA TRIPHYLLOS. Floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce longioribus, (ſubtus rubellis, carnoſis, aggregatis, caule procumbente, floribus ſolitariis longe petiolatis in folioforum capitulorum roſulis caeruleis.) (G.) Fl. dan. t. 627.

In insula Petri, et Basilii circa portum triremium, et circa fabricam pulueris pyrii Ochtensem infrequens. Floret Junio, Julio. ☉ Трилистая вероника. Sobol.

20. VERONICA VERNA. Floribus solitariis, foliis digitato-partitis, pedunculis calyce breuioribus, (Calycibus quadrifidis, corolla caerulea, annulo viridi. Caule erecto stricto.) (Sob. R. B.) Fl. dan. t. 252.

In siccis arenosis, et arvis. Floret primo vere. ☉ Весенная вероника. Sobol.

21. VERONICA ACINIFOLIA. Floribus solitariis pedunculatis, foliis ovatis grabris crenatis, caule erecto subpiloso. (minima, caule erecto, floribus caeruleis.) (B.) Boccon. mus. 2. t. 102.

Habitat in montosis procliuibus prope Oranienbaum. Floret Junio et Julio. ☉ Тимьянолистая вероника. Sobol.

GRATIOLA. Calyx quinquepartitus; foliolis duobus exterioribus accessoriis patulis. Corolla inaequalis, resupinata quadrifida. Stamina quatuor, duo sterilia. Capsula bilocularis.

22. GRATIOLA OFFICINALIS. Foliis lanceolatis serratis. Floribus pedunculatis. (Caulibus geniculatis, foliosis, foliis opositis subamplexicaulibus, floribus axillaribus, limbo quadripartito albo caerulescente.) (R.) Fl. dan. t. 863. Gratiola officinarum.

In pratis humidis circa Petropolim rarius occurrit. ♃ Дикой авранъ. Russ. Благодать аптекарская. Sobol.

UTRICULARIA. Calyx diphyllus aequalis. Corolla ringens calcarata, capsula unilocularis, globosa.

23. UTRICULARIA VULGARIS. Nectario conico, scapo paucifloro. (Foliis densis capillaribus, vesiculis purpurascentibus, floribus tribus aut quatuor racemosis, flavis, calyce purpurascente, galea apice perforata.) (G.) Fl. dan. t. 138.

In paludibus insulae lapideae, et Catharinhoffii. Floret Julio et Augusto. 2 Волынчатка обыкновенная. Sobol.

LYCOPUS. Corolla quadrifida. lacinia vnica superiore emarginata. Stamina distantia. Stigma bifidum. Semina quatuor retusa.

24. LYCOPUS EUROPAEUS. Foliis sinuato-serratis, (interdum pinnatifidis, glabris villosisue, floribus axillari-verticillatis albis, maculis purpureo-caeruleis. Eminus Mentham mentitur.) (G.) Sabbat. h. rom. 3. t. 53.

In syluis subhumidis Strelinae, ac Peterhoffii copiosissime et Petropoli ad fossas et vias passim. 2 Волчья нога европейская. Russ. Sobol.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM. Calyx. Gluma bivaluis, vniflora, oblonga, valuula interiore majore. Corolla. Gluma bivalvis aristata, arista reflexa. Semen vnicum, corollae glumae adnatum.

25. ANTHOXANTHUM ODORATUM. Spica oblonga ovat ☉: flósculis sub pednnculatis arista

longioribus. (Culmi nodis tribus aut quatuor fuſcis, foliis piloſis, panicula ſpicata, floribus quibusdam pedunculatis, aliis ſeſſilibus, petalis inaequalibus, obtuſis, a baſi ariſtatis, antheris magnis vtrinque bifidis, luteis rubrisve.) (G.) Fl. dan. t. 666.

Im Campis et pratis ſyluoſis paſſim. Floret Majo et Junio. 24 Колосокъ пахучій. Russ. Sobol.

CLASSIS III.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA. Calyx nullus. Corolla monopetala quinquefida: baſi hinc gibba. Semen vnicum, vel capſula (cruſta non dehiſcens) trilocularis. (Mira in hocce genere fructificationis partium diuerſitas. In quibusdam calycis margo vix adeſt, in aliis quinquefidus; tubus corollae in aliis calcaratus, breuiſſimus in aliis; limbus in quibusdam bilabiatus. Stamina duo aut quatuor, vel ſexus diſtinctus. Stigma vel trifidum vel globoſum. Pericarpium vel nullum vel biloculare. Pappus vel adeſt vel non.)

26. VALERIANA OFFICINALIS. Foliis omnibus pinnatis dentatis, floribus triandris. (Dilute purpuraſcentibus, ſeminibus pappo plumoſo. Variat: foliis ternis, foliis oblongis vtrinque dentatis,

foliis lanceolatis, latere inferiori dentatis, et vtroque.) (G.) Fl. dan. t. 570.

In pratis laetioribus, et sylvis humidis vmbrosis, circa viam Sarscoselienscm et Peterhoffianam, tum et Petropoli in insulis Nevae fluvii, frequens. Floret Julio et Augusto. ♃ Булдырянъ, siue Маунъ. Russ. Маунъ аптекарскій. Sobol.

IRIS. Corolla sexpartita, inaequalis, laciniis alternis geniculato-patentibus, majoribus. Nectarium, linea longitudinalis in vnguibus petalorum saepius barbata. Stigmata tripetaliformia, intus carinata, extus sulcata, cucullato-bilabiata, labio exteriore minore, interiore bifido.

27. IRIS PSEUDACORUS Foliis ensiformibus, corollis imberbibus, petalis interioribus stigmate minoribus, (luteis, antheris violaceis. Styli tripetaloides. Caules ramosi.) (G.) Fl. dan. t. 494. Acorus palustris officin.

In insula lapidea, tum in paludibus et stagnis vbique. ♃ Косатикъ желтой, sive сабельникъ. Russ.

28. IRIS SIBIRICA. Caule subtrifloro tereti, foliis linearibus, germinibus trigonis, corollis imberbibus. (Petala caerulea reflexa, [illegible]escentia admodum venosa, inde alba. Barben album. Stigmata fimbriata.) (G.) Iacq. fl. austr. 1. t. 3.

Ad fluuium Volchow, supra pagum Tschortowo, semel visa. Ceterum in tota Ingria nusquam obseruata. Floret Junio. ♃ Пѣтушокъ, siue чистякъ. Sibiriae incolis. Косатикъ сибирскій. Sobol.

SCHOENUS. Glumae paleaceae vnivalves congeſtae. Cor. nulla, ſemen vnicum ſubrotundum inter glumas. (In Gen. dicit: glumam multifloram, bivalvem, petala sex, conniventia, perſiſtentia imbricata, exterioribus brevioribus; germen ovato-triquetrum, stylum ſetaceum, ſtigmate trifido.)

29. SCHOENUS NIGRICANS Culmo tereti nudo, capitulo ovato; involucri diphylli valvula altera ſubulata longa. (Stamina plerumque duo.) (G.) Scheuchz gramin. t. 7. f. 13. 15.

In paludibus circa vicum Marzinca, et in aliis locis ſimilibus, ſed parce. Floret Majo, Junio. 24 Веревочникъ чернѣющій. Russ. Sobol.

SCIRPUS. Glumae paleaceae undique imbricatae, ſquamis plano-inflexis. Cor nulla Sem. unicum imberbe triquetrum, ſaepe villoſum. (Spica rotunda.)

30. SCIRPUS PALUSTRIS Culmo tereti nudo, ſpica subovata terminali. (Folia baſi ferruginea, ſpica imbricata ſetulis tribus aut quatuor.) (G.) Fl. dan. t. 273.

In ripis arenoſis Nevae fluuii, et in paludibus copioſe. Floret Majo, Junio. 24 Сипникъ, ſiue. комышь. Комышъ болотный. Russ. Sobol.

31. SCIRPUS CESPITOSUS. Culmo ſtriato nudo, ſpica bivalvi terminali longitudine calycis, radicibus ſquamula interſtinctis. (Sob) Fl. dan. t. 167.

Creſcit in palude noſocomii maritimi, nec non in aliis locis inundatis, cum Menyanthe trifoliata. Floret Majo, Junio. 24 Комышъ дернистый. Sobol.

32. SCIRPUS ACICULARIS. Culmo tereti nudo ſetiformi, ſpica ovata bivalvi, ſeminibus nudis. (G.) Fl. dan. t. 287.

Ad ripam Nevae fluuii, circa inſulam apothecariam, lapideam, et in ſtagnis copioſe prouenit. Floret Majo. ♃ Комышь булавчатый. Sob.

33. SCIRPUS LACUSTRIS. Culmo tereti nudo, ſpicis ovatis pluribus pedunculatis terminalibus, (ſquamis bifidis, ſeminibus trigonis.) (G.) Lobel. ic. 25.

In aquis ſtagnantibus et ramis Nevae fluuii circa inſulam lapideam, et baſilii vltra portum triremium frequentiſſimus eſt. Floret Majo, Junio. ♃ Комышь постельный. Sob.

34. SCIRPUS SYLVATICUS. Culmo triquetro folioſo, vmbella foliacea, pedunculis nudis ſupradecompoſitis, ſpicis confertis, (ovatis. Junco villoſo ſimilis.) (G.) Fl. dan. t. 307.

Ad rivulos et foſſas ſylveſtres, tum circa Catharinhoffium in aquis ſtagnantibus, nec non in ripa rami Nevae fluvii, Carpowca vocati, in inſula apothecaria. Floret Junio, Julio. ♃ Комышь лѣсный. Russ. Sobol.

ERIOPHORUM. Glumae vndique imbricatae membranaceae laxae. cor. nulla. Sem. vnicum, villis ſpica longioribus, mollibus cinctum.

35. ERIOPHORUM VAGINATUM. Culmis vaginatis teretibus, ſpica ſcarioſa, (globoſa, terminali, pappo bombacino undique veſtita.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 219.

Habitat in pratis ceſpitoſis humidis, circa pagum Ochtam, ad monaſterium Newsky, pro-

pe montem Pulcova, et in aliis locis ſimilibus parcius. Floret Majo. ♃ Пушица одноголовчатая. Russ. Sobol.

36. ERIOPHORUM POLYSTACHYON. Culmis teretibus, foliis planis, ſpicis pedunculatis, pendulis. (cernuum; pappo lanato.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 217.

In paludibus ſylvoſis inſulae baſileenſis, et ubique copioſiſſime cum praecedente. Floret Majo. ♃ In noſtro ſpicae ſemper ſunt quatuor, quarum tres pedunculatae, et vna ſeſſilis. Пушица многоголовчатая. Russ. Sobol.

NARDUS. Calyx nullus. Corolla bivalvis, valvula exteriore longiore, amplexante, rachi alternatim denticulate inſidens. Nectarium nullum. Semen vnicum, corolla tectum.

37. NARDUS STRICTA. Spica ſetacea recta ſecunda. (Folia plurima ſubulata ceſpitoſa, ſpiculae quindecim, aut viginti, glumis exterioribus ariſtulaque rufis, vel violaceis.) (G.) Schreber. gram. 65. t. 7.

In pratis inſulae apothecariae, baſileenſis, lapideae, et aliis locis arenoſis ſiccis. Floret Majo. ♃ Бѣлоусъ vel Щепинница сожменная. Russ. Sobol.

DIGYNIA.

PHALARIS. Calix duplex, uterque bivalvis, exteriore valvula carinata, corollam includente, interi-

ore lanceolata pubeſcente. Nectarium diphyllum. Sem. vnicum corollae adnatum.

38. PHALARIS ARUNDINACEA. Panicula oblonga ventricoſa ampla. (G.) Leers. fl. herb. t. 7. f. 3.

In locis humidis, Murinae, et ad viam Peterhoffianam, aliisque ſimilibus. Floret Junio, Julio. 2 Канарейникъ тростничный, vel Блестецъ тростничный. Russ. Sobol.

PANICUM. Calyx bivalvis, biflorus: floſculo altero hermaphrodito, altero (exteriore) neutro, ſive Maſculo. (in gen. dicit: calyx gluma uniflora trivalvis, valvula tertia minima a tergo alterius. Corolla bivalvis.) Sem. unicum in ſinu minoris calycis valvulae.

39. PANICUM VERTICILLATUM. Spica tereti; involucellis unifloris biſetis, retrorſum ſcabris, (culmis diffuſis, racemulis quaternis. (Sob. et R. Curtis Flor. Londin. t. 260.

Ad margines agrorum in Oſinova Roſchtcza, et circa Petropolin rarius obſeruatur. Floret Julio, et Auguſto. ⊙ Боровникъ, vel Боръ трава, ſive Просо боровое. Russ. Sobol.

PHLEUM. Calyx bivalvis, ſeſſilis, linearis, truncatus, apice bicuſpidato. Corolla incluſa, valvula exteriore amplexante interiorem. Antherae bifurcatae. Spica typhina.

40. PHLEUM PRATENSE. Spica cylindrica longiſſima ciliata. Culmo erecto nodis quatuor. (Spiculae ſuperne corniculatae, praemorsa. Ad-

modum variat: foliis pilosis; culmo erecto, decumbenteve; petalo uno bifido, altero integro, antheris luteis vel purpurascentibus, etc.) (G.) Schreb. gram. 103. t. 14.

In pratis passim. Floret Junio, Julio. ♃ Арженецъ луговой. Russ. Sobol.

41. PHLEUM NODOSUM. Spica cylindrica, culmo adscendente, foliis obliquis, radice bulbosa. (Spica glabra basi plerumque sterilis, glumis denticulatis acuminatis; antherae albae.) (Sob. R. et. B.) Flor. dan. t. 308.

Habitat in monte Pulkovo, et in sylva urbis Gatczinae, tum et Petropoli in pratis et hortis cultis passim. Floret Junio, Julio. ♃ Арженецъ узловой. Russ. Sob.

42. PHLEUM ARENARIUM. Spica ovata ciliata, culmo ramoso. (Sob.) Pluckn. alm. t. 33. f. 8.

Habitat Petropoli in littore maris arenoso insulae basileensis, ad portum triremium, atque in aliis locis arenosis. floret Majo, Junio. ☉ Арженецъ песочный. Russ. Sobol.

ALOPECURUS. Calyx bivalvis. Corolla univalvis, marginibus basi coadunatis. Arista duplo longior geniculata. Nectarium nullum. Antherae bifurcatae.

43. ALOPECURUS PRATENSIS. Culmo spicato erecto: glumis villosis, corollis muticis. Spadix cylindrica, spiculis compressis, glumis albicantibus, lineis quinque viridibus, antheris flavis, dein ferrugineis. (Sob. R.) Schreb. gram. 133. t. 19.

Creſcit ubique in pratis fertilibus. Floret Junio, Julio. 24 Лисій хвостъ луговой. Russ. Sobol.

44. ALOPECURUS GENICULATUS. culmo ſpicato infracto corollis muticis. (Glumis laeuiuſculis, antheris ochroleucis (Sob. et R.) Fl. dan. t. 564.

In pratis humidis, et in ductibus aquarum frequens eſt. Floret Junio, Julio. 24 Лисій хвостъ колѣнчатый. Russ. Sob.

45. ALOPECURUS AEQUALIS. Ariſtis gluma aequalibus (Sob.)

Habitat in locis uliginosis cum praecedente. Floret Junio, Julio. In lacubus natans eſt. 24 Лисій хвостъ ровный. Sobol.

MILIUM. Calyx bivalvis: valvulis ventricoſis corollam breuiſſimam ſubexcedentibus, ſubaequalibus. Stigmata penicilliformia. Semen unicum nitens.

46. MILIUM EFFUSUM. Floribus paniculatis diſperſis muticis. (Sob.) Curtis Fl. Londin. faſc. 43.

In ſyluis montoſis et vmbroſis circa Gatczinam, et ad Sarscoſelium, rarius. Floret Majo, Junio. 24 Проco розсыпное. Russ. Sobol.

AGROSTIS. Calyx bivalvis, valvulis acutis corolla paulo breuioribus. Petalum exterius glabrum. Stigmata longitudinaliter hiſpida.

47. AGROSTIS SPICA VENTI. Petalis integris: exteriore ariſta recta ſtricta longiſſima, patula. panicula patula. (Panicula magna, petala ſaepius biſida.) Sob. Fl. danica. t. 853.

Creſcit prope Murzincam, Pargelovium, Oſinova roſchcza et Gatczinam ad margines ſegetum, atque multis in locis graminoſis ſiccis Petropoli. Floret Junio, Julio. ☉ Полевица вѣтреная. Russ. Sobol.

48. AGROSTIS MILIACEA. Petalo exteriore ariſta terminali recta ſtricta mediocri. (Similis A. Spicae venti, ſed ariſta floſculis longitudine tantum aequalis. Culmi e radice plures. Panicula minus ampla. Cultura etiam diverſiſſima perſtitit.) (Sob.)

Ad ſegetes et ſepes ruſticorum prope Gatczinam degentium. Floret Julio. ♃ Полевица пшонная. Russ. Sobol.

49. AGROSTIS ARUNDINACEA. Culmo enodi, Panicula oblonga contracta: petalo exteriore baſi villoſo, ariſta e baſi torta calyce longiore. (Sob.)

Habitat in locis humidis ſylvoſis, praecipue Pargelovii Catharinhoffii et Murinae, ad viam quae ducit a Sarſco ſelo, ad Pavlovskoy, et Gatczinam. Floret Julio. ♃ Полевица тростничная. Russ. Sob.

50. AGROSTIS CALAMAGROSTIS. Panicula incraſſata, petalo exteriore toto lanato apice ariſtato, culmo ramoſo. Similis Agroſti arundinaceae, ſed corolla tota valde hirſuta; ariſta recta non e baſi, ſed apice petali. Culmi ramoſi. Panicula denſa, viridi-argentea. (Sob.)

In iisdem et ſimilibus locis cum praecedente.

Fl. Junio et Julio. 2 Полевица вѣтвистая. Russ. Sobol.

51. AGROSTIS RUBRA. Paniculae parte inferiore prius florente patentiſſima, superiore contracta, petalo exteriore glabro: arista terminali tortili recurva. (Sob.)

Crescit in pratis verno tempore inundatis et aestate siccis, Catharinhoffii, in monte Poclonnaja, et inſulis Nevae fluvii, nec non in aliis locis circa Petropolim. Floret Junio, Julio. 2 Полевица красная. Russ. Sob.

52. AGROSTIS CANINA. Calycibus elongatis, petalorum ariſta dorſali recurva, culmis proſtratis ſubramoſis. Panicula elongata ſaepius, ramulis coarctatis, purpurascens. Ariſta ſetacea alba, floſculo duplo longiore, recta, medio notata geniculo fuſco. (Sob.)

In paſcuis herboſis humidis circa Petropolim. Floret Junio, Julio. 2 Полевица собачая. Russ. Sob.

53. AGROSTIS STOLONIFERA. Paniculae ramulis patentibus muticis, culmo repente foliis radicalibus breviore, folii ſupremi vagina ventricoſa, calycibus aequalibus. (G.) Fl. dan. t. 564.

Ad ripas ſabuloſas inundatas inſulae apothecariae, et ad ductus aquarum ubique creſcit copioſe. Floret Julio. 2 Полевица ползучая. Russ. Sob.

54. AGROSTIS CAPILLARIS. Panicula capillari patente: Calycibus aequalibus ſubulatis hiſpidiuſculis coloratis, floſculis muticis. (Panicula diffuſa,

ſpiculis quadrifloris pubeſcentibus, culmo erecto tereti.) (G.) Fl. dan. t. 163.

In pratis et ad ductus aquarum frequens. Floret Iunio et Iulio 2 Полевица волосяная. Russ. Sobol.

55. AGROSTIS ALBA. Panicula laxa: calycibus muticis hiſpidiusculis aequalibus, culmo repente. (Rud.)

In paludoſis montanis et sylvosis circa Petropolim rarius occurrit. Floret Iulio et Auguſto. 2 Полевица бѣлая. Sobol.

AIRA. Calyx bivalvis, biflorus. Floſculi absque interjecto rudimento tertii. Antherae utrinque furcatae. Numerus florum variat, duo aut tres.

56. AIRA AQUATICA. Panicula patente. Floribus muticis laevibus calyce longioribus. Foliis planis. Culmi binodi, racemis paniculae capillaceis, ſpiculis ſpadiceo-viridibus. Calycibus vix floſculis brevioribus. Variat in loco ſicco calycibus quinquefloris floſculis valde remotis. An Poa? (G.) Fl. dan. t. 381.

Habitat in udis insulae Baſileenſis et ad ripas Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 2 Молоточникъ водяной. Russ. Sobol.

57. AIRA SUBSPICATA. Foliis planis panicula ſpicata: floſculis medio ariſtatis; ariſta reflexa laxiore. Spica terminalis pauciflora vix paniculata, glumae violaceae virentes albeſcentesque; valvulis corollae ſubcaeruleis albidis, carinis antherisque biſidis. (Sob.) Fl. dan. t. 228.

Creſcit copioſe in ſylvis humidis montoſis Gatſchzinae et Duderhovii. Floret Iunio, Iulio. 2 Молоточникъ колосистый. Russ. Sobol.

58. AIRA CESPITOSA. Foliis planis, panicula patente: petalis baſi villoſis ariſtatisque; ariſta recta brevi. Spiculae geminatae, petala apice denticulata, uno ſeſſili, altero pedicellato. (G.) El. dan. t. 240.

Creſcit in pratis fertilibus ubique et inter ſegetes. Floret Junio, Julio. 2 молоточникъ дернистый Russ. Sob.

59. AIRA FLEXUOSA. Foliis ſetaceis, culmis ſubnudis, panicala divaricata, pedunculis flexuoſis. Tota plus minusve rufeſcens, fuſceſcensve. (G.) Flor. dan. t. 157.

In ſylvis et pratis humidis. Floret Junio et Julio. 2 Молоточникъ изгибистый. Russ. Sob.

60. AIRA ALPINA. Foliis ſubulatis, penicula denſa: floſculis baſi piloſis ariſtatis; ariſta brevi. (Sob.) Fl. dan. t. 961.

Habitat in montoſis Pargelovii, et Oſinova roſcheza, rarius. Floret, Junio, Julio. Durationis incertae. Молоточникъ горной. Russ. Sobol.

61. AIRA CANESCENS. Foliis ſetaceis, vaginis ſcabris: floribus paniculatis: ariſtis calycem non excedentibus. Folium ſummum ſpatha paniculam obvolvens. Panicula deflorata longius e vagina exit. (R.) Gaertn. de fr. et Sem. pl. cent. 1. t. 1 f. 7.

Creſcit in arenoſis circa urbem Sophiam, et Sarscoſelo, parce. Floret Julio. ♃ Молоточникъ сѣдой. Russ. Sobol.

MELICA. Calyx bivalvis, biflorus. Corpuſculum pedicellatum inter floſculos. Nectarium monophyllum carnoſum. Stamina baſi dilatata. Corpuſculum: rudimenta florum duorum trunculatorum. Flores ſpicato paniculati.

62. MELICA NUTANS. Petalis imberbibus, panicula nutante ſimplici. Culmi quadrigoni, vaginis inferioribus purpureis; pedunculi ſuperiores uniflori, ſecundi; glumae purpureae margine albo; petala exteriora viridia margine albo. (G.) Schreb. gram. 62. t 6.

In inſula Petri, tum in ſylvis umbroſis ad viam a Sarſcoſelo ad Craſnoſelo ducentem copioſiſſime invenitur. Floret Majo, Junio. ♃ Перловникъ наклонный. Russ. Sob.

63. MELICA CAERULEA. Panicula coarctata; floribus cylindricis, culmo enodi. Aira caerulea. Racemi ſolitarii ſuberecti, ſpiculae muticae pedicello breviores, glumae triflorae aut quinqueflorae (R.) Fl. dan. t. 239.

Habitat in monte Poclonnaja ad viam ſylvosam Wiburgensem, tum circa montem Duderowium, et Crasnoselium. Floret Iunio. ♃ Перловникъ синій Sob.

64. MESICA ALTISSIMA. Petalis imberbibus, panicula ramoſiſſima, coarctata secunda. (Sob.) Gmelin. Fl. ſibir. 1. t. 20.

Habitat in ſylvis umbroſis humidis circa urbem Gatcziuam, et Sophiam alias nullibi adhuc obſervata. Floret Iunio, Iulio. 2 Перловникъ высокій. Russ. Sob.

POA. Calyx bivalvis multiflorus, spiculae ovatae: compreſsae valvulis margine scarioſis acutiusculis.

65. POA AQUATICA. Panicula diffuſa, ſpiculis sexfloris linearibus, lanceolatis, multifloris; panicula subdiffuſa maxima, petalo exteriore ſtriato. Calyces 5-10 flori. Culmus sexpedalis. (Sob.) Fl. dan. t. 920.

Creſcit in paludibus prope Catharinenhoff, ad viam Peterhoffianam, in lacu pagi Tentelevo, et in Inſulae apothecariae rivulo ad inſulam lapideam fluente. Floret Junio, Iulio. 2 Мятлика, vel метелка водяная. Russ. Sob.

66. POA TRIVIALIS. Culmo erecto tereti; Panicula ſubdiffusa: spiculis trifloris baſi pubeſcentibus, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi truncata. (Sob et Rud.) Curtis Fl. Londin. t. 90.

Creſcit Petropoli circa Monasterium nobilium virginum, et in inſulis Nevae fluvii, nec non ad vias sylvoſas Sarscoselii, et Wiburgi. Floret Iunio Iulio. 2 Мятлика vel метелка обыкновенная. Russ. Sob.

67. POA ANGUSTIFOLIA. Culmo erecto tereti. Panicula diffusa: ſpiculis quadrifloris pubescentibus, foliis radicalibus convolutis filiformibus; vaginis glabris; ligula brevi truncata. (Sob.) Leers Fl. herb. t. 6. f. 3.

Crescit in pratis amoeniſſimis et fertiliſſimis, ad rivulum Nevae fluvii Czornaja reczca nominatam, tum ad viam regiam Peterhoffianam, et paſſim in humidis depreſſis sabulosis. Floret Junio. 2 Мятлика vel метелка узколистая. Russ. Sobol.

68. POA PRATENSIS. Culmo erecto tereti, panicula diffuſa: spiculis ſubquinquefloris, foliis planis: vaginis ſcabris; ligula oblonga acuta. (Panicula ampliſſima, spiculis 2-3 floris lanugine nulla.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 841.

Creſcit ubique in pratis. Floret Julio. 2 Мятлика vel метелка луговая. Russ. Sob.

69. POA ANNUA. Culmo obliquo compreſſo, panicula diffusa patentiſsima; spiculis ſubquinquefloris, foliis planis: vaginis glabris; ligula brevi acuminata. Variat panicula rubra. (G.) Curtis Fl. Londin. t. 8.

Ubivis in pratis et in hortis atque ad vias. Floret tota aeſtate. ☉ Мятлика vel метелка годовая. Russ. Sob.

70. POA PALUSTRIS. Panicula diffusa; spiculis ſubtrifloris pubeſcentibus, foliis ſubtus scabris. Calycibus ariſtatis, floribus villoſis. (Sob. dein Rud.) Flor. dan. t. 750.

Habitat Petropoli, in regione Wiburgenſi prope ecclesiam sti. Samsonii, circa cemeterium sti Iohannis et in multis aliis locis paludoſis. Floret Julio. 2 Метелка болотная. Russ. Sob.

71. POA COMPRESSA. Panicula coarctata secunda, culmo obliquo compresso. (Spiculae lanceolatae, triflorae aut octoflorae, antheris fulvis.) (R. Sob.) Fl. dan. t. 742.

In pratis siccis ex adverso insulae apothecariae ad ripam Nevae fluvii, et paſſim. Метелка плоская. Russ. Sob.

72. POA NEMORALIS. Panicula attenuata florente patula: spiculis ſubbifloris mucronatis, scabris, culmo debili incurvo. (Sob.) Flor. dan. t. 749.

Habitat in pratis sylvoſis fertiliſſimis insulae lapideae, et ad ripas Nevae fluvii in parte ſeptentrionali, nec non in aliis locis ſimilibus. Floret Julio. ♃ Мятлика, vel метелка лѣсная. Russ. Sobol.

73. POA BULBOSA. Panicula secunda patentiuscula: spiculis quadrifloris. (Culmi foliaque radicalia baſi bulbosa. Vivipara.) (Sob.) Vaillant. Paris. t. 17. Krocker flor. siles. 1. tab. 25. Crescit in inſulis, apothecaria, et lapidea, et paſſim in pratis apricis satis copiose. Glumae inaequales: aliae latae planae, aliae contractae longiores. Floret Majo, Junio. ♃ Мятлика vel метелка луковчатая. Russ. Sobol.

BRIZA. Calyx bivalvis, multiflorus: spicula distichsa: Valvulis cordatis obtusis; interiore minore ſubrotunda.

74. BRIZA MEDIA. Spiculis ovatis: calyce flosculis breviore racemuli binati undulati, antheris fusco-rubris. (G.) Fl. dan. t. 258.

In pratis subhumidis sylvosis aestate ficcioribus, circa pagum Ostrowki, in monte Poclonnaja, Pargelovii, et Crasnoselii, satis copiose. Floret Junio. 2 Трясучка средняя. Russ. Sobol.

DACTYLIS. Calyx bivalvis multiflorus, valvis compressis, altero latere latioribus convexis semiovatis carinatis, altero anguſtis, valvula interiore majore. Corolla bivalvis, semen includens. Nectaria duo, basi gibba.

75. DACTYLIS GLOMERATA. Panicula secunda glomerata. (folia caulina plerumque trinervia, aut sexnervia, spiculae, triflorae aut quadriflorae, asperae, petala bifida; arista terminali. Antherae flavo-rubellae. (G.) Fl. dan. t. 743. In pratis, cultis, et ad margines viarum passim. Floret Majo, Junio. 2 Ежа сборная. Russ. Sobol.

CYNOSURUS. Calyx bivalvis multiflorus, aequalis. Corolla bivalvis, valvula altera concava longiore. Nectarium diphyllum. Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum.

76. CYNOSURUS CAERULEUS. Bracteis integris, spicis subovatis, oblongis; corollis mucronatis. (Culmi cespitosi compressi enodes, spica densa caerulea, basi involucro diphyllo aut triphyllo, bracteis nigro violaceis; ex biglumis, gluma exteriore tricuspida, violacea) (G.) Arduin. spec. 2. t. 6. f. 3. 4. 5.

Habitat in pratis uliginosis, et montosis Strelinae, sub juniperis frequens, sed in aliis locis raro

observatur. Floret Majo, Junio. 2 Собачій хвостъ, vel гребенникъ синій. Russ. Sobol.

FISTUCA. Calyx bivalvis, multiflorus. Spicula oblonga teretiuscula: glumis acuminatis.

77. FESTUCA OVINA. Panicula secunda coarctata aristata, culmo tetragono nudiusculo, foliis setaceis. (Calyces flosculo breviores, petala bifida. Admodum variat; calycibus, tri-sex, aut septem floris, petalis interdum muticis; arista plus minus longa, glumis plus minusve coloratis; spiculis interdum viviparis etc.) (G.) Stillingfl. misc. t. 8.

In pratis montosis et ericetis passim. Floret Majo, Junio. 2 Занозка овечья. Sobol.

78. FESTUCA ELATIOR. Panicula secunda erecta: spiculis subaristatis, exterioribus teretibus. (Culmi sex aut quinquenodes, folia horizontaliter patentia, spiculae quinqueflorae aut novemflorae, glumis petalisque viridibus margine albo.) (G.) Schreb. gram. 34. t. 2.

In pratis fertilibus declivioribus insulae lapideae et alibi frequens est. Floret Majo, Junio. 2 Занозка высокая. Russ. Sobol.

79. FESTUCA FLUITANS. Panicula ramosa erecta: spiculis subsessilibus teretibus muticis. (Radiculi verticillati ad nodulos; glumae virideſcentes, margine albo, decemflorae, antherae rubentes.) (G.) Fl. dan. t. 237.

In ductibus aquarum, et paludibus frequens. Floret tota aestate. 2 Занозка пловучая. Sob. vel манная трава. Russ.

BROMUS. Calyx bivalvis multiflorus. Spicula oblonga teres diſticha; ariſta infra apicem valvulae majoris.

80. BROMUS SECALINUS. Panicula patente: spiculis ovatis, compreſſis; glumis nudis diſtinctis; ariſtis subulatis brevioribus subflexuoſis. (Vaginae foliorum villoſae, nodis faſcia atrorubris, spiculis teretibus lanceolatis, petalo interno truncato ciliato.) (G.) Leers fl. herb. t. 11. f. 2.

Habitat in agris Pargelovii, Oſinovae Roſchzae, et Ligovi, aliisque. Floret Junio, Julio. ☉ Овсецъ ſive костеръ, костеръ аржаный. Russ. Sob.

81. BROMUS MOLLIS. Panicula erectiuscula: spiculis ovatis pubescentibus, ariſtis rectis, foliis molliſſime villoſis. (Piloſulus; spiculae sexflorae aut decemflorae, glumae virides margine albo, antheris flavis.) (Sob.) Schreb. gram. 60. t. 6.

Habitat ad sepes horti Nosocomialis petropolitani, et in arvis Pargelovii, aliisque. Floret Majo, Junio. ♂ Костеръ мягкій. Russ. Sobol.

82. BROMUS SQUARROSUS. Panicula nutante: spiculis ovatis; aristis divaricatis. (In spicula matura aristae divergunt.) (Sob.) Scheuchz. gram. t. 5. f. 11.

Crescit Pargelovii, Murinae, Ligovii, et Crasnoselii, ad vias agrorum satis copiose. 2 Костеръ чешуйчатый. Russ. Sob.

83. BROMUS ARVENSIS. Panicula nutante, ſpiculis ovato-oblongis; glumae ventricoſae, amplae. (Sob.) Fl. dan. t. 293.

In arvis prope Sarſcoje ſelo, ad montem Pulcovum, et circa Craſnoy cábac. Floret Junio, Julio. ☉ Костерь полевый. Russ. Sobol.

84. BROMUS TECTORUM. Panicula nutante: ſpiculis linearibus, pedunculis piloſis. (R.) Leers fl. herb. t. 10. f. 2.

Habitat in montoſis Pargelovii, Murzincae et Ribaczia, rarius. Floret Junio, Julio. ♂ Костерь кровельный. Russ. Sobol.

85. BROMUS GIGANTEUS. Panicula nutante: ſpiculis quadrifloris; ariſtis brevioribus. (Folia longa lataque plana, racemi binati; ariſtae quatuor aut quinque crispatulae albidae. Varietas glabra minor, villoſa major. Spiculae ſaepius triflorae. Ariſtae capillares.) (Sob.) Schreb. gram. t. 11.

Habitat in monte umbroſo Pulcovo, et in ſylvis prope urbem Gátzinam atque in monte Duderovo. Floret Julio, Auguſto. ♃ Костерь великанскій. Russ. Sob.

AVENA. Caſyx bivalvis multiflorus: corolla oblonga, ariſta dorſali contorta geniculata.

86. AVENA ELATIOR. Paniculata, calycibus bifloris, floſculo hermaphrodito ſubmutico, maſculo ariſtato. (R. Sob.) Fl. dan. t. 165. (Planta

polygama, ad Holcos a nonnullis recentioribus relata.)

Ad margines ſylvarum ab agris remotarum prope Craſnoy cabac et Ligovo, occurrit rarius. Floret Julio. ♃ Овесъ высокій. Russ. Sobol.

87. AVENA FATUA. Paniculata, calycibus trifloris: floſculis omnibus ariſtatis baſique piloſis. (Folia quinquenervia, glumae internae coſtis octo aut novem; ariſta longiſſima, antheris flaveſcentibus. (G.) Schreb. gram. t. 15.

Habitat inter ſegetes. Floret Junio, Julio. ☉ Овесъ дикій. Russ. ſive овесъ приторный. Sob.

AVENA PUBESCENS. Subſpicata, calycibus ſubtrifloris baſi piloſis, foiiis planis pubeſcentibus. (R. Sob.) Leers fl. herb. t. 9. f. 2.

In pratis humidis infulae lapideae, et circa montem Duderovium. Floret Junio. ♃ Овесъ мохнатый. Russ. Sob.

89. AVENA PRATENSIS. Subſpicata, calycibus quinquefloris. (Spiculis ſubſeſſilibus, floſculis baſi minus piloſis (G.) Leers fl. herb. t. 9. f. 1. Prope viam Schliſſelburgenſem ad officinas lateritias in pratis argillaceis, et inſula lapidea, nec non ad viam Wiburgenſem. Floret Junio, ♃ Овесъ луговый. Russ. Sob.

ARUNDO. Calyx bivalvis, multiflorus. Floſculi lana cincti, congeſti, Semen 1. pappoſum.

90. ARUMDO PHRAGMITES. Calycibus quinquefloris, panicula laxa. (G.) Leers fl. herb. t. 7. f. 1.

In lacubus et fluviis ad ripas paſſim. Floret Julio, Augusto. ♃ Тростникъ простой. Russ. Sobol.

91. ARUNDO EPIGEJOS. Calycibus unifloris, panicula erecta, foliis ſubtus glabris, attenuatis ſubconvolutis. Floſculis confertis. Panicula ſpadiceo-viridi. (Sob.)

Habitat in locis elevatis arenoſis et ſylvoſis paſſim. Floret Julio. ♃ Тростникъ земный. Russ. Sobol.

92. ARUNDO CALAMAGROSTIS. Calycibus unifloris, laevibus, corollis lanuginoſis, culmo ramoſo. (G.) Fl. dan. t. 280.

Ad ripas Nevae fluvii frequens eſt. Floret Julio. ♃ Тростникъ береговый. Russ. Sobol.

93. ARUNDO ARENARIA. Calycibus unifloris, foliis involutis mucronato pungentibus. (G.) Mart. Flor. ruſtic. t. 31. filiformis.

Habitat in ripa arenoſa inſulae Petri, et in inſula baſileenſi prope portum triremium. Floret Julio. ♃ Тростникъ песочный.

LOLIUM. Calyx monophyllus, fixus, multiflorus; ſpiculae alternae.

94. LOLIUM PERENNE. Spica mutica: ſpiculis compreſſis multifloris. (Spica plerumque ſexflora,

flore calyce longiore.) (G.) Fl. dan. t. 747.
Habitat in apricis et elevatis locis Murinae, Pargelovii et circa Sarſcoje ſelo, et Craſnoje ſelo. Floret Junio, Julio. ♃ Плевелъ многолѣтній. Russ. Sobol.

95. LOLIUM TEMULENTUM. Spica ariſtata, ſpiculis compreſſis multifloris, radice annua. (Culmi erecti ſcabri, nodis tribus aut quatuor; folia apice marcido fuſceſcente, graminea lata; rachis ſubtortilis; ſpiculae quatuor aut novemflorae; ſemen fuſcum latere altero gibbo.) (G.) Fl. dan. t. 160.
Habitat in agris inter hordeum et linum prope Sarſcoſelo, et Craſnoje ſelo, atque Pargelovii. Floret Junio. ☉ Плевелъ пьяный. Russ. Sobol.

ELYMUS. Calyx lateralis, bivalvis aggregatus, multiflorus.

96. ELYMUS ARENARIUS. Spica erecta arcta: calycibus tomentoſis floſculo longioribus. Foliis mucronato pungentibus, glaucis. (G.) Schreb. gram. t. 40.

Habitat in locis arenoſis. Maxima in copia occurrit in ripa maritima Strelinae, Oranienbaumii, et in ſuperiori regione Nevae fluvii ſupra cataractam. Floret Junio. ♃ Волоснецъ песочный. Russ. Sobol.

97. ELYMUS SIBIRICUS. Spica pendula arcta, ſpiculis binatis calyce longioribus. (Sob.) Schreb. gram. t. 21. f. 1.

Habitat in quantitate in ſylva umbroſa humidaque montis Pulcovi. Floret Julio. ♃ Волоснецъ сибирскій. Russ. Sob.

98. ELYMUS CANINUS. Spica nutaute arcta: ſpiculis rectis involucro deſtitutis: infimis geminis. (Involucra multiſeta, ſpicae ſex aut ſeptemflorae, petala ariſtata, gluma longiora.) (G.) Leers fl. herb. t. 12. f. 4.
Habitat in ſylvis montanis circa Duderovo, et in monte Pulcovo. Floret Junio, Julio. ♃ Волосненъ собачій. Russ. Sobol.

TRITICUM. Calyx bivalvis, ſubtriflorus, ſolitarius. Flos obtuſiuſculus ſubariſtatus, acutus.
99. TRITICUM REPENS. Calycibus quadrifloris ſubulatis acuminatis., foliis planis. Floſculi ſubmutici, receptaculo glabro. Admodum variat ſpiculis trifloris aut octofloris: ſubquadrifloris; breviter ariſtatis, aut inermibus. Colore glauco. (G.) Flor. dan. t. 748. Gramen officinarum.

Ubique in hortis oleraceis, et ad vias frequens eſt. Floret Junio, Julio. ♃ Пырей, Russ. пшеница ползучая. Sobol.

TRIANDRA TRIGYNIA.

MONTIA. Calyx diphyllus. Corolla monopetala, irregularis. Capſula unilocularis, bivalvis. Calyx ſaepe foliolis tribus. Stamina tria vel quinque.
100. MONTIA FONTANA. Foliis oblongo-ovatis ſubcarnoſis, pedunculis unifloris, fructiferis deflexis. (G.) Fl. dan. t. 131.
In aquis ſtagnantibus circa fabricam pyriam ochtenſem et ad rivulos, frequens eſt. Floret Majo, Junio. ☉ Мокричникъ ручейный. Russ. Sob.

CLASSIS IV.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

GLOBULARIA. Calyx communis, imbricatus, proprius tubulatus, quadridentatus aut quinquedentatus, inferus. Corollulae labio ſuperiore bipartito. Receptaculum paleaceum. Semen unicum superum nudum.

101. GLOBULARIA VULGARIS. Caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis: caulinis lanceolatis. (Foliis imbricatis lanceolatis.) (G.) Gaertn. de fr. et ſem. 3. t. 44. f. 11.

In pratis ſiccis et arvis ad fluvium Lugam. Floret Majo, Junio. 2| Клубочникъ обыкновенный. Russ. Sobol.

SCABIOSA Calyx communis polyphyllus; proprius duplex ſuperus. Receptaculum paleaceum vel nudum, duplicatum, lignoſum, ſemen involvens.

102. SCABIOSA SUCCISA. Corollulis aequalibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ovatis. (Receptaculum paleaceum, ariſtulae quatuor nigricantes.) (G.) Fl. dan. t. 279.

Creſcit in pratis humidis ſylvoſis argilloſisque, ad montem Poclonnaja, circa flavium Ochtam ad fabricam pyriam; nullibi tamen majori in co-

pia, quam inter Strelinam et pagum Rjumca. Floret Julio, Auguſto. ♃ Отдышная трава, Russ. свербѣжница подкушеная. Sob.

103. SCABIOSA ARVENSIS. Corollis radiantibus, foliis ſuperioribus pinnatifidis, incifis, caule hiſpido. (Calyces decem-ariſtati, receptacula piloſa. Variat foliis pinnatis, seu bipinnatis, integris; floribus plus minusve purpuraſcentibus, caeruleſcentibusve, vel albis. G.) Fl. dan. t. 447.

In arvis et pratis elevatis ficcis ubique frequens eſt, praecipue in monte Poclonnaja, et Pulcova. Floret Junio, Julio. ♃ Свербѣжница полевая. Russ. Sob.

104. SCABIOSA SYLVATICA. Corollulis quadrifidis radiantibus, foliis omnibus indiviſis ovato-oblongis ſerratis, caule hiſpido. Caules ſuperne plerumque dichotomi; folia conjugata ampla, utrinque villoſa, venoſa, acumine longo terminato; pedunculi longiſſimi; flores purpuraſcentes; antherae caeruleae; receptaculum villoſum. Variat flore albo, ſimillima arvenſi. (B. Sob.) Iacqu. fl. auſtr. 4. t. 362.

Habitat in ſylvis, et campis circa Oranienbaum, et Oſinova Roſchcza, ſed parce. Floret Julio. ♃ Свербежница лѣсная. Russ. Sobol.

ASPERULA. Corolla infundibuliformis, limbo tripartito aut quadripartito. Semina duo, globoſa, ſuberoſa, tecta.

105. ASPERULA LAEVIGATA. Foliis quaternis ellipticis enervibus laeviuſculis, pedunculis di-

varicatis trichotomis, feminibus ſcabris. (Cum β Galio rotundifolio. Foliis ovatis quaternis, obtuſis aculeato-ciliatis, feminibus hiſpidis. Caules procumbentes ramoſiſſimi; folia trinervia, aſpera, ciliata; flores paniculati, racemulis dichotomis, pedunculis capillaribus, albi.) (Sob.) Boccon. mus. t. 11. f. 5. Iacq. fl. auſtr. 1. t. 94. Galium rotundifolium. Gort.

Habitat in ſylvis ficcioribus Pargelovii, et in monte Pulcovo, et paſſim in locis elevatis umbroſis. Floret Julio, et Auguſto. ♃ Шерошница гладколистая. Russ. Sob.

GALIUM. Corolla monopetala campaniculato-rotata, brevis quadripartita aut tripartita. Semina duo globoſa, infera, ſuberoſa, integumento tecta. (Floribus omnibus hermaphroditis, Galium eſt; floribus nonnullis maſculis, Vaillantia.)

106. GALIUM PALUSTRE. Foliis quaternis obovatis inaequalibus, caulibus diffuſis, (Caulis flaccidus, diffuſus.. Folia quatuor aut quinque ſubreflexa. Antherae nigreſcunt.) (G.) Fl. dan. t. 428.

In ſylvis humidis et paludibus. Floret Junio, Julio. ♃ Подмаренникъ болотный. Russ. Sobol.

107. GALIUM TRIFIDUM. Foliis quaternis linearibus, caule procumbente ſcabro, corollis trifidis. Fl. dan. t. 48. (Stam. 3.)

In deſcriptione Gubernii Petropolitani celeb. Ge-

orgi dicitur creſcere circa Petropolim, afferente clar. Rudolpho, quod hucusque verificare non contigit; adeoqne dubito an hic datur, nam ceterum eſt planta canadenſis ſecundum Lin. Spec. plant· 158. Подмаренникъ тройчатый. Russ. Sobol.

108. GALIUM ULIGINOSUM. Foliis ſenis lanceolatis retrorſum ſerrato-aculeatis mucronatis rigidis, corollis fructu majoribns. (Caulis erectus rigidus. Folia sex aut septem linearia, ſcabra.) (G.) Schrad. Spicil. fl. german. p. 17. t. 1. f. 1. Barrel. pl. rar. ic. 82.

Creſcit ad rivulos prope viam a Sarcoſelo ad Craſnoſelium ducentem, et margines ſylvarum, et in vicinis urbis Jamburgi Floret Junio, Julio. 2 Подмаренникъ ручейный. Russ. Sobol.

109. GALIUM SPURIUM. Foliis ſenis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis ſimplicibus, fructibus recurvatis. (Caulis craſſiusculus pallidus flaccidus. Folia ſex aut novem Fructus majuſculi ſcabri reflexi.) (B. S.) Vaillant. fl. paris. t. 4. f. 3. Affine Gal. Aparines, ſed minus.

Inter ſegetes circa montem Duderovium et urbem Iamburgum. Floret Iulio. ⊙ Подмаренникъ пашенный. Russ. Sobol.

110. GALIUM VERUM. Foliis octonis linearibus ſulcatis, ramis floriferis brevibus, (floribus parvis flavis.) Antherae defloratae fiunt fuſcae· Folia nitida, margine revoluta, quoad diverſum

in caule ſitum numero variant. (G.) Blackw. herb. t. 435. Regn. bot. t. 23.

In patis elevatis Pargelovii, Oſinovae Roſchczae, Craſnoſelii, et ad fluvium Lugam, paſſim. Floret Junio, Julio. ♃ Млекоссѣдь ſive подмаренникъ настоящій. Russ. Sob.

111. GALIUM MOLLUGO. Foliis octonis ovato-linearibus ſubſerratis patentiſſimis mucronatis, caule flaccido: ramis pateutibus. (Folia obverſe ovata, emarginata, apice rotundata, ſpinoſo denticulata: caulis ramoſiſſimus.) (G.) Fl. dan. t. 455.

Creſcit in inſula lapidea, et rotunda, tum in monte Poclonnaja et paſſim in montoſis ſylvaticis. Floret Junio, Julio. ♃ Подмаренникъ мягкій. Russ. Sob.

112. GALIUM GLAUCUM. Foliis verticillatis linearibus, pedunculis dichotomis, caule laevi. (Caules flexuoſi, ſupra nodos incraſſati, trichotomi, ramis ultimis flores tres aut quinque albos umbellatim gerentibus. Folia verticillata, ſex aut octo ſuperne, ad ramos, duo, facie glaberrima. (G.) Iacq. flor. auſtr. 1. t. 81.

Habitat in pratis elevatis ficcioribus, apricis ad montem Pulcovum et in ſimilibus locis inter Polytricha. Floret Julio. ♃ Подмаренникъ сизый Russ. Sobol.

113 GALIUM BOREALE. Foliis quaternis lanceolatis trinerviis glabris, caule erecto, ſeminibus hiſ-

pidis. (Folia ſubtus ſcabra. Paniculae rami diphylli, floribus albis. Tota planta ſubaſpera eſt.) (G.) Sowerb. engl. bot. t. 105.

In pratis ſiccis inſulae rotundae in monte Poclonnaja, Pargelovii, atq. in monte Pulcovo, paſſim. Floret Junio, Julio. 2 Подмаренникъ сѣверный. Russ. Sob.

114. GALIUM APARINE. Foliis octonis lanceolatis: carinis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis. (Floribus paniculatis, fructibus hiſpidis.) (G.) Fl. dan. t. 495.

Ad fluvium Lugam circa pagum Howſkaja, circa pagum Ribaczia, et paſſim in hortis Strelinae et Petropoli. Floret Junio. ☉ Подмаренникъ шероховатый, vel царапница. Russ. Sob.

PLANTAGO. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida: limbo reflexo. Stamina longiſſima. Capſula bilocularis, circumſciſſa, ſupera.

115. PLANTAGO MAJOR. Foliis ovatis glabris, ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis. (Folia ſeptemnervia; flores rubelli, lana ferruginea; capſula trilocularis; triſperma.) (G.) Flor. dan. t. 461.

Ad viat paſſim, unde Ruſſice Попутникъ dicitur. Floret tota aeſtate. 2 подорожникъ vel попутникъ большій. Sob.

116. PLANTAGO MEDIA. Foliis ovato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti. (Capſula monoſperma. β Varietas hirſuta, minor.) (G.) Flor. dan. t. 581.

In ſylva inſulae apothecariae, tum in aliis pratis ſylvoſis, argilloſis, uti in monte Pulcovo, et ad Sarſcoſelium, ſed parce. Floret Majo, Junio. ♃ Попутникъ vel подорожникъ средній. Russ. Sob.

117. PLANTAGO LANCEOLATA. Foliis lanceolatis, ſpica ſubovata nuda, ſcapo angulato. (Folia ſeptemnervia, antherae albae.) (G.) Fl. dan. t. 437.

Ubique in pratis, et ad ductus aquarum et vias copioſe provenit, Floret Junio, Julio. ♃ Попутникъ vel подорожникъ узколистый. Russ. Sobol.

118. PLANTAGO MARITIMA. Foliis ſemicylindricis integerrimis baſi lanatis, ſcapo tereti. (Folia canaliculata.) (G.) Fl. dan. t. 243.

Habitat ad ripam ſabuloſam maritimam ſinus Cronſtadienſis 17, verſtas ab urbe, et prope Peterhoffium atque Oranienbaum. Floret Junio, Julio. ♃ Попутникъ vel подорожникъ приморскій. Russ. Sob.

CENTUNCULUS. Calyx quadrifidus. Corolla quadrifida rotata patens. Stamina brevia. Capſula unilocularis circumſciſſa.

119. CENTUNCULUS MINIMUS. (Foliis alternis ovatis. Corolla breviſſima albida.) (P.) Fl. dan. t. 177.

In locis verno tempore inundatis, arenoſis aeſtate ſiccis, in parte Wiborgenſi et Catharinhoſii. Floret Julio. ☉ Сошенникъ малѣйшій. Russ. Sobol.

CORNUS. Involucrum tetraphyllum ſaepius, ſive nullum. Calyx quadridentatus, deciduus. Petala ſupera quatuor. Drupa ſucculenta, infera bilocularis: officula ſolitaria.

120. CORNUS SUECICA. Herbacea, ramis binis. (G.) Fl. dan. t. 6.

Habitat in ſylva circa oſtium Lugae fluvii. Floret Julio. ♃ Деренъ травчатый. Russ. Sobol.

ALCHEMILLA. Calyx octofidus. Corolla nulla. Stylus ad baſim germinis. Semen unicum, vel duo calyce veſtita.

121. ALCHEMILLA VULGARIS. Foliis lobatis, (lobis dentatis. Stigma rotundum, ſplendens.) (G.) Fl. dan. t. 693.

Ubivis in pratis et ſylvis cultis copioſiſſime. Variat. β minor. in pratis et paſcuis ſiccioribus montoſis. Floret Junio, Julio. ♃ Львиная лапа, vel росникъ обыкновенный. Russ. Sobol.

TETRANDRIA DIGYNIA.

CUSCUTA. Calyx quadrifidus aut quinquefidus. Corolla monopetala quadrifida, ovata. Capsula bilocularis, circumscissa. Semina· Gemina.

122. CUSCUTA EUROPAEA. Floribus sessilibus quadrifidis, (congestis, caule tetragono.) (G.) Fl. dan. t. 199. Planta parasitica.

Habitat in sylvis umbrosis, circa viam Strelinae, et Catharinhofli, Lupulum, Urticam aliasque plantas obvolvens. Floret Julio. ☉ Повилица, sive крапивная малина. Russ. повилица европейская. Sobol.

TETRANDRIA TETRAGYNIA.

POTAMOGETON. Calyx nullus. Petala quatuor. Stylus nullus stigmata obtusa. (Drupae quatuor uniloculares Semina quatuor uncinato-acuminata gibba.

123. POTAMOGETON NATANS. Foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus. (G.) Mill. illustr. icon.

In stagnis Catharinhofii, insulae lapideae et ramis minoribus fluvii Nevae. nec non in paludibus. Floret Junio. 2

P. β Varietas; foliis lanceolato oblongis petiolis longioribus. (Sob.) Invenitur in lacu prope

montem Duderovium, et in initio canalis Ligovii. Floret Junio. 2 Рдестъ, vel жалга пловущая. Russ.

124. POTAMOGETON PERFOLIATUM. Foliis cordatis amplexicaulibus. (G.) Flor. dan. t. 196.

Ubivis in locis vadofis Nevae fluvii et finus Cronftadienfis. Floret Junio. 2 Рдестъ vel жалга сквозьлистная. Russ. Sob.

125. POTAMOGETON LUCENS. Foliis longiffime lanceolatis feffilibus, fuperioribus oppofitis. (Folia pellucida venofa.) (G.) Flor. dan. t. 195.

Habitat in ramis fluvii Nevae, praecipue in ramis ejus lente fluentibns. Floret Iunio, Iulio. 2 Рдестъ, vel жалга блестящая. Russ. Sob.

126. POTAMOGETON CRISPUM. Foliis lanceolatis alternis oppofitisve undulatis ferratis. (Caulis compreffus dichotomus.) (G.) Fl. dan. t. 927.

Crefcit cum Potamogetone perfoliato in ramis Nevae fluvii.. Floret Iunio. 2 Рдестъ, vel жалга кудрявая. Russ. Sobol.

127. POTAMOGETON GRAMINEUM. Foliis lineari-lanceolatis alternis feffilibus ftipula latioribus. (G.) Flor. dan. t. 222.

In fluvio Luga ad pagum Howfkaja, et in rivulo prope Goreloy cabac fluente. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Рдестъ, vel жалга узколистая. Russ. Sobol.

128. PETAMOGETON PUSILLUM. Foliis linearibus oppoſitis alternisque diſtinctis baſi patentibus, caule tereti. (G.) Vaill. fl. paris. t. 32. f. 4.

Habitat in paludibus prope officinas lateritias, et in fluviis Ochta, atque Lupa ad fabricam pyriam Ochtenſem profluentibus. Floret Majo, Iunio. ☉ Рдестъ, vel жалга маленькая. Russ. Sobol.

SAGINA. Calyx tetraphyllus. Patala quatuor. Capſula unilocularis, quadrivalvis, polyſperma. Variat petalis nullis.

129. SAGINA PROCUMBENS. Ramis procumbentibus. (Petala calyce multo minore, fugaciſſima. Capſula ſaepius quinquevalvis, tum ſtyli quinque, ſemper quadrilocularis.) (G.) Curtis fl. Londin. t. 158.

In pratis montoſis et ſylvis. Pargelovii, Oſinovae roſchczae et ad ſegetes Ligovi, et Craſnoſelii copioſe creſcit. Floret Iunio, Iulio. 2 Жируха лежачая. Russ. Sobol.

130. SAGINA ERECTA. Caule erecto ſubunifloro. (Foliis lineari-lanceolatis. Calyx clauſus, foliolis lanceolatis acuminatis. Capſpla ovata unilocularis, univalvis, ore plerumque decemdentato.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 845.

Habitat ad ripam lacus Pargelovii, ad rivulos Dranici, tum circa urbem Iamburgum, et multis

aliis locis humidis declivibus. Floret Iunio. ☉ Жируха стоячая. Russ. Sobol.

CLASSIS V.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

MYOSOTIS. Corolla hypocrateriformis, quinquefida, emarginata: fauce clauſa ſquamulis fornicatis. Nuces quatuor imperforatae.

131. MYOSOTIS PALUSTRIS. Seminibus laevibus. calycibus obovalibus obtuſis glabris, corollae tubum aequantibus, foliis lanceolatis, (ſubtus glabris, ſubligulatis, calycibus patulis.) (Sob.) Knorv. del. hort. 1. tab. 1.

Habitat in inſula apothecaria ad ripas Nevae fluvii et paſſim ad ductus aquarum. Fforet Majo, Iunio. ♃ Мышье ушко. Russ. болотное. Sobol.

132. MYOSOTIS ARVENSIS. Seminibus laevibus calycibus ovalibus auuminatis hirſutiſſimis tubo corollae longioribus clauſis, foliis ovato-lanceolatis. (Caulis tetragonus uniflorus, ramoſiſſimus. Flores utrique, olim Myoſoti ſcorpioidi, carneo-caeruleove albidi, folia apice calloſula.

Variat, calycibus patulis.) (G. Sob.) Fl. dan. t. 58.

Creſcit ubique in agris et arvis, tum in hortis oleraceis in parte Peterburgenſi et ad ſepes hortorum. Floret Majo, Iunio. ☉ Мышье ушко полевое. Russ. Sob.

133. MYOSOTIS LAPPULA. Seminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis. (Caule elongato baſi piloſo, tereti paniculato ſcabro. Floribus ſubſeſſilibus.) (G.) Elor. dan. t. 692.

In ruderatis a parte Peterburgenſi circa portum Gagarinum, et ad ſepes hortorum parce occurrit. Sobol Floret Majo, Junio. ☉ Мышье ушко репейчатое. Russ. Sobol.

LITHOSPERMUM. Calyx quinquepartitus. Corolla infundibuliformis, tubo longo gracili, fauce perforata nuda. Stigma bifidum. Nuces quatuor lapideae, imperforatae.

134. LITHOSPERMUM OFFICINALE. Seminibus laevibus, corollis vix calycem ſuperantibus, foliis lanceolatis. (Flores albi, axillares, vix pedunculati, ad baſin angulorum foveola.) (B. R.) Gaertn. de fr. et Sem. Cent. 5. t. 67. Lithoſpermum officinarum.

Habitat ad vias agrorum circa Petropolim parce. Floret Iunio. ♃ Воробейникъ vel Каменное семя аптекарское. Russ.

135. LITHOSPERMUM ARVENSE. Seminibus

rugoſis, corollis vix calycem ſuperantibus. (Radix rubra, flos albus, flauicans, ſolitarius in racemo terminali folioſo.) (G.) Flora dan. t. 456.

Habitat inter ſegetes et ad vias agrorum in Koirowa, et prope montem Duderovium. atque Pargelovii. Floret Junio. ☉ Воробейникъ полевый. Russ. Sobol.

ANCHUSA. Corolla infundibuliformis, fauce clauſa ſquamulis fornicatis, tubo baſi ſubpriſmatico. Nuces quatuor uniloculares, baſi perforatae.

136. ANCHUSA OFFICINALIS. Foliis lanceolatis, ſpicis imbricatis ſecundis. (Calycibus quinquepartitis.) (G.) Flor. dan. t. 572. Bugloſſum officinarum.

In locis ruderatis et hortis paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Воловый языкъ. Russ. ſive Воловикъ аптекарскій. Sobol.

137. ANCHUSA ANGUSTIFOLIA. Racemis ſubnudis conjugatis. Calycibus quinqnefidis. (B.) Morif. hiſt. plant. 3. t. 26. f. 4.

In arvis arenoſis circa Jamburgum. Floret Majo, Iunio. ♃ Воловикъ узколистый. Russ. Sobol.

138. ANCHUSA TINCTORIA. Tomentoſa, foliis lanceolatis obtuſis, ſtaminibus corolla brevioribus. Corolla lutea. (B.) Regn. bot. t. 34. Alcanna ſpuria, offic.

Habitat rarius in pratis ſiccis arenoſis circa Jamburgum. Floret Iunio, Iulio. ♃ Воловикъ красильный. Russ. Sobol.

CYNOGLOSSUM. Corolla (plurimis) infundibuliformis: fauce clauſa ſquamis fornicatis. Semina depreſſa, interiore tantum latere ſtylo affixa. Nuces quatuor depreſſae, imperforatae. Receptaculum ſubulatum.

139. CYNOGLOSSUM OFFICINALE. Staminibus corolla brevioribus, foliis lato-lanceolatis, tomentoſis ſeſſilibus. (Caule ramoſo, capſulis echinatis.) (G.) Blackw. herb. t. 249. Cynogloſſum officinar.

Habitat in monte Duderovo, et in ejus viciniis herboſis, montoſis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Собачій языкъ. Russ. vel собачникъ аптекарскій. Sob.

PULMONARIA. Corolla infundibuliformis, fauce pervia, villis conniventibus. Calyx priſmatico-pentagonus, aut abbreviatus. Stigma plerumque bifidum.

140. PULMONARIA OFFICINALIS. Foliis radicalibus ovato-cordatis ſcabris, (decurrentibus maculis demum albis. Folia caulina ovato-oblonga.) (G.) Fl. dan. t. 482. Pulmonaria maculoſa officinarum.

Creſcit in ſylvis Pargelovii, Oſinovae rolchczae, Murzincae, et copioſiſſime in monte Duderovo. Floret Aprili, Majo. ♃ Медуница аптекарская. Russ. Sob.

SYMPHITUM. Corolla infundibuliformis, ſuperne ventricoſa, fauce clauſa, radiis conicis fiſtuloſis

extus ſub limbo foramine hiantibus. Nuculae quatuor perforatae. Stamina, paleas inter patentes, antheris fagittatis.

141. SYMPHITUM OFFICINALE. Foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. (Caule alato, corollis rubris, ſive violaceis.) (G.) Fl. dan. t. 664. Conſolida mojor offic.

Ad fluvium Wolchow ſupra pagum Tſchortovo nihil hac planta copioſius alias nuſquam viſa. Floret Iunio, Iulio, Auguſto. 2 Лошаково ухо, vel сальной корень. Russ. сальница аптекарская. Sob.

LYCOPSIS. Corolla infundibuliformis, tubo incurvato: fauce clauſa ſquamis quinque. Nuces quatuor perforatae.

142. LYCOPSIS ARVENSIS. Foliis lenceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. (Folia undulata deuticulata hispida, flores caerulei, calycem excedentes.) (G.) Blackw. herb. t. 234.

Habitat inter ſegetes ad Goreloy Cabac, et Craſnojeſelo, nec non in ripa arenoſa Nevae fluvii in inſula baſileenſi. Floret Majo. ☉ Кривошейка полевая. Russ.

ECHIUM. Corolla iregularis, quinqueſida, fauce nuda. Nuces quatuor gigantoideae, ſcabrae imperforatae. (Stamina inaequalia.)

143. ECHIUM VULGARE. Caule tuberculato hiſpido, maculato, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus, (axillaribus.) (G.) Fl. dan. t. 445.

Habitat in diſtrictu coporienſi, ad vias et paſſim inter ſegetes Craſnoſelii. Admodum variat. Floret Iunio, Iulio. ♂ Румянка обыкновенная. Russ. Sob.

ANDROSACE. Involucrum umbellulae. Corollae hypocrateriformis tubus ovatus: ore glanduloso. Capsula unilocularis, globosa, apice quinquefariam dehiscens, polysperma.

144. ANCROSACE MAXIMA. Perianthiis fructuum maximis. (Rosulae foliorum supra medium serratulorum. Scapi nudi pedunculis umbellatis; folia involucri coriacea, acuminata, flores albi, limbo flavido.) (B.) Iacq. Fl. austr. V. 4. t. 331.

Habitat in agris cultis circa urbem Narvam. Floret Aprili, Majo. ☉ Твердочашечница большая. Russ. Sobol.

145. ANDROSACE SEPTENTRIONALIS. Foliis lanceolatis dentatis glabris, perianthiis angulatis corolla brevioribus. (Scapi elongati, umbellae breves.) (G.) Fl. dan. t. 7.

Habitat in monte Pulcovo, et in montosis fluvii Narvae ripis. Floret Aprili, et Majo. ☉. Твердочашечница сѣверная. Russ. Sobol.

PRIMULA. Involucrum umbellullae. Corollae tubus cylindricus: ore patulo. Stigma globosum. Capsula unilocularis, apice decemdentato, dehiscens, polysperma. (Calyx tubulatus pentagonus.)

146. PRIMULA OFFICINALIS. (Primula officin. veris). Foliis dentatis rugosis, scapis multifloris, floribus omnibus nutantibus, corollarum limbo concavo. (G.) Fl. dan. t. 433.

Habitat in sylvis umbrosis, insulae Petri, Pargelovii, Paedii Murzincae, Montis Pulcovi, et co.

pioſiſſima in monte Duderovo. Floret Majo. ♃ Буквица белая. Russ. vel первоцветъ аптекарскій. Sobol.

MENYANTHES. Corolla hirſuta, cylindrico-infundibuli-formis. Nectaria quinque ad baſin germinis. Stigma bilobum. Capſula unilocularis.

147. MENYANTHES TRIFOLIATA. Foliis ternatis, corollae laciniis margine integris, ſuperne barbatis. (G.) dan. t. 541.

Creſcit in inſula apothecaria et ubivis in paludibus vulgatiſſima planta eſt. Floret Majo, Iunio. ♃ Трилистникъ водяный, vel Вахта. Russ. вахта трилистная. Sobol. Trifolium fibrinum officinar.

HOTTONIA. Corolla hypocrateriformis. Stamina tubo corollae impoſita. Stigma globoſum. Capſula unilocularis.

148. HOTTONIA PALUSTRIS. Pedunculis verticillato-multifloris. (Scapus fiſtuloſus, folia 5-6 ſetacea pinnata verticillata, ſub aqua; calycis laciniis anguſtiſſimis. Corollae albae.) G.) Fl. dan. t. 487.

Creſcit copioſiſſime in inſulae lapideae foſſis, et circa Petropolim in paluſtribus umbroſis. Floret Majo, Iunio. ♃ Готтонка болотная. Russ. Sobol.

LYSIMACHIA. Corolla rotata plana. Stylus perſiſtens, ſtigmate obtuſo. Capſula globoſa mucronata, unilocularis, 5-10 valvis, polyſperma.

149. LYSIMACHIA VULGARIS. Paniculata: racemis terminalibus. (Pedunculis multifloris. Stamen unum caeteris longius, basi omnia connata. Corolla glandulosa, Folia lanceolata, oppositа bina terna, quaterna, patentia. Admodum variat.) (G.) Fl. dau. t. 689. Lysimachia lutea. officinar.

Habitat in nemoribus umbrosis et proventu herbarum fertilissimis, uti in insula lapidea, atque Catharinhofii. Floret Iunio, Iulio. 24 Вербейникъ, sive Лизимахія, Russ. Вербейникъ обыкновенный. Sob.

150. LYSIMACHIA THYRSIFLORA. Racemis lateralibus pedunculatis. (Densissimis. Flores congesti. flavi, rubromaculati.) (G.) Flor. dan. t. 517.

Nulla palus facile invenitur ubi haec non copiose proveniat, tam circa Petropolim, quam ad fluviam Wolchow. Crescit etiam ad ripas Nevae fluvii in insula apothecaria. Floret Iunio, Iulio. 24 Вербейникъ метелкоцветный. Russ. Sobol.

151. LYSIMACHIA NUMMULARIA. Pedunculis unifloris foliis subcordatis, floribus solitariis, caule repente. (Caulis tetragonus, foliolis calycis erecti-cordatis.) (G.) Flor. dan. t. 493. Nummularia officin.

Habitat in sylvis humidis umbrosis; Catharinhofii. Strelinae, in insula basileensi, ad ductum aqnarum Ladogensium, et ad fluvium Wolchow. Floret Iunio, Iulio. 24 Полушечная трава sive

Луговой чай. Russ. Вербейникъ полушечный. Sob.

CONVOLVULUS. Corolla campanulata, plicata. Nectarium corona germen basi ambiens. Stigmata duo. Capsula 2-3 locularis: loculis dispermis.

152. CONVOLVULUS SEPIUM. Caule volubili, foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. (Folia ore fusca; ambitus nectarii quinquedentatus, corolla nivea, cályce arctiori, bracteato.) (G.) Fl. dan. t. 458. Bracteae duae magnae.

Ad fluvium Lugam circa ostium Rossonae in ripis frequentissima planta est; alias uusquam obvia. Floret Iunio, Iulio. ♃ Повилица seu повиличные колокольчики. Russ. обвивальница заборная. Sobol.

POLEMONIUM. Corolla quinquepartita, rotata, fundo clauso valvis staminiferis. Filamenta basi dilatata, membranacea. Stigma trifidum. Capsula trilocularis, univalvis, supera. Semina angulata. (Planta dubia.)

153. POLEMONIUM CAERULEUM. Foliis pinnatis, floribus erectis, calycibus tubo corollae longioribus. (Variat floribus albis; stigmate bifido vel trifido.) (G.) Fl. dan. t. 255.

Habitat in sylvis, circa Strelina, et copiosissima in monte Duderovo. Floret Majo, Iunio. ♃

Грецкой булдыранъ. Russ. Брань синяя. Sobol.

CAMPANULA. Corolla campanulata fundo clauſo valvis ſtaminiferis. Filamenta baſi dilatata, fornicata. Stigma trifidum. Capſula infera tri, quinquelocularis, poris lateralibus dehiſcens.

154. CAMPANULA UNIFLORA. Caule unifloro, calyce corollam aequante. Caulis ſolitarius erectus, foliis laevibus. (G.) Flor. Lappon. t. 9. f. 5. 6.

Habitat in prato amoeniſſimo ad fluvinm Wolchow. (Folia lanceolata, leviſſime crenata, numero quatuor. Flos nutans.) Floret Junio, Iulio. 2l Колокольчикъ одноцвѣтный. Russ. Sobol.

155. CAMPANULA ROTUNDIFOLIA. Foliis radicalibus reniformibus, caulinis 2-3 floris, late campanulatis. (Varietates: minor et linifolia quae: foliis ſubhirſutis: radicalibus obovatis ſubrotundis ſerratis, caulinis confertis linearibus integerrimis, dentibus calycinis ſetaceis, flore nutante — a plerisque ſpecies habetur. Variat ſaepius ſpica ſecunda.) (G.) Curt. fl. Lond. t. 226.

In pratis ſylvoſis elevatis paſſim, ſed *a*, multo copioſior. Floret Julio. 2l Колокольчикъ кругълолистый. Russ. Sobol.

156. CAMPANULA PATULA. Foliis ſtrictis: radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula patula. (Caulis angulatus, ſcaber: folia villoſula crenata.

Segmenta calycis erecta, dentata.) (G.) Fl. dan. t. 373.

In pratis humidis ad ramum Nevae fluvii Tſchornaja retſchka in regione Viburgenſi, et paſſim. Floret Junio, Julio. ♂ Колокольчикъ розсыпной. Russ. Sobol.

157. CAMPAMULA PERSICIFOLIA. Foliis radicalibus obovatis, caulinis lanceolato-linearibus ſubſerratis ſeſſilibus remotis. (Tota glabra, caule paucifloro nunc angulato, nunc tereti, corolla dilute caerulea, ampla, laciniis patentibus, germine hirto. Ludit ſcabritie, glabritie, caulis florumque magnitudine. Folia ſeſſilia, inferiora ligulata, ſerraturae albidae.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 367.

Habitat in pratis ad fluvium Wolchow, et in ſylva inſulae apothecariae paulo ſupra oſtium rami Carpowca dicti. Item copioſe in pratis ab utraque parte viae quae Petropoli Peterhovium tendit 18, verstis ab urbe; tum in monte Pulcovo, et Duderovo. Floret Junio. 2 Колокольчикъ персиколистый. Russ. Sobol.

158. CAMPANULA RHOMBOIDEA. Foliis rhomboidibus ſerratis, ſpica ſecunda, calycibus dentatis. Capſulis glabris venoſis. (G.) Boccon. mus. t. 61. Variat floribus caeruleis et albis; planta tota ſubaſpera et glabra.

Habitat in ſylvis umbroſis Pargelovii, Oſinovae Roſchzae, montis Pulcovi, et in monte Duderovo copioſiſſime, cum ſuis varietatibus. Floret Junio, Julio. 2 Колокольчикъ углатолистый. Russ. Sobol.

159. CAMPANULA LATIFOLIA. Foliis ovato-lanceolatis, caule ſimpliciſſimo tereti, floribus ſolitariis pedunculatis, fructibus cernuis. (Lom.) Flor. dan. t. 782.

Habitat ad fabricam rudicenſem, in monte Pulcovo et Duderovo ſed parce. Floret Julio. 24 Колокольчикъ широколистый. Russ. Sobol.

160. CAMPANULA RAPUNCULOIDES. Foliis cordato-lanceolatis, ſerratis, caule ramoſo, floribus ſecundis ſparſis, calycibus reflexis. Variat floribus minoribus ſecundis. Folia ſeſſilia. (G.) Moris. hiſt. pl. 2. t. 4. f. 32.

In pratis ſylvoſis, cultis, prope fluvium Strelina. Floret Julio. 24 Колокольчикъ рѣпчатый. Russ. Sob.

161. CAMPANULA TRACHELIUM. Caule angulato, foliis cordato-lanceolatis, petiolatis, calycibus ciliatis, pedunculis trifidis. (axillaribus; calycibus hiſpidis. Corolla intus villoſa. Variat pedunculis unifloris.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 319.

Habitat in pratis montoſis, Pargelovii, Strelinae et in aliis locis ſimilibus maxima in copia. Floret Julio. 24 Колокольчикъ жестkій. Russ. Sobol.

162. CAMPANULA GLOMERATA. Caule angulato ſimplici, floribus ſeſſilibus, capitulo terminali. (axillaribus que. Folia ovoto-lanceolata ſerrata cauleque pericarpio que villoſa. Flores terni erecti conglomerati.) (G.) Herm. parad. bot. t. 235.

Per totum gubernium in pratis ſylvaticis montoſis vulgaris planta eſt. Floret Julio. 2 Примочная трава. Russ. Колокольчикъ сборный. Sobol.

163. CAMPANULA CERVICARIA. Hiſpida, floribus ſeſſilibus, capitulo-terminali, foliis lanceolatolinearibus undulatis, (hiſpidis: capitulis axillaribus terminalique. Caulis anguloſus, elongatus. Bracteae cordatae. Flores laterales ut plurimum tres, in faſciculo ſeſſili terminali, ſex aut octo in capitulo hemiſphaerico.) (G.) Fl. dan. t. 787.

Habitat in pratis argilloſis et arenoſis cira officinas lateritias, in tractu Schliſſelburgenſi, prope pagum Ribaczija, et ſylvis montoſis Strelinae. Floret Junio, et Julio. 2 Колокольчикъ оленній. Russ. Sobol.

LONICERA. Corolla monopetala, tubuloſa, irregularis, laciniis revolutis, una profundius ſeparata. Stigma obtuſo-capitatum. Bacca polyſperma, uni-trilocularis, infera.

164. LONICERA XYLOSTEUM. Pedunculis bifloris, baccis diſtinctis, foliis integerrimis pubeſcentibus. (Corollae albae filamentis ſtyloque villoſis. Flores exalbidi.) (G.) Flor. dan. t. 808.

In ſylvis ad Fabricam pyriam Ochtenſem, circa pagum Murino, Strelina et paſſim. Floret Majo, Junio. ♄ Жимолость обыкновенная, ſive жимолостникъ обыкновенный. Russ. Sob.

165. LONICERA CAERULEA. Pedunculis bifloris, baccis coadunatis globoſis, ſtylis indiviſis.

(Folia oppoſita, paribus decuſſantibus plerumque, gemmis ſubulatis rubentibus; perianthium quadridentatum ſetis duabus; corollae ochroleucae baſi bigibboſae, limbo ſub bilabiato, baccae nigro-caeruleae maculis lateralibus fuſcis. (Sob.) Jacq. flor. auſtr. v. 5. opp. t. 17.

Habitat in ſylvis montoſis, circa vicum Hoſtilitza in quantitate. Floret Majo, Junio. ♄ Живолость синяя. Russ. Sobol.

VERBASCUM. Corolla rotata, ſubaequalis. Stamina declinata, inaequalia, villoſa. Stigma obtuſum. Capſula bilocularis, bivalvis, diſſepimento alato, polyſperma.

166. VERBASCUM THAPSUS. Foliis decurrentibus utrinque tomentoſis, caule ſimplici, ſtigmate globoſo. (Spica longiſſima denſiſſima; bracteis floribus aequantibus.) (G.) Flor. dan. t. 361.

Habitat ad ductum aquarum Ladogenſium et circa montem Duderovium in locis arenoſis. Floret Julio. ♂ Царскій скипетрь, ſive медвѣжье ухо. Russ.

167. VERBASCUM NIGRUM. Foliis cordato-oblongis petiolatis. (Caule ramisque laxe denſeque ſpicatis, foliis utrinque villoſis, corollis maculis rubris, filamentis villo purpureo. Variat foliis baſi lyratis. (G.) Zorn pl. med. ic. 1. t. 25.

Habitat in monte Duderovo et ejus viciniis umbroſis ſubhumidis, tum in ripis Nevae fluvii ſu-

pra cataractam frequens eſt. Floret Junio, Julio. 2ℓ Царскій скипетрЪ черный. Russ. Sobol.

HYOSCYAMUS. Corolla infundibuliformis, obtuſa, irregularis, ſemiquinquefida, lacinia unica latiore. Stamina inclinata. Stigma capitatum. Capſula bilocularis, operculata, circumſciſſa, operculo dehiſcente. Semina plurima reniformia. (Calyx ventricoſo-tubuloſus perſiſtens.)

168. HYOSCYAMUS NIGER. Foliis amplexicaulibus ſinuatis, floribus ſeſſilibus. (Caulis tomentoſus viſcidulus. Corolla livide flaveſcens, venis atropurpureis, extus hirtella.) (G.) Blackw. herb. t. 550.

In ruderatis et cultis Petropoli, paſſim occurrit, tum prope pagos Toſna, Ribaczija, copioſe. Floret Junio, Julio. ♂ Белена, ſive Блекотá. Russ. Белена черная. Sobol.

SOLANUM. Corolla rotata. Antherae ſubcoalitae, apice poro gemino dehiſcentes. Bacca bilocularis.

169. SOLANUM DULCAMARA. Caule inermi fruteſcente flexuoſo, foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis, (dichotomis, nutantibus, corollis violaceis, maculis duabus viridibus. Variat: caule erecto, ſuffruticoſo; foliis ovatis.) (G.) Curtis Fl. Londin. t. 4. Dulcamara officin.

In locis humidis ſylvoſis et foſſis, circa Strelinam, et Pargelovium, tum circa Murzincam.

Floret Majo, et Junio. ♄ Сладка и горка. Russ. Пасленъ сладко-горкій. Sobol.

170. SOLANUM NIGRUM. Caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis diſtichis nutantibus. (Caulis aſper angulatus.) (L.) Fl. dan. t. 460. Solanum officin.

Habitat in cultis et ruderatis inſulae baſileenſis et paſſim. Floret Junio, Julio. ☉ Пасленъ. Russ. Пасленъ черный. Sobol.

RHAMNUS. Calyx tubuloſus: ſquamis ſtamina munientibus. Corolla nulla. (Petala minima ligulata.) Drupa ſubrotunda, ſubtrilocularis.

171. RHAMNUS. CATHARTICUS. Spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto. (fruticoſo. Flores albidi, ſtylo tri ſev quadrifido, bacca rotunda, tetraſperma. Corolla quadrifida tetrandra.) (G) Fl. dan t. 850. Spina cervina. Officinar.

Habitat circa cataractas Nevae fluvii. Floret Junio. ♄ Придорожная иголка. Russ.

172. RHAMNUS FRANGULA. Inermis floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis. (Calyx quadrifidus, petala bifida, ſtigma trifidum, bacca rubra, demum nigreſcens. Drupa clauſa officulis quatuor.) (G.) Fl. dan. t. 278. Frangula officinar.

Ubique in ſylvis ſubhumidis, uti in monte Poclonnaja, et Pulcova, et in inſulis apothecaria, lapidea aliisque frequens occurrit. Floret Majo. ♄ Крушина. Russ.

EVONYMUS. Calyx patens. Corolla pentapetala. Stamina tuberculis conicis viridibus. Capsula succulenta, colorata, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis. Theca antrosa. Semina arillo baccato obvoluta.

173. EVONYMUS EUROPAEUS. Floribus plerisque quadrifidis, foliis sessilibus acutis. (Rami laeves, pedunculi compressi, stigmata subulata.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 135.

Habitat in sylvis montosis circa fluvium Luga. Floret Majo, Junio. ♄ Бересклетъ, sive Жигалокъ. Russ. Бересклетъ Европейскій. Sobol.

RIBES. Petala quinque et stamina calyci inserta. Stylus bifidus. Bacca polysperma, infera, unilocularis.

174. RIBES RUBRUM. Inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiusculis. (L.) Schmidt österr. allg. Baumz. 11. t. 93. Ribes rubrum officin.

Habitat in sylva umbrosa ad Crasnoj cabac tum circa Murinam, atque Ochtam, et passim in sylvis vastissimis subhumidis, Floret Majo. ♄ Смородина красная. Russ.

175. RIBES ALPINUM. Inerme racemis erectis, bracteis flore longioribus. (Foliis magnis lucidis dorso glabris, facie subpilosis: petala minima flavicantia, baccae glutinosae. Racami declinati. Flores saepissime dioici steriles.) (G.) Jacq. Flor. austr. v. 1. t. 47.

Habitat in monte Duderovo, tum circa Gatczinam, et Sivoritzam, aliisque in locis montosis. Floret Majo, Junio. ♄ Смородина горная. Russ. Sob.

176. RIBES NIGRUM. Inerme, racemis pilosis, floribus oblongis. (Petala conniventia. Calyx reflexus.) (G.) Fl. dan. t. 556.

Habitat in insula rotunda, in insula Basileensi, tum circa Murinam et Ochtam; ad Goreloy cabac, aliisque in locis sylvosis humidis, copiose. Floret Majo. ♄ Смородина черная. Russ.

DIGYNIA.

CHENOPODIUM. Calyx quinquefidus, quinquedentatus, costatus, laciniis concavis. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare, superum, horizontale, calyce connivente tectum. (Variat floribus mere foemineis.)

* Foliis angulosis.

177. CHENOPODIUM URBICUM. Foliis triangularibus subdentatis, racemis confertis strictissimis cauli approximatis longissimis. (G.) Buxb. fl. hal. t. 1.

Ad vias et sepes Petropoli, tum circa pagos in hortis oleraceis, Osinovae Roschczae, et Duderovii. Floret Junio. ☉ Гусиная нога городская. Sobol.

178. CHENOPODIUM RUBRUM. Foliis cordato-triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis

erectis compoſitis ſubfolioſis caule brevioribus. (Racemi rubicundi. Folia ſinuata fiſſa.) (Sob. R.) Moris. hiſt. plant. 2. t. 31.

In ruderatis et hortis oleraceis regionis Petropolitanae atque circa pagos rarius occurrit. Floret Junio, Julio. ⊙ Гусиная нога красная. Russ. Sobol.

179. CHENOPODIUM ALBUM. Foliis rhomboideo-triangularibus eroſis poſterius integris: ſummis oblongis, racemis erectis. (Diameter transverſalis foliorum longitudinali major.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 92.

Ubique ad vias et ſepes, in ruderatis et hortis oleraceis. Floret Junio, Julio. ⊙ Дикая лебеда. Russ. Бѣлая гусиная нога. Sobol.

180. CHENOPODIUM VIRIDE. Foliis rhomboideis dentato-ſinuatis, racemis ramoſis ſubfoliatis, (glomeratis, calycibus argute pentagonis, foliis praecedentis, ſubtus farina tectis, longioribus. Caulis augulis purpuraſcentibus.) (G.) Curtis fl. Londin. t. 103.

In hortis oleraceis frequentiſſima planta. Floret Junio, Julio. ⊙. Зеленая гусиная нога. Sob.

181. CHENOPODIUM HYBRIDUM. Foliis cordatis angulato-acuminatis, racemis ramoſis nudis. (Odore narcotico, viroſo.) (Sob.) Curtis Fl. Londin. t. 248.

Habitat in hortis oleraceis et variis locis cultis, ſed pace. Floret Junio. ⊙ Гусиная нога выродочная. Russ. Sob.

182. CHENOPODIUM GLAUCUM. Foliis ovato-oblongis repandis, racemis nudis ſimplicibus glomeratis. (Sob.) Tabern. Kraeuterb. ic. p. 427.

Creſcit in urbe Petropoli ad vias, ſepes, ductus aquarum et ubique in hortis oleraceis. Floret Junio, et Julio. ☉ Гусиная нога сизая. Russ. Sobol.

Foliis integris.

183. CHENOPODIUM POLYSPERMUM. Foliis integerrimis ovatis, caule ſuberecto, decumbente, cymis dichotomis aphyllis axillaribus, calycibus fructus patulis. (Folia oris rubella.) (G.) Curt. Fl. Lond. t. 115.

Creſcit in hortis oleraceis, et locis cultis Petropoli, et ad vicum Sarſcoje ſelo. Floret Junio, Julio. ☉ Гусиная нога многосѣмянная. Russ. Sobol.

184. CHENOPODIUM MARITIMUM. Foliis ſubulatis ſemicylindricis. (L.) Flor. dan. t. 489.

Occurrit paſſim in arena maris littorali, quae ab aquis inundatur, a Catharinhoffio, uſque ad Oranienbaumium. Floret Julio. ☉ Гусиная нога приморская. Russ. Sobol.

ULMUS. Calyx quinquefidus, interne coronatus, emarceſcens. Corolla nulla. Capſula ſupera, unilocularis, foliaceo-compreſſa, alata. Semen ſolutarium. Stamina quatuor aut quinque.

185. ULMUS CAMPESTRIS. Foliis duplicato-ſerratis: baſi in aequalibus; floribus ſubſeſſilibus conglomeratis. (Dentes calycini duo lobulis lateralibus minores.) (G.) Flor. dan. t. 632.

Habitat in ſylvis ad fluvium Lugam, Wolckow, et circa Vicum Hoſtilitza. Floret Majo. ♄ Илемъ. Russ. илемъ полевый. Sobol.

GENTIANA. Calyx monophyllus. Corolla monopetala, perſiſtens, tubuloſa inferne. Receptacula duo longitudinalia. Capſula bivalvis unilocularis. Semina parva valvis inſerta. (Vel unam quintam partem excludit, vel unam tertiam addit; corolla admodum variat.)

186. GENTIANA PNEUMONANTHE. Corollis quinquefidis campanulatis, acutis, oppoſitis pedunculatis, foliislinearibus. (Connatis, interdum radicalibus lanceolatis longiſſimis faſciculatis. Flores axillares, antherae connatae.) (G.) Flor. dan. t. 269.
Habitat in pratis montoſis humidis Oſinovae Roſchczae et prope Jamburgum circa ſegetes. Floret Julio, et Auguſto. 2 Стародубка, ſive горчавка, Russ. Стародубка воздухоцвѣтная. Sobol.

187. GENTIANA CENTAURIUM. Corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo, piſtillo ſimplici. (Flores corymboſi, albido-purpurei, tubo flavo, denticulis nullis. Antherae defloratae contortae.) (G.) Fl. dan. t. 617.
Habitat in montoſis ſylvaticis humidis Pargelovii, Craſnoſelii, et paſſim ad fluvium Lugam. Floret Julio. ⊙ Centaurium minus officin. Стародубка меншая, ſive Золототысячникъ, Russ. Золототысячникъ аптекарскій. Sobol.

188. GENTIANA CAMPESTRIS. Corollis quadrifidis, fauce barbatis, calycis laciniis duabus majoribus. (G.) Flor. dan. t. 367.

In patis elevatis apricis Strelinae, alibique frequens eſt. Floret Junio, Julio. ☉ Стародубка полевая. Russ. Sobol.

189. GENTIANA CRUCIATA. Floribus verticillatis ſeſſilibus, corollis quadrifidis imberbibus. (Radix ſaepiſſime cruciatim fiſſa; folia ovato-lanceolata, nervoſa, vaginantia: flores inodori axillares terminalesque; perianthio pallido profunde inciſo, corolla extus purpureo-caerulea, denticulis bifidis.) (G.) Jacq. fl. auſtr. 4. t. 372.

Habitat in monte Duderovo, et ejus viciniis montoſis ſylvoſisque. Floret Junio, Julio, et Auguſto. ♃ Соколей перелѣтъ. Russ. Стародубка крестовая. Sobol.

DAUCUS. Corollae ſubradiatae, omnes, ut plurimum, hermaphroditae. Involucrum univerſale pinnatifidum, umbella fructifera connato-connivens. Semina ſubrotunda, ſetis rigidis longitudinalibus hiſpida.

190. DAUCUS CAROTA. Seminibus ad angulos quatuor diſtantes hiſpidis, petiolis ſubtus nervoſis. (Floſculus centralis atropurpureus; petala exteriora majora.) (G.) Fl. dan. t. 723.

In ſylvis circa urbem Narvam frequens eſt. Floret Junio, Julio. ♂ Морковь. Russ.

CONIUM. Involucella dimidiata, ſubtriphylla. Fructus ovatus, (ſubgloboſus) gibbus: coſtis quatuor compreſſis ante maturitatem undulatis. (Flores floſculoſi fertiles; petala cordata.)

191. CONIUM MACULATUM. Seminibus inermibus, (ſtriatis), Caule ramoſiſſimo maculato glabro. (Radix dauci ſapore ingrata; caulis halitu glauco, maculis ſanguineis; folia multiplicato-pinnata, coſta folioſa; pinnulae atrovirentes, duodecim aut octodecim; involucrum univerſale folium unicum, partiale unicum, membranaceo-albidum. Petala alba patentiſſima, linea media protuberante; fructus fuſceſcit. Odor murinus interdum deeſt.) (G.) Jacq. fl. auſtr. 2. t. 156. Cicuta, officin.

In ſylva paludoſa, umbroſa, inſulae apothecariae prope fabricam pyriam, et paſſim in locis ſimilibus. Floret Iunio, Iulio. ♂ Омегъ. Russ. Омегъ пестрый. Sobol.

SELINUM. Involucrum reflexum, partiale polyphyllum, Petala cordata aequalia. Semen parvum, ovali-oblongum, alis membranaceis quinque, lateralibus maximis.

192. SELINUM SYLVESTRE. Radice fuſiformi multiplici, ſtylis erectis, corollis explicatis. (Radix laeſa lacteſcit; caulis baſi et ad nodos ſanguineus, ſuperne ſubramoſus; folia multiplicato-pinnata, pinnulis linearibus confluentibus. Involucrum univerſale octo aut decaphyllum. Petala alba patentiſſima. Semina ovali-oblonga: ſulcis tribus elevatis obtuſis, approximatis, ante maturitatem rubeſcentia.) (Sob. R. B.) Jacq. fl. auſtr. 2. t. 152.

Creſcit circa Petropolim in ſylvis inundatis, paludoſis. Floret Junio, Julio. 2 Гирча лѣсная. Russ. Sobol.

193. SELINUM PALUSTRE. Caule laevi ſublacteſcente, radice ſimplici, foliis quadruplicato-pinnatis linearibus. (Caulis ſolitarius ſulcatus. Folia terminalia elongata. Petala involuta, ſtyli dein divergunt.) (F.) Flor. dan. t. 257.

In paludibus Catharinhofii, aliisque frequens eſt. Floret Junio, Julio. ♃ Гирча болотная. Russ. Sobol.

ATHAMANTA. Involucellum umbellulae aequale. Petala inflexo-emarginata, Fructus ovato-oblongus, ſtriatus. (Floſculi fertiles.)

194. ATHAMANTA LIBANOTIS. Foliis bipinnatis planis, umbella hemiſphaerica, ſeminibus hirſutis. (Caulis profunde ſulcatus; angulis anguſtioribus. Umbella denſiſſima, radiis villoſis, foliis involucelli ſubulatis. Petala pallide Ochroleuca, ſtyli tandem purpurei. (G.) Flor. dan. t. 754.

Habitat in monte Duderovo, et in ſylvis circa urbem Narvam, atque in Oſinova Roſchcza. Floret Junio, Julio. ♃ Порѣзная трава. Russ. Порѣзъ горный. Sobol.

195. ATHAMANTA CERVARIA. Foliis duplicato-pinnatis; foliolis oblongis obtuſis trilobis dentato-ſerratis; ſerraturis mucronatis, ſeminibus nudis. (Radix nigra capillata, ſucco glutinoſo flavicante; caulis flexuoſus ad geniculos purpuraſcens; folia radicalia tripinnata, caulina bipinnata, argute ſerrata, dorſo glauca; vaginae olioſae. Involucrum univerſale foliolis decem.

Umbellae convexiſſimae, albae, rarius purpureae. Tota odorata.) Jacq. fl. auſtr. 1. t. 69.

Habitat in montoſis, circa urbem Jamburgum. (B.) Floret Iulio, Auguſto. ♃ Порѣзъ, оленній. Russ. Sobol.

PAUCEDANUM. Involucra breviſſima. Umbella univerſalis longiſſima, petalis luteis. Fructus ellipticus, ſubſtriatus, lenticulari-compreſſus. (Flores floſculosi abortivi.)

196. PEUCEDANUM OFFICINALE. Foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus. (G.) Gaertn. de fr. et ſem. cent. 2. t. 21. f. 7. Peucedanum officinar.

Habitat ad margines ſylvarum, inter fluvium Ruſſiam et ſiſtam, tum circa Sarſcojeſelo, et ad viam Wiburgenſem ultra montem Poclonnaja. Floret Iunio, Iulio. ♃ Горичникъ, ſive хвостовая трава. Russ. Горичникъ аптекарскій. Sob.

197. PEUCEDANUM SALAUS. Foliolis pinnatifidis: laciniis oppoſitis; involucro univerſali diphyllo, ſtylis deflexis. (Laciniae anguſto-lanceolatae, ſpinula alba mucronatae; involucrum univerſale aut unicum aut nullum; partiale foliis radiis aequantibus; petala flaveſcenti-albida, rubellave. Semina alis quatuor.) (G.) Jacq. fl. auſtr. 1. t. 15.

Creſcit copioſe in pratis et ſylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtenſem ad viam Wiburgenſem, Peterhoffianam, et Sarſkoſelienſem atque.

in plurimis locis ſimilibus. Floret Iunio, Iulio· 2 Горичникъ луговый. Russ. Sobol.

HERACLEUM. Involucrum caducum; partiale polyphyllum. Corolla difformis: petalis inflexo-emarginatis. Semina foliaceo-compreſſa, glabra, margine membranaceo anguſtiſſimo cincta.

198. HERACLEUM SPHONDYLIUM. Foliolis pinnatifidis laevibus, floribus uniformibus, (foliis ampliſſimis pinnatis: extimo palmato; florum radiis majoribus, ſtylis retrorſum flexis.) (G.) Blackw. herb. t. 540.

Habitat in montoſis nemoribus, et ubique in hortis. Floret Iulio. ♂ Борщъ. Russ. Борщъ широкій. Sobol.

199. HERACLEUM ANGUSTIFOLIUM. Foliis cruciato-pinnatis: foliolis linearibus, corollis floſculoſis. (Caule plerumque purpuraſcente; foliis ternatis, foliolo extimo quinquefido, laciniis oblongis acuminatis, glabris, dorſo pallidioribus. Umbellae radii quindecim; flores virides, antheris flavis.) (Sob. B.) Jacq. fl. auſtr. 2. t. 173.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, et in aliis locis montoſis herboſis. Floret Iulio. ♂ Борщъ узкій. Russ. Sobol.

ANGELICA. Corolla aequalis, petalis incurvis, lanceolatis. Styli reflexi. Fructus ſubrotundus, angulatus, alis marginalibus duris dorſo lineis tribus. (Umbella globoſa.)

200. ANGELICA ARCHANGELICA. Foliis ſupradecompoſitis, foliorum impari lobato, lobis lateralibus anguſtioribus. Caulis lineatus glaber. (Radii 66. Petala pallide viridia, ſemina angulata·) (G.) Flor. dan. t. 206· Angelica ſativa officin.

In ſylvis circa fluvium Nevam, et in pratis montoſis circa Murzincam, copioſe provenit. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Дягильникъ ſive дягиль. Russ. Дягиль аптекарскій. Sobol.

201. ANGELICA SYLVESTRIS. Foliolis aequalibus, ovato-lanceolatis ſerratis ellipticis. (G.) Sabb. h. rom. 4. t. 85.

Habitat ubique in ſylvis et pratis humidis, praecipue ad foſſas et margines ſylvarum. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Дягиль лѣсный. Russ. Sobol.

SISON. Involucra ſubquadriphylla. Fructus ovatus, ſtriatus, ſtylis deflexis. (Umbella inaequalis depauperata.)

202. SISON INUNDATUM. Repens, foliis ſubmerſis capillaribus; emerſis pinnatis, umbellis bifidis. (Involucrum univerſale nullum.) (G.) Flor. dan. t. 89.

Habitat in aquis ſtagnantibus circa ductum aquarum Ladogenſium, et in ripa parvae nevae ſaepe inundata, ex adverſo inſulae baſileenſis, tum Catharinhofii, et in aliis locis ſimilibus. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Петрушечникъ наводненный. Russ. Sob.

PHELLANDRIUM. Involucella heptaphylla, longitudine umbellae. Floſculi diſci minores. Fructus ovatus, laevis, calyce et piſtillo coronatus.

203. PHELLANDRIUM AQUATICUM. Foliorum ramificationibus divaricatis, (caule dichotomo.) (G.) Blackw. herb t. 570.

In ramis Nevae fluvii minoribus, circa inſulas, lapideam, crucis et apothecariam copioſe provenit. Floret Julio. ♂ Конскій укропъ. Russ. Sobol.

CICUTA. Umbella univerſalis et partialis ſubrotunda, involucellis polyphyllis, ſetaceis. Flores floſculoſi, fertiles, ſubaequales, petalis planiuſculis. Fructus ſubovatus coſtatus.

204. CICUTA VIROSA. Umbellis oppſitifoliis, petiolis marginatis obtuſis. (Involucrum partiale polyphyllum, laciniae pedunculos longitudine adaequant.) (G.) Flor. dan. t. 208. Cicuta aquatica, officin.

In aquis praecipue ſtagnantibus inſulae lapideae, ad ductus aquarum Catharinhoffii, et ad viam regiam Peterhoffianam frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Бѣшеница водяная. Russ. Sobol.

AETHUSA. Involucella dimidiata, triphylla, deflexa. Fructus ſubgloboſus, profunde ſulcatus, (fere octogonus.)

205. AETHUSA CYNAPIUM. Foliis conformibus, fructibus ſubgloboſis, (octogonis. Umbellae radii quinque vel ſex. Folia bipinnata, pinnulis ſubtus lucidis.) (G.) Gaertn. de fr. et ſem. Cent. 2. t. 22. f. 3.

Habitat inter fluvium Ruſſiam et Siſtam in ſylvis et Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iulio. ☉ Собачая петрушка. Russ.

CHAEROPHYLLUM. Involucrum (partiale) reflexum, concavam. Petala inflexo-cordata. Fructus nitens, (ut plurimum) laevis, oblongus, roſtratus, varius. (Floſculi diſci abortivi.)

206. CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE. Caule laevi ſtriato: geniculis tumidiuſculis. (Caulis ſulcatus, hirſutus: ramis glabris. Folia multiplicato-pinnata, coſtis fiſtuloſis; foliolis ſerrato-inciſis, atrovirentibus dorſo pallidioribus. Umbellae planiuſculae, radiis ſeptemdecim aut octo minores ut plurimum duae intra dichotomiam primus maturescunt. Involucrum partiale hexaphyllum. Petala alba, extimo majore, antherae ochroleucae. Radix apii odore, sapore ingrato.) (G.) Iacq. fl. auſtr. 2. t. 149.

Creſcit in ſylvis inſulae lapideae, apothecariae etubique in hortis copioſiſſime. Floret Iunio. 2 Кервель ſive болиголовъ. Russ. Кервель лѣсный. Sobol.

207. CHAEROPYLLUM AROMATICUM. Caule aequali, foliolis ferratis integris, ſeminibus biariſtatis. (Radix apii ſapore. Caulis inferne plerumque flexuoſus, purpura maculatus; folia omnia ſubbiternata, pinnulis oblongo-ovatis, ſerratis, atrovirentibus. Rami extremi umbellis erectis, radiis duodecim aut octodecim. Involucrum partiale hexaphyllum aut decaphyllum. Petala nivea, antheris ſulphureis.)(G.) Iacq. flor. auſtr. 2. t. 150.

Habitat inter pagos Voroneſchſcaja et Novaburia ad marginem ſylvae. Floret Iunio, Iulio. ♃ Кервель пряный. Russ. Sobol.

SESELI. Involucellum foliolo uno alterove. Umbellae globoſae. Fructus ovatus, ſtriatus. Stylis deflexis.

208. SESELI ANNUUM. Petiolis rameis membranaceis ventricoſis emarginatis. (Radix acris, nauſeoſa, quodam ſapore Apii Petroſelini. Caulis varius purpureus; petioli valde vaginantes, ſtriati, virentes aut ſanguinei; pinnulae lanceolato-lineares. Umbella convexa. Petala alba, rubellave, antheris flavis.) (G.) Jacq. fl. auſtr. 1. t. 55.

In Flora ingrica Gorteri locus creſcendi non eſt indicatus: Quaerendum eſt in pratis ſiccioribus. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Чистецъ годовый. Russ. Sobol.

PASTINACA. Petala involuta, integra. Semina elliptica, foliacio-compreſſa, glabra: margine tenui anguſto.

209. PASTINACA SATIVA. Foliis ſimpliciter pinnatis foliolis inciſis. (Floribus flavis, ſtylis divaricatiſſimis, ſeminibus viridibus, convexis.) (Involucrum univerſale tetra aut penta-phyllum foliolis inaequalibus obliteratis.) (G.) Blackw. herb. t. 379. Paſtinaca. officinar.

Habitat in ſylvis circa urbem Narvam, et Petropoli circa foſſas viarum atque in hortis oleraceis copioſe, nec non ad pagos circa montem Dedurovium. Floret Iulio, Auguſto. ♂ Пастернакъ. Russ. Пастернакъ садовый. Sobol.

CARUM. Involucrum saepius monophyllum. Petala carinata, inflexo-emarginata. Fructus ovato-oblongus, ellipticus, gibbus, teretistriatus.

210. CARUM CARVI. Folia bipinnata, foliolis primis in costa verticillatis, ad vaginae basin stipulis multifidis praedita. (Involucrum tetra aut penta-phyllum. Umbellae rarae, radiis duodecim, pedunculis viginti, germina vertice flavicantia.) (G.) Iacq. austr. 4. t. 393. Carvi. officin.

Crescit in insulis, Apothecaria, lapidea, Petri, crucis et ubique in pratis cultis, et ad vias, copiosissime. Floret Iunio, Iulio. ♂ Тимонъ. Russ. тимонъ душистый. Sob.

PIMPINELLA. Umbellae juniores nutantes. Petala inflexa. Styli recti. Stigmata subglobosa. Fructus exigui, ovato-oblongi: striis quinque eleuatis, superne angustiores.

211. PIMPINELLA SAXIFRAGA. Caule striato glabro, foliis radicalibus subrotundis argute dentatis, caulinis bipinnatis linearibus. (Caeteris villosior, foliis rotundioribus, caule plerumque aphyllo ramosiore, umbellis minoribus, petalis semper albis.) (G.) Iacq. fl. austr. 4. t. 395. Pimpinella alba, officin.

Habitat in pratis siccioribus elevatis, in monte Poclonnaja, in insula lapidea et Apothecaria, et passim copiose. Floret Iunio, Iulio. ♃ Бедринецъ. Russ. Бедринецъ каменистый. Sobol.

AEGOPODIUM. Umbella convexa, umbellulis planis. Petala cordata. Fructus ovato-oblongus, striatus, utrinque attenuatus.

212. AEGOPODIUM PODAGRARIA. (Foliis ovato-lanceolatis denticulatis ſubtus villoſis, inferioribus biternatis, ſummis ternatis; petalis albis. Styli reflexi. (G.) Flor. dan. t. 670. Podagraria officinar.

Creſcit in pratis ſylvoſis, tum ad ſepes, et in hortis oleraceis aliisque copioſiſſime. Floret Iunio, Iulio. ♃ Снить ſive дяглица. Suss. Снить подагрическая. Sob.

TRIGYNIA.

VIBURNUM. Calyx quinquepartitus, ſuperus. Corolla quinquefida. Styli nulli. Drupa unilocularis clauſa, monoſperma.

213. VIBURNUM OPULUS. Foliis lobatis, petiolis glandulofis. (Folia trilobata; flores magni, ſteriles; ſtylus brevis ex tribus connatus.) (G.) Fl. dan. t. 661.

Habitat ubique in ſylvis humidis, praecipuae ad viam Wibnrgenſem et circa fabricam pyriam Ochtenſem, usque ad fluvium Wolchow. Floret Majo, Iunio. ♄ Калина. Russ.

ALSINE. Calyx pentaphyllus. Petala quinque aequalia bifida. Capſula unilocularis, trivalvis, (aut ſexvalvis.) Calyce tecta.

214. ALSINE MEDIA. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis, (apice glandula rubella terminatis, petiolis ciliatis, ciliis decurrentibus; floribus triandris aut pentandris.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 70. Alſine officinar.

Creſcit ubique in hortis oleraceis, ad ſepes et vias paſſim. Floret tota aeſtate. ☉ Мокрица. Russ. мокрица средняя. Sob.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Nectaria quinque cordata, ciliata: apicibus globoſis. Stylus nullus, ejus loco foramen. Stigmata quatuor obtuſa. Capsula quadrivalvis unilocularis. Receptaculum parietale. Semina membranacea, marginata.

215. PARNASSIA PALUSTRIS. Nectariis ſimplicibus. (Caulis in medio folium perfoliatum. Petala alba, ovata, lineata. Stamina perſiſtentia.) (G.) Fl. dan. t. 584. Hepatica alba. officin.

Habitat in udis muſcoſis ad viam Wiburgenſem, ad fluuium Strelnaja, et paſſim ad ductus aquarum, et margines ſylvarum. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Золотникова трава. Russ. Золотничка болотная. Sobol.

LINUM. Calyx pentaphyllus. Petala quinque. Capſula quinquevalvis, decemlocularis. Semina ſolitaria.

216. LINUM CATHARTICUM. Foliis oppoſitis ovauo-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis. (Calyces ariſtati patuli, pedunculis nutantibus. Flores albidi, ante antheſim penduli Stamina quinque ſterilia.) (G.) Flor dan. t. 851. Linum Catharticum. offic.

In aruis et pratis ſucculentis, circa Craſnoje Selo, Sarſcoje Selo, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ленъ проносный. Russ. Sob.

DROSERA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Capſula unilocularis, apice quinquevalvis. Semina plurima, parietalia.

DROSERA ROTUNDIFOLIA. Scapis radicatis, foliis orbiculatis. (G.) Flor. dan. t. 1028. Ros ſolis officinar.

In paludibus ſylvoſis apricis, circa cemeterium Sancti Ioannis, Pargelovii ad ripas lacuum et paſſim in locis ſimilibus. Floret Iunio, Iulio. ☉ Солнечная роса. Russ. Солнечная роса круглая. Sob.

218. DROSERA LONGIFOLIA. Scapis radicatis, foliis obovali-lanceolatis, (in petiolum decurrentibus.) (G.) Flor. dan. t. 1093.

Habitat in paludibus muſcoſis cum praecedente. Floret etiam Iunio, Iulio. ☉ Солнечная роса долголистая. Russ. Sobol.

POLYGYNIA.

MYOSURUS. Calyx pentaphyllus, baſi adnatus, Coloratus, deciduus. Petala quinque unguiculata, oblique aperta ſive Nectaria, (quorum vgues poro nectarifero inſuper ſunt inſtructi.) Receptaculum ſubulatum, capſulis imbricatim tectum. Capſula bivalvis. Semina numeroſa, corticata, pendula.

219. MYOSURUS MINIMUS. (Foliis integerrimis linearibus, flavo-viridibus; petala decidua. (G.) Flor. dan. t. 406.

Habitat in agris et arvis, ad fabricam pyriam Ochtenſem, circa pagos Ligovo, et Goreloy ca-

bac, atque Petropoli in hortis. Floret Majo, Iunio. ☉ Мышій хвостъ. Russ. мышій хвостъ малѣйшій. Sob.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA

MONOGYNIA.

ALLIUM. Spatha multiflora, arida. Umbella congeſta. Corolla hexapetala, patens, petala tria ſtaminifera. Capſula ſupera trilocularis.

ALLIUM OLERACEUM. Staminibus ſimplicibus, foliis ſcabris ſemiteretibus ſubtus ſulcatis. (Spatha diphylla, umbella depauperata.) (G.) Hall. all. n. 26. f. 2.

Habitat in monte Duderovo et viciniis urbis Gatczinae. Floret Iunio, Iulio. ♃ Чеснокъ огороденный. Russ. Sobol.

221. ALLIUM SCHOENOPRASUM. Scapo nudo adaequante folia teretia ſubulato filiformia, (fiſtuloſa; ſpatha diphylla; petalis conniventibus, bulbo compoſito. Varietas β major. (G.) Murray comm. gott. 1775. p. 33. t. 4.

Creſcit in inſula rotunda, et in littore humido inſulae lapideae a parte occidentali et meridionali, cum ſua varietate, tum circa montem Duderovium. Floret Iunio, Iulio. ♃ Лучокъ мелкій. Russ. Sobol.

ORNITHOGALUM. Corolla infera hexapetala erecta, perſiſtens, ſupra medium patens. Filamenta alterna baſi dilatata. Capſula ſupera, trilocularis, trivalvis.

222. ORNITHOGALUM LUTEUM. Scapo anguloſo diphyllo, pedunculis vmbellatis ſimplicibus, (inaequalibus, floribus flavis. Radix bulboſa, ſtipulis maximis hirſutis. Folia radicalia graminea: caulina ſpathaeformia. Stamina quatuor ſive octo.) (Sob.) Flor. dan. t. 378.

Habitat parce in hortis, et in ſylvis inſulae apothecariae atque inſulae lapideae. Floret Majo. 2 Птичье млеко желтое. Russ. Sobol.

223. ORNITHOGALUM MINIMUM. Scapo anguloſo diphyllo, pedunculis umbellatis ramoſis. Fl. dan. t. 612.

Habitat circa fluvium Strelnaja ad margines ſylvarum. (G.) Floret Majo. 2 Птичье млеко малѣйшее. Russ. Sobol.

CONVALLARIA. Corolla infera ſexfida. Bacca. immatura maculata, ſupera, trilocularis. Semina duo ſolitaria

224. CONVALLARIA MAJALIS. Scapo nudo, ſemitereti, floribus ſpicatis nutantibus. (Subacaulis, bifolia, foliis ellipticis; flores globoſo-campaniformes ſecundi.) (G.) Flor. dan. t. 854. Lilium Convallium. officin.

Greſcit vbique in ſylvis umbroſis ut et in inſulis Nevae fluvii. Floret Majo, Iunio. 2 Ландышъ майскій. Russ. Sobol.

225. CONVALLARIA POLYGONATUM. Foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus ſubunifloris. (Caule octangulo.) (G.) Flor. dan. t. 377. Sigillum Salomonis. officin.

Habitat ubique in ſylvis. Floret Iunio. ♃ Купено, ſive Саломонова печать. Russ. Ландышъ многоколѣнчатый. Sobol.

226. CONVALLARIA MULTIFLORA. Foliis alternis amplexicaulibus, caule tereti, pedunculis axillaribus multifloris. (bi ſive trifloris.) Stamina hirta. Flores ut plurimum terni, ſummi gemini.) (R.) Flor dan. t. 152.

Creſcit Pargelovii in ſylvis montoſis a ſiniſtra parte viae Wiburgenſis, et circa Sarſcoje ſelo. Floret Majo, Iunio. ♃ Ландышъ многоцвѣтный. Russ. Sobol.

227. CONVALLARIA BIFOLIA. Foliis cordatis, floribus tetrandris. (Flores quadrifidi.) (G.) Flor. dan. t. 291. Bifolium officin.

Ubivis in ſylvis umbroſis ſiccis, ut et in inſula apothecaria, vulgaris planta eſt. Floret Iunio. ♃ Ландышъ двулиſтый. Russ. Sob.

IUNCUS. Gluma floralis, bivalvis. Calyx hexaphyllus, perſiſtens. Corolla nulla. Capſula ſupera, trilocularis, trivalvis, polyſperma, vel unilocularis triſperma.

* Culmis nudis.

228. IUNCUS CONGLOMERATUS. Culmo ſtricto, capitulo laterali; floribus triandris ovatis

obtusis. (Capitulum densum, globosum, sessile; Capsulae acutae trigonae.) (Sob. R., Fl. dan. t. 1094.

Crescit ubique in uliginosis, praecipue in fossis ad viam Wiburgensem, et in insulis Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. ♃ Ситникъ клубчатый. Russ. Sobol.

229. IUNCUS EFFUSUS. Culmo stricto, paniculа laterali laxa, floribus triandris ovatis obtusis. (Panicula sparsa, squamae duae rubellae, subaristatae, antheris luteis. Capsula obovata.) (G.) Fl. dan. t. 1095.

Crescit passim in paludibus. Floret Iunio. ♃ Ситникъ розсыпный. Russ. Sobol.

230. IUNCUS FILIFORMIS. Culmo incurvo filiformi, panicula laterali pauciflora simplici (G.) Schmidt Spicil. t. 3.

In paludibus quae aestate exsiccantur, non raro occurrit, uti circa cemeterium Sti. Iohannis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Ситникъ нитчатый. Russ. Sobol.

231. IUNCUS SQUARROSUS. Culmo rigido, foliis setaceis, panicula terminali aphylla. (Totus rigens foliis patentibus squarrosis distichis, culmo nudo subcorymboso.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 430.

In paludibus circa Murinam et in aliis locis similibus frequens est. Floret Iunio. ♃ Ситникъ чешуйчатый. Russ Sobol.

** Culmis foliosis.

232. IUNCUS ARTICULATUS. Foliis nodoſo-articulatis, petalis obtuſis. (G.) Flor. dan. t. 1095.

Ad ripas fluvii Tſchornaja in regione Wiburgenſi, et paſſim in paludibus aeſtate exſiccatis. Floret Iunio. ♃ Ситникъ суставчатый. Russ. Sobol.

233. IUNCUS BULBOSUS. Culmo indiviſo ſubcompreſſo, foliis linearibus canaliculatis, panicula terminali bractea ſua breviori, calycibus capſulisque obtuſis. (G.) Flor. dan. t. 431.

Creſcit in paludoſis cum precedente paſſim. Floret Iunio. ♃ Ситникъ луковчатый. Russ. Sobol.

234. IUNCUS BUFONIUS. Culmo dichotomo, floribus ſolitariis ſeſſilibus, calycis foliolis lanceolatis mucronatis, capſula ovata longioribus. (Culmus ſetaceus.) (G.) Fl. dan. t. 1096.

Naſcitur ceſpitoſe in ripis Nevae fluvii quae aquis alluuntur, et in aquis ipſis, ſubulariaeque inſeparabilis comes, uti ad ripam parvae Nevae in regione Wiburgenſi. Floret Majo, Iunio. ☉ Ситникъ жабный. Russ. Sobol.

235. IUNCUS PILOSUS. Foliis planis piloſis, corymbo ramoſo. (Pedunculi uniflori terminales; flores quaterni in culmo) (G.) Flor. dan. t. 441.

Habitat in ſylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtenſem et Murinam ſatis frequens Floret Iunio, Iulio. ♃ Ситникъ волосатый. Russ. Sobol.

236. IUNCUS CAMPESTRIS. Foliis planis ſubpiloſis, ſpicis ſeſſilibus pedunculatisque. ſexflo-

ris aut duodecim floris) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 140.

Habitat in campis apricis paſſim. Floret Majo, Iunio. ♃ Ситникъ полевый. Russ. Sobol.

PEPLIS. Calyx campanulatus, ore 12-fido. Petala nulla aut ſex, calyci inſerta. Capſula bilocularis, ſupera, polyſperma.

237. PEPLIS PORTULA. Floribus ſaepius apetalis. (Caulibus repentibus. ſubquadrangularibus, foliis obovatis, conjugatis; floribus axillaribus oppoſitis. Folia ſuprema tandem in roſulas accumulata. Petala fugaciſſima, dilute roſea.) (Sob. R. B.) Flor. dan. t. 64.

Habitat in foſſis circa Noſocomium maritimum, et in ſylvis paludoſis. Floret Majo, Iunio. ☉ Спорышъ водяный. Russ. Sobol.

TRIGYNIA.

RUMEX. Calyx triphyllus. Petala tria conniventia. Semen unicum triquetrum in corolla connivente.

238. RUMEX CRISPUS. Floribus hermaphroditis: valvulis integris graniferis, foliis lanceolatis undulatis acutis. (Folia cordato-oblonga.) (G.) Curtis Fl. Lon. t. 104.

Habitat in agris circa Slavjanka, et Petropoli in pratis humidis et hortis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Щевель кудрявый. Russ. Sobol.

239. RUMEX ACUTUS. Floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis acuminatis. (Valvularum dentes utrinque

plures, inaequales longitudine diametri ipſius valvulae.) (G.) Blackw. herb. t. 491. Lapathum acutum officin.

Habitat in pratis humidis et locis ſucculentis in regione Wiburgenſi, et in hortis paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Щевель конскій. Russ. ſive щевель остролистый. Sobol.

240. RUMEX OBTUSIFOLIUS. Floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis, obtuſiuſculis crenulatis. (Sob.) Curtis flor. Lond. t. 168.

Habitat in pratis humidis fabricae pyriae Ochtenſis, tum ad foſſas viarum et fere ubique in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Конскій щевель. Russ. Щевель пуполистый. Sobol.

241. RUMEX AQUATICUS. Floribus hermaphroditis: valvulis integerrimis nudis, foliis cordatis glabris acutis. Semina pappis ferrugineis coronata.) (G.) Blackw. herb. t. 490. Lapathum aquaticum officin.

Creſcit copioſe ad ductus aquarum et paludes, atque in ſylvis humidis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Шевель водяный. Russ. Sobol.

242. RUMEX ACETOSA. Floribus dioicis, foliis oblongis, ſagittatis, (caulinis ſeſſilibus, ſegmentis oblique truncatis, pedunculis articulato-coarctatis.) (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 13. Acetoſa officinar.

In inſula apothecaria et ubique in pratis vulgaris planta eſt. Floret Majo, Iunio. ♃ Щевель Russ. Щевель кислый. Sobol.

243. RUMEX ACETOSELLA. Floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis, (petiolatis.) (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 14.

Habitat in pratis cultis siccioribus. Floret Iunio. ♃ Щевель мѣлкій. Russ. Sobol.

SCHEUCHZERIA. Calyx sexpartitus. Corolla nulla Styli nulli. Capsulae tres vel sex inflatae, compressae, monospermae.

244. SCHEUCHZERIA PALUSTRIS. (G.) Flor. dan. t. 76.

Crescit in paludibus muscosis circa montem Duderovium, in Olinova Roschcza, et in aliis locis similibus. Floret Majo. ♃ Ситница болотная. Russ. Sobol.

TRIGLOCHIN. Calyx triphyllus. Petala tria calyciformia, stamina recondentia. Stigmata plumosa tria vel sex, petala mentientia. Capsula basi dehiscens.

245. TRIGLOCHIN PALVSTRE. Capsulis triloculariibus sublinearibus, (spica dimidiata. Radix fibrosa.) (Flor. dan. t. 411.

Habitat in ripis arenosis Nevae fluvii, circa fortalitium Sti. Petri et Pauli, et ubique in paludosis circa fluvios. Floret Junio. ♂ Тривостриица болотная. Russ. Sobol.

POLYGYNIA.

ALISMA. Calyx triphyllus. Petala tria, unguibus staminiferis. Capsulae plures, coriaceae, compressae, receptaculo communi affixae. Semina plura, conduplicata.

246. ALISMA PLANTAGO. Foliis ovatis acutis, fructibus obtuſe trigonis. (Panicula magna laxa, racemis verticillatis, petalis albis. (G.) Flor. dan. t. 561. Plantago aquatica. officin.

In paludibus et foſſis vulgatiſſima planta eſt. Floret Junio. Julio. ♃ Попутникъ вѣдяный. Russ. ſive. Частуха водяная. Sobol.

CLASSIS VII.

HEPTANDRIA

MONOGYNIA.

TRIENTALIS. Calix heptaphyllus. Corolla ſeptempartita, plana, aequalis. Bacca ſive theca exſucca, ſupera, globoſa, univalvis, unilocularis. Semina depreſſa, angulata. (Numerus variat.)

247. TRIENTALIS EUROPAEA. Foliis ovalibus integerrimis. (Flos Alſines. Tota plantula et magis in foliorum marginibus glandulis, uti in Meſembryanthemis, obtecta.) (G.) Fl. dan. t. 86. *a.* Varietas, eadem biflora.

Habitat in ſylvis montoſis, et umbroſis, ubique, tum in inſulis Apothecaria, lapidea et Baſileenſi copioſiſſime. Floret Majo, Junio. ♃ Троечница Европейская. Russ. Sobol.

CLASSIS VIII.

OCTANDRIA

MONOGYNIA.

EPILOBIUM. Calyx tetraphyllus, deciduus. Petala quatuor. Capsula infera, longissima, quadrilocularis, quadrivalvis, cylindracea. Receptaculum liberum coloratum. Semina plura apice pappo coronata.

* Staminibus declinatis.

248. EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM. Foliis sparsis lineari-lanceolatis, floribus inaequalibus. (Foliis glabris, venosis, petalis ellipticis integerrimis, pistillo, declinato.) (G.) Flor. dan. t. 289.

Habitat in sylvis montosis; uti Pargelovii, et Sarscoselii, tum que in insula petri, et in multis hortis, oleraceis copiose. Floret Junio, Julio. ♃ Кипрей. Russ. Кипрей усколистый. Sobol.

** Staminibus erectis, corollis regularibus, petalis bifidis.

249. EPILOBIUM HIRSUTUM. Foliis oppositis ovato-lanceolatis, serratis, hirsutis, semiamplexicaulibus, caule ramosissimo villoso. (Floribus saepe difformibus, petalis emarginatis; calyces mucronati, capsulae longissimae, pistillis declinatis. (G.) Flor. dan. t. 327.

Ad vias et ductus aquarum: prope montem Pulkova, et Sarſcoje ſelo vulgaris planta eſt. Floret Iulio. 24 Кипрей мохнатый. Russ. Sobol.

250. EPILOBIUM PARVIFLORUM. Foliis lanceolatis ſubpetiolatis pubeſcentibus, caule villoſo ſimpliciſſimo. (Sob. R.) Flor dan. t. 347.

Creſcit in monte Pulcovo et Oſinova Roſchcza, gaudet locis elevatis ſiccioribus. Floret Majo, Iunio. 24 Кипрей мѣлкоцвѣтный. Russ. Sob.

251. EPILOBIUM MONTANUM. Foliis oppoſitis, ovatis, dentatis. (Petala bifida. Caulis ſimplex, racemi foliofi.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 195.

Habitat in montoſis, umbroſis, uti in monte Pulcova, et ad ripas arenoſas Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. 24 Кипрей горный. Russ. Sobol.

252. EPILOBIUM PALUSTRE. Foliis oppoſitis lanceolatis integerrimis, petalis emarginatis, caule erecto. (Foliis linearibus, racemis laxis.) (G.) Tabernaemont. Kraeuterb. p. 856. Fl. dan. t. 347?

Habitat in paludibus et locis humidis paſſim. Floret Iunio, Iulio. 24 Кипрей болотный. Russ. Sobol.

VACCINIUM. Calyx quadridentatus ſuperus. Corolla monopetala, quadrifida. Filamenta baſi germinis inſerta. Antherae bicornes, medio ariſtatae. Bacca quadrilocularis, aut quinqueloculari, polyſperma, infera umbilicata.

* Foliis annotinis ſ. deciduis.

253. VACCINIUM MYRTILLUS. Pedunculis unifloris, foliis ſerratis ovatis, caule angulato. (Calyx ſaepe integerrimus, corolla quinquefida, ſtamina 5-10, ſtigma concavum, margine denticulatum, fructus niger, ut plurimum quinquelocularis.) (G.) Schkuhr, bot. Handb. p. 330. t. 107. Myrtillus officin.

Habitat in ſylvis humidis, circa pagum Ochtam et paſſim. Floret Majo. ♄ Черница vel черника. Russ.

254. VACCINIUM ULIGINOSUM. Pedunculis unifloris, foliis integerrimis obovatis obtuſis laevibus. (Frutex procumbens diffuſus, ramis fuſcis, radicantibus, foliis ſubtus reticulato-venoſis, pedunculis rubellis, ſolitariis, flore carneo, fructu caeruleo. Tenella folia baſi ciliata.) (G.) Fl. den. t. 231.

Habitat ubique in ſylvis humidis umbroſis, uti cir a Ochtam et ad Cimeterium Sti. Iohannis. Floret Majo. ♄ Голубица, Голубика, пьяница et Гонобобель. Russ.

** Foliis ſempervirentibus.

255. VACCINIUM VITIS IDAEA. Racemis terminalibus nutantibus, foliis obovatis revolutis integerrimis ſubtus punctatis, (baccis rubris.) (G.) Fl. dan. t. 40. Vitis idaea officinarum.

Habitat in montoſis apricis et ſylvis ubique. Floret Iunio. ♄ Брусница ſ. Брусника. Russ.

256. VACCINIUM OXYCOCCUS. Foliis ovatis integerrimis revolutis, caulibus filiformibus, repentibus nudis. (Corolla demum reflexa, ut in

cyclamine, rubella, pedunculo terminali longo filiformi.) (G.) Flor. dan. t. 80. (Schollera oxycoccos. Roth. Germ. Ob corollam quadripetalam revolutam, filamenta conniventia et Antheras tubulosas, bipartitas.) Oxycoccus, officinar.

Crescit ubique in paludibus inter Sphagnum. Floret Majo. ♃ Клюква, sive Журавлина. Russ.

ERICA. Calyx tetraphyllus, inferus, foliolis coloratis persistentibus. Corolla quadrifida. Filamenta receptaculo inserta. Antherae apice bifidae, pertusae. capsula quadrilocularis, quadrivalvis, polysperma, dissepimentis cum futuris coeuntibus.

257. ERICA VULGARIS. Antheris inferne setis duabus acutis dentato-serratis, foliis oppositis sagittatis, (quadrifariam imbricatis, calycibus duplicibus, corollis subaequalibus campanulatis spicatis, antheris ferrugineis.) (G.) Flor. dan. t. 677. Erica officin.

In montosis et sylvis sterilibus, siccioribus turfaceis vulgaris planta est. Floret Majo, Iunio. ♄ β variet. flore albo. Cum priori occurrit sed parce, uti circa Sarscoje selo, et Pargelovium, Верескъ. sive Верескъ. Russ. Верескъ обыкновенный. Sobol.

DAPHNE. Calyx (plurimis) nullus. Corolla monopetala, regularis, quadrifida, infundibuliformis. Stamina alterna inferiora. Drupa baccata, supera, unilocularis. (Stylus nullus.)

258. DAPHNE MEZEREUM. Floribus sessilibus ternis caulinis, baccis globosis, foliis lanceolatis

deciduis. (Gemmis enneaphyllis, floribus purpurascentibus, stigmate rotundato albido, bacca rubra.) (G.) Flor. dan. t. 268. Mezereum, officinar.

Habitat in insula crucis, et passim in sylvis montosis. Floret Aprili, Majo. ♄ Ягóдки, sive Волчій перецъ. Russ.

TRIGYNIA.

POLYGONYM. Calyx nullus. Corolla quinquepartita, calycina, segmentis tot, quod stamina. Semen unicum anglatum, nudum ut plurimum.

259. POLYGONUM BISTORTA. Caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. (Floribus saepius digynis, in spica densa ovato-cylindrica.) (G.) Flor. dan. t. 421. Bistorta, officin.

Ad ductum aquarum Ladogensium inter Nasiam et Lavam fluvium in maxima copia. Floret Iulio. 2 Горецъ sive пестикъ. Russ. Горецъ аптекарскій. Sobol.

260. POLYGONYM VIVIPARYM. Caule simpliciſſimo monostachyo, foliis lanceolatis. (superioribus lanceolatis, spica laxa. Flores digyni aut trigyni, albi, spica trigona, semina rotunda.) (Spicae flores inferiores in bulbos transeunt saepe viviparos.) (G.) Fl. dan. t. 13.

Habitat in pratis humentibas circa Sarscoje selo, Crasuoje selo, et in insulis Lapidea, et Camennoj nos satis in magna copia. Floret Majo, Iunio. 2 Горецъ живородный. Russ. Sobol.

261. POLYGONUM AMPHIBIUM. Floribus pentandris ſemidigynis, ſpica ovata. (Caule repente geniculato. In aquis foliis lanceolatis, petiolatis glabris, in arvis foliis acutioribus ſcabris variat: floribus utriſque purpureis, ſtaminibus corolla longioribus.) (G.) Fl. dan. t. 282.

Habitat in paludibus et ſtagnis uti in inſulis, apothecaria, lapidea, et in aliis ſimilibus. Floret Junio, Julio. 2 Горецъ водоземный. Russ. Sobol.

262. POLYGONUM HYDROPIPER. Floribus hexandris ſemidigynis, foliis lanceolatis, ſtipulis ſubmuticis, (ciliatis, floribus ſpicatis, ſpicis laxis nutantibus, caule erecto. Spicae elongatae cernuae. Folia ſubundulata.) (G.) Blackw. herb. t. 119.

Habitat in uliginoſis pratenſibus, et ad foſſas viarum frequens. ⊙ Горецъ водоперечный, Russ. Sobol.

263. POLYGONUM PERSICARIA. Floribus hexandris digynis, ſpicis ovato-oblongis, foliis lanceolatis, ſtipulis ciliatis. (Cauce dichotomo, ſpicae denſae interruptae ſaepius. Variat caule nodoſo, foliis maculatis et puris, ſubtus incanis.) (G.) Flor. dan. t. 702. Perſicaria, officin.

Habitat paſſim in locis cultis, ruderatis et ubique in foſſis humidis. Floret Junio, Julio. ⊙ Почечуйникъ. Russ. Горецъ почечуйный. Sobol.

264. POLYGONUM AVICULARE. Floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente, (ramoſiſſimo interdum erecto, vaginis laceris coloratis glauceſcentibus, ca-

lycibus inermibus, albo-rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 803. Centinodium officinarum.

Creſcit ubique ad vias et ſepes, in cultis, ruderatis. Floret Junio, Julio. ☉ Спорышъ. Russ. Горецъ птичій. Sobol.

265. POLYGONUM CONVOLVULUS. Foliis cordatis, caule volubili angulato, floribus planiusculis obtuſatis. (Flores digyni aut trigyni, albi, antheris rubris. Calyx fructus ſubfarinaceus, ſemina obtuſe trigona.) Flor. dan. t. 344.

In agris et hortis frequens eſt. Floret Junio, Julio. ☉ Горецъ обвиличный. Russ. Sobol.

TETRAGYNIA.

PARIS. Calyx tetraphyllus. Petala quatuor anguſtiora. Antherae medio filamentorum utrinque adnatae. Bacca quadrilocularis globoſa.

266. PARIS QVADRIFOLIA. (Caulis ſimplex, foliis ſeſſilibus ellipticis verticillatis quatuor aut quinque, bacca nigra, fuſco-violacea. Flor. dan. t. 139. Paris officinar.

Habitat in inſulis, apothecaria, lapidea, et ſylvis umbroſis paſſim. (G.) Floret Majo, Junio. ♃ Вороній глазъ. Russ.

ADOXA. Calyx bipartitus aut quinquepartitus, inferus. Corolla quadrifida ſive quinquefida. Bacca quadrilocularis aut quinquelocularis, cum calyce coalita. (Corolla lateralis decandra ſaepius.)

267. ADOXA MOSCHATELLINA. (Flore terminali octandro trifido, lateralibus decandris quin-

quefidis. Odorem gratum ſpirant. Fola terna: duo oppoſita, uno latere ſemel inciſa; ſolitarium trilobatum vel quadrilobatum. Flores pallide virides.) (L.) Fl. dan. t. 94.

Habitat in ſylvis ſubhumidis apricis, uti in inſula Camennoy Nos vocata, et in viciniis Sarscoſelii. Floret Majo. ♃ Мускатница. Russ. Sobol.

ELATINE. Calix triphyllus aut tetraphyllus. Petala tria aut quatuor. Capſula tri-vel quadrilocularis, tri-aut quadrivalvis, depreſſa.

268. ELATINE HYDROPIPER. Foliis oppoſitis, floribus alternis. (Caulis ramoſus geniculatus repens.) (G.) Flor. dan. t. 156.

Creſcit in ripis Nevae fluvii et in foſſis ex ſiccatis. Велвотъ. Russ. Велвотъ водопереченый. Sobol.

CLASSIS IX.

ENNEANDRIA

HEXAGYNIA.

BUTOMUS. Involucrum ſimplex, triphyllum. Petala ſex. Capſulae ſex polyſpermae, introrſum dehiſcentes. Semina parietalia.

269. BUTOMUS UMBELLATUS. (Pedunculi viginti et ultra ex ſummo culmo; petala ovata ex albo rubroque varia.) (G.) Flor. dan. t. 604.

Habitat in paludibus aquoſis, circa fluvium Wolchow, et ductum aquarum Ladogenſium, in ſtag-

nis Strelinae, Lacubus Ligovi, in foſſis aquaticis circa viam Peterhovianam ad Uljancam, Catharinhoffii, et Petropoli in littore parvae Nevae fluvii e regione Wiburgenſi: Floret Julio. 24 Сусакъ. Russ. Сусакъ пучкоцвѣтный. Sob.

CLASSIS X.

DECANDRIA

MONOGYNIA.

MONOTROPA. Calyx nullus, niſi petala quinque exteriora. Petala decem, horum quinque exteriora baſi excavata mellifera, gibba. Capſula quinquevalvis polyſperma. (Quinta pars numeri in lateralibus excluditur.)

270. MONOTROPA HYPOPITHYS. Floribus lateralibus octandris, terminali decandro. (Scapus ſquamis carneis, floribus decem magnis ſpicatis, nutantibus, flavis geniſtoideis. Staminibus ſex aut decem villoſis.) (L.) Flor. dan. t. 232.

Habitat in ſylvis umbroſis, annoſis humidiuſculis arenoſis, uti non procul a Catharinhoff; in monte Duderovo, et Oſinova Roſchcza, ad radices pini abietis et ſylveſtris atque ligna putrida. Floret Iulio. Paraſitica. 24 Уединенница подсосонная. Russ. Sobol.

LEDUM. Calyx quinquefidus. Petala quinque, patentia, plana. Capſula quinquelocularis, quinquefariam dehiſcens.

271. LEDUM PALUSTRE. Foliis linearibus, ſtaminibus decem corolla longioribus. (Foliis ſparſis, margine revolutis, ſubtus hirſutis, rubiginoſis, roſmarinoideis; floribus terminalibus corymboſis, albo-luteolis.) (G.) Fl. dan. t. 1031. Roſmarinus ſylveſtris, officinar.

In paludoſis, turfoſis, circa monaſterium Alexandro-Newſky, in monte Poclonnaja et paſſim in quantitate occurrit. Floret Aprili, Majo. ♄ Багонь болотный. Russ. Sobol.

ANDROMEDA. Calyx quinquepartitus, coloratus, minimus. Corolla campanulata quinquefida, magis minusve ovata. Capſula quinquelocularis, diſſepimentis valvis contrariis. Semina pauca. (Antherae nutantes, bicornes, muticae vel ariſtatae.)

272. ANDROMEDA POLIFOLIA. Umbellis terminalibus paucifloris, corollis ovatis nutantibus, foliis alternis lineari-lanceolatis revolutis. (Fruticulus caule purpureo repente, foliis ſubtus incanis; floribus umbellatis terminalibus, pedunculis nutantibus, albo-incarnatis corollis rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 54.

In ſylvis humidis circa cemeterium Sti. Iohannis, et in inſulis Nevae fluvii frequens eſt. Floret Majo, Iunio. ♄ Безплодница гладколистая. Russ. Sobol.

273. ANDROMEDA CALYCULATA. Racemis ſecundis foliaceis, corollis ſubcylindricis, foliis alternis lanceolatis obtuſis punctatis. (Antherae muticae bifidae.) (G.) Buxb. comment. Petropol. 1. t. 8. f. 1.

Habitat in ſylvis umbroſis humidis circa Murinam, et cum priori. Floret Majo, Iunio, et Auguſto. ♄ Безплодница точколистая. Russ. Sobol.

ARBUTUS. Calyx quinquepartitus. Corolla ovata, ore quinquefido baſi pellucida. Filamenta ſubulato-ventricoſa. Bacca quinquelocularis, ſupera, polyſperma.

274. ARBUTUS UVA URSI. Caulibus procumbentibus, foliis oblongo-ovatis integerrimis ſubtus reticulatis. (Floribus paucis decem aut undecem, bacca rubra. Folia glabra, ſubtus ſuperficialiter punctato-reticulata.) (G.) Flor. dan. t. 33. Uva urſi officinarum.

Habitat in pratis montoſis, in monte Poclonnaja, Pargelovii in Pinetis, in ſuperiori regione Nevae fluvii et ad Lugam locis flexilibus. Floret. Majo. ♄ Медвджьи ягоды. ſive Толокнянка. Russ.

PYROLA. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Antherae nutantes, ſurſum bicornes. Capſula quinquelocularis, angulis dehiſcens, diſſepimentis contrariis. Semina arillata plurima.

275. PYROLA ROTUNDIFOLIA. Staminibus adſcendentibus, piſtillo declinato, oblique truncato (Tubo incurvo.) (G.) Flor. dan. t. 110 pyrola officin.

Ubique in nemoribus umbroſis frequens. Floret Junio, Julio. 2 Грушовка. Russ. Грушовка круглолистая. Sobol.

276. PYROLA MINOR. Floribus racemoſis diſperſis, ſtaminibus piſtillis que rectis. (Foliis ſubro-

tundis obſolete crenulatis, dentibus calycis maculatis, petalis dorſo rubellis. Piſtillum rectum craſſum ſtaminibus dimidio longius, ſtigma vireſcens pentagonum.) (G.) Flor. dan. t. 55.

Habitat in ſylvis cum priori, ſed parcius. Floret Junio, Julio. ♃ Грушовка меньшая. Russ. Sobol.

277. PYROLA SECUNDA. Racemo unilaterali, (foliis ellipticis acuminatis, dentibus calycinis puris. Corolla ut plurimum clauſa. Piſtillum exſertum. Filamenta geniculata.) (G.) Flor. dan. t. 402.

Habitat in inſula apothecaria et paſſim in ſylvis. Floret Junio, Julio. ♃ Грушовка односторонная. Russ. Sobol.

278. PYROLA UMBELLATA. pedunculis ſubumbellatis. (G.)

Circa oſtium Nevae fluvii in pineto, aridis locis frequens. Floret Julio, Auguſto. ♃ Грушовка Пучкоцвѣтная. Russ. Sobol.

279. PYROLA UNIFLORA. Scapo unifloro. (Foliis ſubrotundis, calyce albo. Bractea majuſcula. Antherae baſi cornutae, cornibus incurvis. Stigma quadrifidum.) (G.) Flor. dan. t. 8.

Habitat in inſula Baſileenſi, circa fluvium tſchornaja, alibi nuſquam obvia. Floret Julio, Auguſto. ♃ Грушовка одноцвѣтная. Suss. Sobol.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM. Calyx ſuperus, coloratus, quadri ſive quinquefidus. Corolla nulla. Capſula bi-

roſtris, unilocularis, polyſperma, infera, ſemibivalvis. (Stamina interdum octo in floribus lateralibus.)

280. CHRYSOSPLENIUM ALTERNIFOLIUM. Foliis alternis. (Petiolis decurrentibus, floribus corymboſis, flavis. Calyx interdum quadrifidus; tum ſtamina octo. Capiulae maturae a ſe invicem dimovent, his facile ruptis, ſemina copioſa, ſpadicea, acarorum adinſtar conſpiciuntur.) (G.) Fl· dan. t. 366.

Habitat in ſylvis humidis umbroſis ubique. Floret Majo. ♃ Золотолистникъ круглолистый. Russ. Sobol.

SAXIFRAGA. Calyx quinquepartitus. Corolla quinquepetala. Capſula infera, biroſtris, bilocularis, polyſperma, inter ſtylos foramine dehiſcens. (Stamina perſiſtentia alterna longiora.)

281. SAXIFRAGA HIRCULUS. Foliis caulinis lenceolatis alternis nudis inermibus, caule erecto. (Caulis ſimplex, ſaepe biflorus. Calix reflexus. Flores nutantes. Petala flava, nervoſa. ab ungue ad dimidium punctis croceis maculata.) (L.) Flor. dan. t. 200.

Habitat in pratis humidis ſylvoſis ad Craſnoy cabac, item in paludoſis circa Catharinhoffium, et prope Ligova. Floret Junio, Julio. ♃. Каменосѣкъ козлій. Russ. Sobol.

SCLERANTHUS. Calyx monophyllus, inferus, ſemiquinquefidus. Corolla nulla. Semen unicum calyce incluſum, collo coarctato.

282. SCLERANTHUS ANNUUS. Calycibus fructus patulis inermibus. (Staminibus plerumque quinque breviſſimis; calyces acuti. Stigmata capitata flava. Foliis linearibus.) (G.) Flor. dan. t. 504.

Habitat in arvis circa montem Pulcovum, et in inſula apothecaria aliisque locis ſiccis ad vias paſſim. Floret Junio. ☉ Дивала годовяя. Russ. Sobol.

283. SCLERANTHUS PERENNIS. Calycibus fructus clauſis, (obtuſis. Flore majore. Stigmata ſimplicia alba.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 563.

Creſcit copioſe ad vias Pargelovii, et ad montem Pulcovum. Floret Junio, Julio. ♃ Дивала многолѣтняя. Russ. Sobol.

GYPSOPHILA. Calyx monophyllus, campanulatus, angulatus. Petala quinque ovata ſeſſilia. Capſula globoſa, unilocularis, quadri-aut quinquevalvis.

284. GYPSOPHILA MURALIS. Foliis linearibus planis, calycibus aphyllis, caule multiplicato-dichotomo ramoſiſſimo, petalis crenulatis. (Calycibus plerumque aphyllis; petalisque primo albis dein incarnato rubeliis lineis ſaturatioribus.) (G.) Mentz. pag. t. 7. f. 4.

Creſcit in pratis ſiccis et inter ſegetes prope Ligovo et Goreloy cabac. Floret Junio, Julio. ☉ Алабастренникъ стѣнный. Russ. Sobol.

DIANTHUS. Calyx monophyllus, tubuloſus, cylindricus, baſi ſquamis duabus aut octo. Petala quin-

que unguiculata. Capſula cylindrica, unilocularis, apice quadrifariam dehiſcens.

285. DIANTHUS DELTOIDES. Squamis calycinis binis, corollis crenatis. (Petala dentata rubra, baſi linea concentrica maculisque albis piliferis inſtructa.) (G.) Flor dan. t. 577.

Creſcit in inſulis, apothecaria, lapidea, et ubique in pratis exſuccis. Floret Junio, Julio. ♃ Гвоздичка ſive Травьянка Russ. Гвоздичка полевая. Sobol.

286. DIANTHUS PLUMARIUS. Squamis calycinis ſubovatis breviſſimis, corollis multifidis, fauce pubeſcentibus. (Calycibus longiſſimis. Odoratus.) (G.)

Creſcit circa oſtium Nevae fluvii una cum Pyrola umbellata et in littore arenoſo maris inter Peterhoffium et Oranienbaumium. Floret Junio, Julio. ♃ Гвоздичка перистая. Russ. Sobol.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS. Calyx inflatus. Petala quinque (rarius plura) bifida (ut plurimum) abſque corona ad faucem. Capſula trilocularis.

287. CUCUBALUS BACCIFERUS. Calycibus campanulatis, petalis diſtantibus, pericarpiis coloratis, ramis divaricatis. (Caulis flaccidus. Calyx quinquepartitus. Petala ad faucem nunc nuda, nunc ut in ſilenis coronata. Bacca ex ſucca unilocularis, nigra.) (G.) Gmelin. act. Petropol. 1759. t. 17. f. 1.

Habitat in ſalicetis ſupra oſtium Roſſonae et Lugam fluvium cum Narova jugentis, inde inferio-

ra verſus ad oſtium uſque Lugae fluvii frequens. Caeterum neque in Sibiria, neque hic in Ingria uſquam obſervata eſt. Floret Julio. ♃ Пузырникъ ягодный. Russ. Sobol.

288. CUCUBALUS BEHEN. Calycibus ſubglobo-ſis glabris, reticulato-venoſis, corollis ſubnudis. (Calyces venis viginti, capſulae ſexvalves, plerumquae.) (G.) Flor. dan. t. 857.

Habitat inter ſegetes et in pratis ſylvoſis Pargelovii, tum Petropoli in inſulis apothecaria, lapidea et petri. Floret Junio, Julio. ♃ Пузырникъ гладкій. Russ. Sobol.

289. CUCUBALUS TATARICUS. Petalis bipartitis, floribus ſecundis decumbentibus, pedunculis oppoſitis ſolitariis erectis, caule ſimpliciſſimo. (Folia lanceolata, in eriora petiolata, ſuperiora ſeſſilia et amplexicaulia. Calyx uno latere purpuraſcens.) (G.)

Habitat in ripa ſeptentrionali et elatiori Nevae fluvii ſupra pagum Oſtrovki dictum, et in ripa meridionali circa pagum Ribaczia. Floret Iunio, Iulio. ♃ Пузырникъ татарскій. Russ. Sobol.

SILENE. Calyx ventricoſus. Petala quinque unguiculata, ſaepe biſida, ad faucem coronata denticulis duobus. Capſula uni-five trilocularis.

290. SILENE NOCTIFLORA. Petalis biſidis, calycibus decemangularibus, dentibus tubum aequantibus, caule dichotomo. (Capſula unilocularis.) (R.) Cam. hort. t. 34.

Habitat circa Petropolim in ſylvis montoſis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Смолянка ночноцвѣтная. Russ. Sobol.

291. SILENE ACAULIS. Acaulis depreſſa petalis emarginatis, capſula cylindrica. (Foliis tenuiſſime ſpinuloſis, calycibus decagonis glabris fuſco-rubris. Dentibus calycinis margine albidis.) (G.) Flor. dan. t. 21.

Habitat in ſummitate montis Duderovii, et circa Craſnoſelium. Floret Iunio, Iulio. 2 Смолянка безстебельная. Russ. Sobol.

STELLARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque ut plurimum bipartita. Capſula unilocularis polyſperma.

292. STELLARIA NEMORUM. Foliis cordatis petiolatis, panicula pedunculis ramoſis. (Stolonibus reptantibus radicantibus, pedunculis dichotomis ſolitariis, petalis albis. Variat caulibus filiformibus, procumbentibus erectisque, internodiis rubris, petalis bifidis.) (G.) Flor. dan. t. 271.

Ad ripas umbroſas Nevae fluvii in inſulis, apothecaria, lapidea et in nemoribus frequentiſſima eſt. Floret Iunio. 2 Жвѣздочница лѣсная. Sobol.

293. STELLARIA HOLOSTEA. Foliis lanceolatis ſerrulatis, petalis bifidis. (Semibifidis, foliis plerumque lineari-lanceolatis, glabris, glaucis.) (G.) Flor. dan. t. 698.

Habitat ubique in ſylvis humidioribus. Floret Majo, Iunio. 2 Звѣздочница мягкая. Russ. Sobol.

294. STELLARIA GRAMINEA. Foliis linearibus integerrimis, floribus paniculatis. (G.) Mill. illuſtr. ic.

In fruticetis et dumetis ubique intra hypnum et Polytrichum frequens occurrit. Floret Majo, Iunio. 2 Звѣздочница травнистая. Russ. Sobol.

295. STELLARIA CRASSIFOLIA. Foliis ovato-lanceolatis craſſiuſculis, pedunculis unifloris ex dichotomia caulis, floribus erectis: corolla calycem ſuperante, capſulis reflexis. (R. Sob.) Erhart Hannöv. Mag. 1784. n. 8. p. 117.

Occurrit in monte Pulcovo et in ſyluis circa Petropolim, rarius. Floret Majo, Iunio. Durationis incertae. Звѣздочница толстолистая. Russ. Sobol.

296. STELLARIA DILLENIANA. Foliis linearilanceolatis, caule flaccido, pedunculis terminalibus bifloris. (Sob.) Moenc. fl. haff. n. 364.

Habitat in pratis humidis ſylvoſis. Floret Iunio. 2 Звѣздочница дилленіева. Russ. Sobol.

ARENARIA. Calyx pentaphyllus patens. Petala quinque integra. Capſula unilocularis, tri-aut ſexvalvis, apice dehiſcens, polyſperma.

297. ARENARIA PEPLOIDES. Foliis ovatis acutis carnoſis. (Glandulae in receptaculo.) (G.) Flor. dan. t. 624.

In ripis arenoſis circa Strelina et Oranienbaum, frequens eſt. Floret Majo, Iunio. 2 Пѣщанка остролистая. Russ. Sobol.

298. ARENARIA TRINERVIA. Foliis ovatis nervoſis petiolatis. (G.) Flor. dan. t. 329.

In ſylvis humidis frequens occurrit. Floret Majo, Iunio. ☉ Пѣщанка трижилистая. Russ. Sobol.

299. ARENARIA SERPYLLIFOLIA. Foliis ſubovatis acutis ſeſſilibus, corollis calyce brevioribus. (Tota villis hiſpida, ramoſiſſima, capſula baſi pentagona.) (Folia ſubconnata luci obverſa punctata.) (G.) Curtis fl. Londin. faſc. 45.

Habitat in arvis ſiccis et ad vias, uti ad viam regiam prope Strelina. Floret Iunio, Iulio, Auguſto. ☉. Пѣщанка точколистая. Russ. Sobol.

300. ARENARIA RUBRA. Foliis filiformibus oppoſitis internodiis duplo brevioribus, caulibus proſtratis, calycibus capſulis aequalibus. (G.) Loes. fl. pruss. t. 63.

In ripis arenoſis Nevae fluvii et ad margines ſylvarum in montoſis uti Pargelovii, in monte Poclonnaja atque Petropoli in ambulacris hortorum ſaepius occurrit. Floret Iunio, Iulio. ☉ Пѣщанка красная. Russ. Sobol.

PENTAGYNIA.

SEDUM. Calyx quinquefidus. Corolla monopetala aut pentapetala. Squamae nectariferae quinque ad baſin germinis. Capſulae quinque, diſcretae, leguminoſae introrſum dehiſcentes.

301. SEDUM TELEPHIUM. Foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto. (Folia ovata; corymbus ternus, trifido-ramoſus.) (G.) Flor. dan. t. 686.

Habitat in pratis circa Catharinenhoff, et in montofis Pargelovii, Ofinova Rofchcza, atque in monte Pulcovo, aliisque in locis ficcis arenofis. Floret Iunio, Auguſto. 24 Заячая капустка. Russ.

302. SEDUM ACRE. Foliis ſubovatis adnato-ſeſſilibus gibbis erectiuſculis alternis, cyma trifida. (Foliis ſparſis ovatis inferioribus minoribus, cyma bifida. Sapore equidem haud acre. Folia in ramis junioribus congeſta.) (G.) Knozr del. hort. 2. t. S. 12. f. 1.

In montofis arenofis, ubique uti in monte Poclonnaja, Pulcovo, Pargelovii, et in pratis ficcis inſulae lapideae aliarumque vulgaris planta eſt. Floret lunio, Iulio. 24 Молодило. Russ.

OXALIS. Calyx profunde quinquepartitus. Petala quinque unguibus connexa, ſubcampanulata, ſaepius contorta. Filamenta interdum in cylindrum connata, quinque longiora externe dente erecto. Capſula quinquevalvis. pentagona, angulis dehiſcens.

303. OXALIS ACETOSELLA. Foliis ternatis obcordatis piloſis, ſcapis unifloris. Acaulis. (Radix ſquamoſa articulata; petala alba macula flava ad unguem.) (G.) Zorn pl. med. ic. t. 9.

In ſylvis umbroſis ſubhumidis ubivis frequens eſt. uti in inſulis apothecaria, lapidea et baſileenſi. Floret Aprili, Majo, et Iunio. 24 Кислица щавельная. Russ. Sobol.

AGROSTEMMA. Calyx monophyllus, coriaceus, tubuloſus, quinque dentatus. Petala quinque un-

guiculata; limbo obtuſo, patente, plerumque indiviſo. Capſula unilocularis, quinquevalvis. Receptacula libera tot, quot ſemina, interiora gradatim longiora.

304. AGROSTEMMA GITHAGO. Hirſuta, calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis. (Dentes calycini corolla longiores.) (G.) Curtis fl. Londin. t. 209.

Inter ſegetes circa Ligovo et ubique vulgaris planta eſt. Floret Iunio. ☉ Куколь. Russ.

LYCHNIS. Calyx monophyllus oblongusmembranaceus, quinquedentatus, laevis. Petala quinque, unguiculata; limbo ut plurimum, fiſſo; fauce (ſaepius) coronata. Capſula uni-tri-ſeu quinquelocularis, quinquevalvis, ſubovata.

305. LYCHNIS FLOS CUCULI. Petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo. (Foliis apicibus rubellis, petalis roſeis. Capſula unilocularis quinquedenta.) (G.) Fl. dan. t. 590.

Habitat in pratis humidis circa Craſnoje ſelo, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Дрема. Russ. Дрема Кокушкина. Sobol.

306. LYCHNIS VISCARIA. Petalis ſubintegris, Capſula quinqueloculari. (Petalis rubris, caule ad geniculos viſcidos rubro.) (G.) Flor. dan. t. 1082.

Creſcit ubique in pratis montanis ſylvoſis, uti in inſulis apothecaria, Lapidea, et montibus Poclonnaja et Pulcovo. Floret Iunio, Iulio. ♃ Смолевка. Russ. Дрема смолистая. Sobol.

307. LYCHNIS DIOICA. Floribus dioicis. (Squamis quinque in faemina. Capſula unilocularis. Variat flore rubro.) (G.) Fl. dan. t. 792.

Habitat pratis et cultis ubique, varietas rubra occurrit in Strelina ad margines ſylvarum. Floret Majo. Iunio. ♃ Дрема двудомная. Russ. Sobol.

CERASTIUM. Calyx pentaphyllus. Petala bifida. Capſula unilocularis, apice dehiſcens decemdentata.

308. CERASTIUM VULGATUM. Foliis ovatis, petalis calyci aequalibus, caulibus diffuſis. (G.) Curtis Flor. Londin. t. 130.

Creſcit parce ad vias, in agris et hortis Petropoli. Floret Majo, Iunio. ☉ Роговикъ. Russ. Роговикъ обыкновенный. Sobol.

309. CERASTIUM VISCOSUM. Erectum, villoſoviſcoſum. (B.) Curtis Fl. Londin. t. 79.

Occurrit rarius circa Petropolim ad agrorum limites, et vias, uti in Ligovo, et Goreloy cabac. Floret Majo. ☉ Роговикъ клейкій. Russ. Sobol.

310. CERASTIUM SEMIDECANDRUN. Floribus pentandris, petalis integris, (profunde emarginatis, calyce brevioribus.) (Caeſpitoſum parvum ſubviſcoſum, foliis ovatis cauli adpreſſis, calycibus conicis ut plurimum clauſis. Variat ſtaminibus quinque et decem; in poſteriori caſu quinque prius apparent, his effoetis quinque alia obſervantur.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 122.

In inſulis apothecaria, baſileenſi et ubique ad ductus aquarum et in pratis copioſe provenit.

Floret Majo, Junio. ⊙ роговикъ полудесятный. Russ. Sobol.

311. CERASTIUM AQUATICUM. Foliis cordatis ſeſſilibus, floribus ſolitariis, capſulis pendulis, obtuſe ſeptangulis. Affinis ſtellariae nemorum. (Caulis diffuſus decumbens, flaccidus, apice viſcoſus. Folia undulata. Flores gemini, petalis lineis prominentibus. Capſula inflata qvinque-valvis; valvulae reflexae bifidae. Variat ſtylis quatuor aut quinque.) (Sob. R.) Curt. fl. Lond. t. 130.

Habitat in humidis circa Petropolim, uti ad ripas: lacuum Pargelovii, et Oſinovae Roſchczae, circa Sarſcoſelium in ſylvis et in locis ſimilibus. Floret Junio, Julio. ♃ роговикъ водяный Russ. Sobol.

SPERGULA. Calyx pentaphyllus. Petala quinque integra. Capſula ovata, unilocularis, quinquevalvis. Semina margine emarginato cincta.

312. SPERGULA ARVENSIS. Foliis verticillatis, floribus decandris. (Foliis nitidis teretiuſculis, panicula laxa dichotoma, ſtamina quinque aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 1033.

In arvis et hortis oleraceis ac locis arenoſis frequens. Floret Junio. ⊙ торица. Russ. торица полевая. Sobol.

313. SPERGULA NODOSA. Foliis oppoſitis ſubulatis laevibus, caulibus ſimplicibus, (unifloris, petalis albis, ſtylis tribus aut quatuor.) (G.) Flor. dan. t. 96.

Habitat in pratis montoſis, uti in monte Pulcovo Pargelovii, et ad radices montis Duderovii, cir-

ca urbem Sophiam et Gatczinam, atque ad ripam fluvii Ochtae prope fabricam pyriam. Floret Juuio, Julio. 2 торица узловатая. Russ. Sobol.

314. SPERGULA LARICINA. Foliis oppositis subbulatis ciliatis fasciculatis. (Folia rigida, setacea, basi connata ciliata. Corolla nivea, magnitudine stellariae Holosteae, pedunculi filiformes. Stamina decem: quorum quinque breviora.) (Sob.) Flor. dan. t. 858.

Habitat circa Petropolim in pratis humidis argillosis duris, uti prope Ligovo, Goreloy cabac, et in urbe circa Nosocomium terrestre et maritimum. Floret Junio, Julio. 2 Торица лиственничная. Russ. Sobol.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA MONOGYNIA.

ASARUM. Calyx superus trifidus aut quadrifidus, coloratus laciniis apice inflexis. Corolla nulla. Filamenta duodecim. Capsula coronata, coriacea sub sexlocularis evalvis, dissepimentis ad axim solutis.

315. ASARUM EUROPAEUM. Foliis reniformibus obtusis binis. (Hexagyna, pedunculo unifloro nudo inter petiolos binos.) (G.) Flor. dan. t. 633. Asarum officin.

Habitat in ſylvis circa Sarſcoſelium, in monte pulcovo et Duderovo, et ad fluvium Wolchow. Floret Majo. ♃ Подлѣсникъ ſive копытень. Russ. Копытень подлѣсный. Sobol.

LYTHRUM. Calyx ſex-aut duodecim fidus, ſtriatus, denticulis alternis minoribus. Corolla hexapetala, petalis calycis inciſuris inſertis. Filamenta ſex aut duodecim. Capſula bilocularis tecta polyſperma.

316. LYTHRUM SALICARIA. Foliis cordato-lanceolatis, oppoſitis floribus ſpicatis dodecandris, (verticillis ſub octodecimfloris, capſula triloculari.) (G.) Flor. dan. t. 671. Lyſimachia purpurea, officin.

Creſcit copioſe in paludibus Catharinhoffii, et ad foſſas paſſim. Floret Junio, Julio. ♃ Вербовникъ, ſive плакунъ. Russ. Плакунъ вербовный. Sobol.

DIGYNIA.

AGRIMONIA. Calyx quinquedentatus, ſuperus, altero calyce obvallatus. Corolla pentapetala. Filamenta ſeptem, aut duodecim. Semina duo in fundo calycis indurati pericarpii loco.

317. AGRIMONIA EVPATORIA. Foliis caulinis pinnatis, ſerratis: impari petiolato, fructibus hiſpidis. (Fructibus decemſulcatis, ſetis uncinatis erectis.) (G.) Flor. dan. t. 588.

Habitat in Strelina ad margines ſylvarum, ſed non admodum frequens in aliis locis occurrit: frequentiſſima eſt in monte Duderovo. Floret

Iulio, Auguſto. 2 Variet. β Odorata, ibidem occurrit. Репникъ. Russ. ſive Репешникъ, ſive кошка, репникъ благовонный. Sob.

TRIGYNIA.

EUPHORBIA. Calyx monophyllus ventricoſus, ore quadridentato aut quinquedentato. Corolla petalis quatuor vel quinque, calyci alternatim impoſitis, craſſis, truncatis. Stamina decem ad viginti quinque. Germine pedicellato. Capſula tricocca, triloculari.

318. EUPHORBIA PEPLUS. Umbella trifida, dichotoma, involucellis ovatis, foliis integerrimis obovatis petiolatis, (Petala bicornia lunata, ciliata. Capſulae trigonae: anguli rugoſi margine quaſi dehiſcentes.) (G.) Bulliard herb. Franc. t. 79.

Habitat in locis cultis paſſim, et circa montem Duderovium. Floret Iunio, Iulio, et Auguſto. ☉ Волчее молоко. Russ. Едкомлечникъ плащевый. Sobol.

319. EUPHORBIA HELIOSCOPIA. Umbella quinquefida, trifida: dichotoma, involucellis obovatis, foliis cuneiformibus ſerratis. (Petalis integris fuſco-viridibus, fructibus laevibus.) (G.) Flor. dan. t. 726.

Habitat paſſim inter ſegetes praecipue circa Ligovo, et Pulcovo. 2 Едкомлечникъ солненый. Russ. Sobol.

320. EUPHORBIA PALUSTRIS. Umbella multifida, ſubtrifida, bifida, involucellis ovatis, foliis

lanceolatis, ramis ſterilibus. (Radice tuberoſa, cruribus longiſſimis, caulibus erectis, aſcendendo hirſutis, flore centrali pentapetalo ſterili, reliquis tetrapetalis obtuſiſſimis, integris, calyce pilis albis, ſtamina lutea. Capſula verrucoſa. Lac. acre.) (G.) Flor. dan. t. 866. Eſula, officinarum.

Habitat in pratis paludoſis inſulae lapideae ad ripam occidentalem fluvii, et circa montem Duderovium, atque in pratis prope urbem Narvam Floret Junio, Julio. ♃ Едкомлечникъ болотный. Russ. Sobol.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM. Calyx ſex partitus aut duodecim partitus. Petala ſex ad dnodecim. Stamina ſex ad duodecim. Germinibus ſex ad duodecim, capſulis totidem in orbem poſitis leguminoſis introrſum dehiſcentibus.

321. SEMPERVIRUM TECTORUM. Foliis ciliatis, propaginibus patentibus. (G.) Curtis flor. Londin. t. 160. Sempervivum majus, officin.

Circa oſtium priſtannoj rutchej in Lugam fluentis ad radicem collis magna copia creſcit. Floret Julio, Auguſto. ♃ Дикой чеснокъ .Russ. живучка кровельная. Sobol.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA

MONOGYNIA.

PRUNUS. Calyx quinquefidus, inferus. Petala quinque. Stamina viginti ad triginta. Drupae uniloculáris ſuperne claufae nux ſuturis prominulis.

322. PRUNUS PADUS. Floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglanduloſis. (Arbor cortice rubente fuſco, foliis venis atris, floribus odoratiſſimis, fructus pulpa viridis officulo pedunculato, ſemine ſapore perfici.) (G.) Flor. dan. t. 205.

Habitat in inſulis, lapidea, cruris, rotunda, et ubivis in ſylvis. Floret. Majo, Junio. ♄ Черемха. Russ.

DIGYNIA.

CRATAEGUS. Calyx ſuperus quinquefidus. Corolla pentapetala. Stamina viginti. Bacca carnoſa infera umbilicata monoſperma aut polyſperma, unilocularis.

323. CRATAEGUS OXYACANTHA. Foliis obtuſis ſubtrifidis ſerratis. (Foliis venis nervisque notabilioribus villoſis, ſuperne obſolete trilobis, calycis laciniis nunquam reflexis. Stylus interdum

unus. Numerus ſtylorum et ſeminum duo ad quatuor.) (Sob.) Flor. dan. t. 634.

Habitat in ſylvis ad fluvium Lugam ♄ Боярешникъ Russ.

TRIGYNIA.

SORBUS. Calyx ſuperus quinquefidus. Petala quinque. Stamina viginti. Bacca infera, ſuperne aperta, tri-vel quinque locularis, tri-aut pentaſperma.

324. SORBUS AUCUPARIA. Foliis pinnatis utrinque glabris. (Arbor frondoſa. Calyx laciniis quinque carnoſis, flores racemoſi ſubumbellati, albi, petalis patentiſſimis, fructus ruberrimi minimi, pomiformes, pentaſpermi.) (G.) Flor. dan. t. 1034.

Habitat paſſim in ſylvis. Floret Junio. ♄ рябина. Russ. рябина птичничья. Sobol.

PENTAGYNIA.

PYRUS. Calyx quinquefidus, ſuperus. petala quinque. Stamina viginti. pomum inferum quinqueloculare polyſpermum.

325. PYRUS MALUS. Foliis ſerratis, umbellis ſeſſilibus, unguibus calyce brevioribus. Stylis glabris. (pedunculis brevioribus, calyce magis prominente, fructu ſphaerico quinqueloculari.) (Sob.) Blackw. herb. t. 178.

Habitat in ſylvis vicinis circulo Carelienſi. Floret Majo, Junio. ♄ Яблонь. Russ. Яблонь дикая. Sob.

SPIRAEA. Calyx quinquefidus, inferus. Petala quinque. Stamina viginti et ultra. Capſulae polyſpermae quatuor vel plures, uniloculares, bivalves. Semina futurae internae affixa.

326. SPIRAEA FILIPENDULA. Herbacea, foliis interrupte-pinnatis, foliolis lineari-lanceolatis interrupte ſerratis, glaberrimis, floribus cymoſis, (odoratis, albis, maculis ſanguineis, interdum hexapetalis, calyce reflexo, ſtamina quatuordecim ad quinquaginta.) (Sob.) Flor. dan. t. 635. Filipendula, officin.

Creſcit in pratis circa Lugam fluvium. Floret Julio. 2. Таволга нитковислая. Russ. Sobol.

327. SPIRAEA ULMARIA. Herbacea foliis interrupte pinnatis, foliolis ovatis biſerratis ſubtus canis, floribus cymoſis, (odoratis, puris, reflexis. Stamina triginta. Capſulis contortis. Foliis ſubſtipulatis.) (G.) Flor. dan. t. 547. Ulmaria, officin.

Habitat paſſim in ſylvis umbroſis humidis praeſertim ad ripas Nevae fluvii, in inſula apothecaria, lapidea et ubique. Floret Junio, Julio. 2 Царица луговъ. Russ. Таволга илемная. Sob.

POLIGYNIA.

ROSA. Calyx quinquefidus, urceolatus, carnoſus, collo coarctatus, demum baccatus, coloratus. Petala quinque. Antrum, ſive Bacca duplicata unilocularis ſuperne aperta, pericarpiis oſſeis intus nidulantibus. Semina copioſa, hiſpida, calycis interiori lateri affixa.

328. ROSA SPINOSISSIMA. Germinibus globoſis glabris, pedunculis hiſpidis, caule petiolisque aculeatiſſimis. (Foliolis novem acute ſerratis, ſpinulis rubeſcentibus, pedunculis germinibusque carmeſinis concoloribus, calycibus indiviſis coloratis, flore rubello. Variat petalis albis, odorata.) (G.) Flor. dan. t. 398.

Habitat in montoſis et locis apricis ſylveſtribus, uti in monte duderovo, et Pargelovii. Floret Julio. ♄ Шиповникъ колючій. Russ. Sobol.

329. ROSA CANINA. Germinibus ovatis pedunculis que glabris, caule petiolisque aculeatis. (Calycibus ſemipinnatis, bracteis duabus oppoſitis ciliatis, petalis bilobis, niveis, carneis, rubris odoratis. Variat pedunculis unifloris et bifloris, calycibus ovatis et ſubgloboſis.) (Sob.) Flor. dan. t. 555. Roſa canina. officin.

Habitat in ſylvis montoſis circa jamburgum et in monte Duderovo. Floret Junio, Julio. ♃ Шиповникъ простый. Russ. Sobol.

RUBUS. Calyx quinqueſidus Corolla pentapetala. Drupae congregatae uniloculares, receptaculo conico baccanti ſuperimpoſitae.

330. RUBUS IDAEUS. Foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato, petiolis canaliculatis. (Coſta plerumque inermi, foliis ſubtus albis. Stamina ſexaginta, fructu rubro et villoſo.) (G.) Flor. dan. t. 788. Rubus idaeus, officin.

Ubique inſylvis prope urbem Petropolim copioſiſſime provenit: uti Catharinhoſii, in inſulis, apothecaria et Lapidea et Camennoj Nos; atque in

monte poclonnaja. Floret Majo, Iunio. ♂ Малина. Russ. Variat fructu albo, in hortis. Малина бѣлая. Russ.

331. RUBUS FRUCTICOSUS. Foliis quinato-digitatis ternatisque, caule petiolisque aculeatis, (ſpinoſiſſimis, floribus racemoſis, calyce reflexo, bacca nigra, acinis quatuordecim.) (G.) Regn. bot. t. 394.

Habitat in ſylvis humidis umbroſis, ad viam Wiburgenſem in monte poclonnajà, in Oſinova Roſchcza, et prope Narvam. Floret Iunio, Iulio. ♄ Ежевика. Russ.

332. RUBUS SAXATILIS. Foliis ternatis nudis, flagellis reptantibus herbaceis. (Staminibus triginta, aut quadraginta. Foliis rugoſis, obovatis, inaequaliter ſerratis, non in canis. Flores leviter odorati; fructus aciduli.) Flor. dan. t. 134.

In ſylvis copioſe provenit, uti in inſulis, apothecaria, lapidea, et paſſim. Floret Iunio. ♄ Каменика, ſive Костяница. Russ.

333. RUBUS ARCTICUS. Foliis ternatis, caule inermi unifloro. (Flore purpureo, fructu rubro.) (G.) Flor. dan. t. 468. Rubus arcticus, officin.

Habitat in inſula apothecaria, prope cemeterium, et in ſylvis humidis paſſim inter Petropolim et Peterhovium, atque ad viam Wiburgenſem, Floret Iunio. ♃ Княжница. Russ.

334. RUBUS CHAMAEMORUS. Foliis ſimplicibus lobatis, caule inermi unifloro, floribus dioicis. (Herba dioica, vel Radix Maris et feminae unita ſubterra in monoica.) (G.) Flor. dan. t. 1. Chamaemorus, officio.

Creſcit in ſylvis paludoſis, circa pagum Murinam, nec non Monaſterium Newſkoj, et Ozerki, et paſſim, ſatis copioſe. Floret Iunio. ♃ Морошка. Russ.

FRAGARIA. Calyx decemfidus, laciniis alternis exterioribus minoribus reflexis. Petala quinque. Stamina viginti in ordine uno diſpoſita, Semina nuda glabra, Receptaculo ovato baccanti, deciduo, colorato, ſuperimpoſita.

335. FRAGARIA VESCA. Foliis omnibus ternatis, flagellis reptantibus. (G.) Knorr. del. hort. 1. t. E. 1. Fragaria, officin.

Creſcit in ſylvis Sterilibus, et montoſis paſſim. Floret Majo, Iunio. ♃ Земляника. Russ.

POTENTILLA. Calyx decemfidus, laciniis alternis minoribus reflexiis. Petala quinque. Stamina viginti. Semina ſubrotunda nuda, rugoſa, receptaculo parvo exſucco fungoſo, tuberculato affixa.

336. POTENTILLA ANSERINA. Foliis pinnatis ſerratis, caule repente, pedunculis unifloris. (Folia interrupte pinnata, ſubtus alba, ſtolones repentes rubri.) (G.) Flor. dan. t. 544.

In pratis et ad vias nihil frequentius eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Гусиная трава. Russ. Морущикъ Гусоный. Sobol.

337. POTENTILLA ARGENTEA. Foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. (Caule firmo decumbente ſaepius, petalis ſulphureis exiguis.) (G.) Flor. dan. t. 865.

Habitat in montosis siccis sabulosis; in monte Poclonnaja, Pulcova, et in insula lapidea, aliisque in locis similibus. Floret Iunio, Iulio. 24 Серебреникъ seu. пятилистникъ. Russ. Могущикъ серебреный. Sobol.

338. POTENTILLA REPTANS. Foliis quinatis, caule repente, pedunculis unifloris. (Radiculis ex geniculis, floribus luteis.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 29. Quinquefolium, officin.

Ad ductus aquarum circa viam Peterhovianam frequens est. Floret Iunio, Iulio. 24 Могущикъ пятилистый. Russ. Sobol.

339. POTENTILLA NORVEGICA. Foliis ternatis, caule dichotomo, pedunculis axillaribus. (F. Sob.) Flor. dan. t. 171.

Habitat in sylvis prope Sarscoje selo, Pargelovii, in Murina et Osinova Roschcza, tum Petropoli in hortis oleraceis et ruderatis. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Могущикъ норвежскій. Russ. Sobol.

TORMENTILLA. Calyx octosidus, laciniis exterioribus minoribus obcordatis. Petala quatuor. Stamina sexdecim, Semina octo subrotunda, nuda, receptaculo parvo exsucco affixa.

340. TORMENTILLA ERECTA. Caule erectiusculo, foliis sessilibus, (quinatis, radicalibus longopetiolatis, ternatis.) (G.) Flor. dan. t. 598. Tormentilla officin.

Habitat in pratis apricis sylvosis satis copiose, uti in regione Wiburgensi ultra Nosocomia, circa cemeterium Sti Iohannis, in insula apothecaria,

et paſſim. Floret Junio, Julio. 2 Завязной корень. Russ. Завязникъ стоячій. Sobol.

GEUM. Calyx decemfidus laciniis exterioribus minimis. Petala quinque, ſtamina viginti. Styli terminales. Semina ariſta geniculata. Receptaculum columnare, calycı reflexo impoſitum.

341. GEUM URBANUM. Floribus erectis, fructibus globoſis villoſis, ariſtis uncinatis nudis, foliis lyratis, (pinnis rhomboideis, flore luteo.) (G.) Flor. dan. t. 672. Caryophyllata, officin.

Habitat in ſylvis umbroſis circa fabricam pyriam Ochtenſem, in Strelina, ad viam Peterhovianam et paſſim. Floret Iunio. 2 Гравилатъ s. Гребенникъ. Russ. Гвоздичникъ аптекаркій. Sobol.

342. GEUM RIVALE. Floribus nutantibus, fructu oblongo, ariſtis plumoſis tortis. (Folia pinnis frequentioribus, extrema ſemitrifida, calyce profunde partito lanuginoſo purpureo, petalis rubris, lineis ſanguineis interne. Stamina nonaginta quinque.) (G.) Flor. dan. t. 722.

Habitat in pratis humidis et ripis Nevae fluvii, in inſulis apothecaria, lapidea, Camennoy Nos et ad ductus aquarum paſſim. Floret Majo, Iunio. 2 Гравилатъ, ſev Гребенникъ. Russ. Гравилатъ ручейный. Sobol.

COMARUM. Calyx decemfidus, perſiſtens, laciniis alternis inferioribus minoribus coloratis. Petala quinque calyce minora. Semina nuda glabra. Receptaculum carnoſum, globoſum, villoſum, perſiſtens.

343. COMARUM PALUSTRE. Foliis pinnatis, petalis calyce minoribus. (Caulibus proſtratis erectis que, foliis hirſutis, petalis calyce odorato minoribus rubris, ſtaminibus viginti rubris.) (G.) Flor. dan. t. 686.

Habitat in paludibus frequens. Floret Iunio. ♃ Сабельникъ раменный. Russ. Пятилистникъ болотный. Sobol.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA

MONOGYNIA.

ACTAEA. Calyx tetraphyllus. Stamina viginti ad triginta. Bacca unilocularis uniſulca. Semina ſemiorbiculata, ordine gemino.

344. ACTAEA SPICATA. Racemo ovato, fructibus baccatis. (Foliis duplicato-pinnatis, ſerratis, pinnula extrema biloba. Calyx lacteus, purpura coloratus. Corollae petala nivea, ligulatá, ſtigma oblique depreſſum, bacca globoſa coriacea.) (G.) Flor. dan. t. 498. Chriſtophoriana officin.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, atque in aliis ſylvis umbroſis montoſis. Floret Majo, Iunio. ♃ Воронецъ, ſive Христофорова трава. Russ.

CHELIDONIUM. Calyx monophyllus. Stamina triginta. Siliqua unilocularis, cylindracea, ſubbi-

valvis. Receptaculum lineare inter valvas futurae inſtar circumambientis feneſtrale, ſeminibus hilo auctis repletum.

345. CHELIDONIUM MAJUS. Pedunculis umbellatis. (Siliqua matura nodoſa unilocularis, breviſſima, caule piloſo.) (G.) Flor. dan. t. 542. Variat foliis quernis. Flor. dan. t. 676. Chelidonium majus, officin.

In ruderatis et cultis Petropoli, et in ſylvis humidis Strelinae, ad Staraja Ladoga alibique copioſe provenit. Floret Junio, Julio. ♃ Чистякъ, ſive Чистотѣлъ большой. Russ.

PAPAVER. Calyx diphyllus. Corolla tetrapetala. Stigma peltatum, radiatum, crenatum. Capſula ſubmultilocularis, ſub ſtigmate perſiſtente poris dehiſcens. Stylus nullus. (Pori dehiſcentes, in Pap. ſomnifero.)

346. PAPAVER SOMNIFERUM. Varietas, effluens. Capſulis globoſis glabris minoribus, poris dehiſcentibus majoribus, floribus albis, ſemine nigro. (Sob.)

Habitat ſpontaneum in hortis oleraceis, tum praecipue in hortis ruralibus et ad ſegetes prope Goreloy cabac, et Ribaczja, et in pluribus aliis locis. Floret Iulio. ☉ Макъ бѣлый. Russ. (Sob.) ita vocatur, quia ſemina ejus cito e capſula effluunt, unde colligi nequeunt, vel raro.

NYMPHAEA. Calix tetra-aut pentaphyllus, inferus magnus, ſupra coloratus. Filamenta ſeptuaginta ſaepe. Stigma peltato-ſeſſile. Bacca multilocu-

laris (10-15 locularis) truncata, coronata, corticosa, polyspermа.

347. NYMPHAEA LUTEA. Foliis cordatis integerrimis, calyce pentaphyllo majore. (Fructu pyriformi.) (G.) Flor. dan. t. 603.

In stagnis paludosis et fluviis lente currentibus copiose provenit, et in insula apothecaria atque lapidea, et Catharinhoffii occurrit passim. Floret Junio, Julio. ♃ Кушинчики. Russ. кушинчикъ желтый. Sobol.

348. NYMPHAEA ALBA. Foliis cordatis integerrimis, calyce quadrifido. (Fructus globosi, flores saepius pleni.) (G.) Flor. dan. t. 602. Nymphaea officin.

Habitat in aquis stagnantibus cum praecedente. Floret eodem tempore. ♃ Кушинчикъ бѣлый. Russ. Sobol.

TILIA. Calyx quinquepartitus deciduus. Corolla pentapetala. Stamina triginta et ultra. Bacca sive capsula globosa, quinquelocularis, corticosa, quinquevalvis, basi dehiscens.

349. TILIA EUROPAEA. Floribus nectario destitutis, baccis quadrilocularibus. (Foliis cordatis, serratis acuminatis.) (G.) Flor. dan. t. 553. Tilia officin.

Habitat ad fluvium Lugam, et passim in sylvis. Floret Iunio, Iulio. ♄ Липа. Russ. Липа Европейская. Sob.

CISTUS. Calyx pentaphyllus, foliolis duobus alternis inferioribus minoribus. Capsula unilocularis vel decemlocularis, trivalvis aut decemvalvis.

350. CISTUS HELIANTHEMUM. Caulis procumbens, ſtipulis lanceolatis, foliis oblongis revolutis ſubpilofis. (Caules longi rubentes. Calyx venis ſanguineis, ſtipulis calyce longioribus.) (G.) Fl. dan. t. 101. Obſerv. ſi filamenta baſi irritentur, in primis tempere matutino ſeu aëre humido, mox ad petala ſe reclinant tanta vi, ut antherae piſtillo ſuperſedeant.

Habitat in collibus circa urbem Gatczinam, et in Kojrova. Floret Iunio, Iulio. ♄ Будра. Russ. Будра солнцоцвѣтная. Sobol.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM. Calyx nullus. Corolla pentapetala, aut hexapetala, ſupremo cornu coronato. Nectarium bifidum, pone cornutum. Stamina quindecim ad triginta. Capſulae leguminoſae ſubternae, receptaculo communi affixae introrſum dehiſcentes, polyſpermae.

351. DELPHINIUM CONSOLIDA. Nectariis monophyllis, caule ſubdiviſo. (Flore caeruleo, interdum albo.) (G.) Fl. dan. t. 683. Conſolida regalis, officin.

Habitat in agris inter ſegetes, uti in Ligova, et Craſnoje ſelo. Floret Iunio, Iulio. ☉ Кавалерскіе шпоры. Russ.

ACONITUM. Calyx nullus. Petala quinque, ſupremo galea fornicato, lateribus conniventibus: nectariis duobus pedunculatis, reconditis, recurvis, ſquamulis ſex. Capſulae leguminoſae tres aut quinque, receptaculo communi affixae, introrſum dehiſcentes. Seminibus arido-baccatis.

352. ACONITUM LYCOCTONUM. Foliis villoſis palmatis multifidis, laciniis brevibus obtuſiuſculis, nectariis rectiuſculis. (Foliis glabris, variis, laciniis lanceolatis, petalo ſupremo apice dilatato, cylindraceo, flore luteo vel ochroleuco. Stamina viginti ſex.) (G.) Jacqu. Fl. auſtr. 4. t. 380. Variat flore caeruleſcente.

Habitat ad fluvium Wolchow ſugra pagum Czertovo. Floret Julio. 2 Волчій корень. Russ. Волкобой. Sobol.

PENTAGYNIA.

AQUILEGIA. Calyx nullus. Petala quinque. Nectaria quinque inferne corniculata intra petala. Stamina triginta ad quadriginta. Paleae decem germen involventes. Capſulae quinque leguminolae, receptaculo communi affixae, introrſum dehiſcentes.

353. AQUILEGIA VULGARIS. Nectariis incurvis, petalo ſubaequalibus, caule folioſo multifloro, foliolis omnibus petiolatis. (Lobis omnibus ſubrotundis obtuſiſſimis divergentibus. Variat, flore ſimplici, pleno, caeruleſcente, albo, roſeo, rubro.) (Sob.) Flor. dan. t. 695.

Habitat in ſylvis herboſis circa vicum Strelina, ubi dantur plures ejus varietates. Floret Junio, Julio. 2 Голубки, павлинные очки. Russ. Водосборъ обыкновенный. Sobol.

HEXAGYNIA.

STRATIOTES. Spatha diphylla. Perianthium trifidum aut triphyllum. Petala tria. Flores inter-

dum dioici. Bacca ſexlocularis, hexagona, intra ſpatham tecta, infera.

354. STRATIOTES ALOIDES. Foliis enſiformi-triangulis ciliato-aculeatis. (G.) Flor. dan. t. 337.

In aquis ſtagnantibus Catharinhoffii et paſſim Floret Iunio. ♃ Тѣлорѣзъ большой. Russ. Sobol.

POLYGYNIA.

ANEMONE. Calyx plurimis nullus. Petala quinque ad undecim, in duobus aut tribus ordinibus. Receptaculum excavato-punctatum. Capſulae plures mucronatae aut caudatae ſtylum retinentes.

355. ANEMONE HEPATICA. Involucro triphyllo calyciformi, foliis trilobis integerrimis. (Stamina quadraginta ſex. Styli triginta ſex. Variat: flore caeruleo, ſimplici albo et duplici.) (G. Flor. dan. t. 610. Hepatica nobilis, officin.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo, ac paſſim in ſylvis montoſis fruticoſis lapidoſisque. Floret ſub finem Aprilis, et initio Maji. ♃ Трилистникъ чистой. Russ. Вѣтреница печеночная. Sob.

356. ANEMONE VERNALIS. Pedunculo involucrato, foliis pinnatis, pinnis inciſo-lobatis, ſcapo unifloro, hirſutiſſimo, flore ſubnutante ſubtus rubro caeruleſcente, ſupra albo, hexapetalo. (B.) Flor. dan. t. 29.

Habitat in montoſis circa urbem Narvam. Floret Majo. ♃ Вѣтреница весенная. Russ. Sobol.

357. ANEMONE PULSATILLA. Pedunculo involucrato, foliis bipinnatis, petalis rectis. (Flore pendulo, purpureo coeruleove diluto.) (G.) Flor. dan. t. 153. Pulsatilla officin.

Ad ostium Narovae fluvii in pineto locis aridis copiose provenit. Floret Majo. ♃ Простръль. Russ. Вѣтреница простръльная. Sob.

358. ANEMONE NEMOROSA. Caule unifloro, foliolis incisis, seminibus acutis. (Foliis ternis nitidis, incisis petiolatis pedunculo brevioribus. Stamina sexaginta ad octoginta; antheris et stigmatibus albis, petalis sex albis, Seminibus subtomentosis. Variat, petalis subtus purpereis.) (G.) Flor. dan. t. 549. Ranunculus albus, officin.

Habitat ubique ad margines sylvarum et inter frutices, atque in insulis, Basileensi, lapidea et apothecaria frequentissima est. Floret Majo. ♃ Вѣтреница лѣсная. Russ. Sobol.

359. ANEMONE RANUNCULOIDES. Caule subbifloro, petalis subrotundis, foliolis incisis, seminibus acutis. (Foliis ternis incisis subsessilibus pedunculo longioribus. Petalis luteis saepius maculis albis. involucro unifloro, aut trifloro. Seminibus glabris.) (G.) Flor. dan. t. 140.

Habitat in monte Pulcovo et Duderovo, etiam in sylvis insularum besileensis, lapideae, Petri, crucis, et apothecaria, atque etiam in hortis spontanea inter fragariam aliasque plantas. Floret Majo. ♃ Вѣтреница желтая. Russ. Sobol.

THALICTRUM. Calyx nullus. Petala quatuor aut quinque. Capsulae plures, sulcatae, rostratae, seminiformes, monospermae.

360. THALICTRUM ANGUSTIFOLIUM. Foliolis lanceolato-linearibus integerrimis. (Foliis interdum duplicato-pinnatis, pinnis unilobis aut bilobis, alternis trilobis, ad oras membranaceis hirſutulis, caule nudo; umbella, racemove florum ochroleucorum terminato. In umbra odorem ſambucinum ſpargit.) (G.) Jacq. hort. vind. 3. t. 43.

Habitat in pratis humidis, in ripis umbroſis Nevae fluvii circa Catharinhoff, in inſula rotunda, et apothecaria prope fabricam pyriam, atque in multis aliis locis ſimilibus. Floret Iunio. ♃ Золотуха узколистая. Russ. Sobol.

361. THALICTRUM FLAVUM. Caule ſulcato folioſo, foliolis acute trifidis, panicula multiplici erecta denſa, floribus erectis. (Foliola craſſiuſcula, ſubtus venis prominentibus floribus flavis, flaveſcit.) (G.) Flor. dan. t. 939.

Habitat in pratis ſylveſtribus humidis, uti circa Sarſkoje ſelo, et Craſnoje ſelo. Floret Iunio. ♃ Золотуха желтая. Russ. Sobol.

362. THALICTRUM AQUILEGIFOLIUM. Caule tereti, fructibus pendulis triangularibus rectis. (Foliis ad exortum et diviſiones ſtipulis rotundatis, floribus umbellatis denſiſſimis, petalis quatuor exalbidis valde convexis. Variat ſtaminibus purpureo-violaceis et albis.) (G.) Jacq. Fl. auſt. 4. t. 318.

Habitat in ripa umbroſa Nevae fluvii prope Catharinhoff, tum ad fluvium Wolchow, et in ſylvis umbroſis ad viam Pargelovienſem, et circa Murzincam. Floret Junio. ♃ Заспляса. Russ. Золотуха водосборная. Sobol.

RANUNCULUS. Calyx deciduus pentaphyllus, (rarior triphyllus.) Petala quinque, (rarius tria aut octo.) Nectarium fovea vel ſquamula in ſingulo petalo ſupra ungvem. Styli nulli. Stigmata reflexa perſiſtentia. Semina incruſtata erecta.

363. RANUNCULUS REPTANS. Foliis linearibus, caule repente. (G.) Flor. dan. t. 108.

In ripis arenoſis Nevae fluvii circa inſulas apothecariam lapideam, aliisque quae aquis ſaepe inundantur frequens occurrit. Floret Junio, Julio. 2 Купальница. Russ. Жабникъ ползучій. Sobol.

364. RANUNCULUS FLAMMULA. Foliis ovato-lanceolatis petiolatis, caule declinato. Calyx corolla flava comoſus, petala integra. (G.) Flor. dan. t. 572.

In uliginoſis inſularum Nevae fluvii et paſſim frequens occurrit. Floret Junio, Julio. 2 Жабникъ огненный. Russ. Sobol.

365. RANUNCULUS LINGUA. Foliis lanceolatis, caule erecto. (Foliis integerrimis et ſeſſilibus, caule tomentoſo, capitulis ſquamatis, flore magno.) (G.) Flor. dan. t. 754.

Habitat in aquis ſtagnantibus inſulae apothecariae, tum inter urbem Pawlowſkoy, et Slavjankam et circa Murzinkam in locis limoſis. Floret Julio. 2 Жабникъ язычный. Russ. Sobol.

366. RANUNCULUS FICARIA. Foliis cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro, floribus octopetalis, calyce triphyllo. (Petala octo, aut novem flava, ſubtus ſtriata, nectario ſquamula ſubtrifida. Stamina octodecim ad triginta ſex. Sub ole-

racea.) (G.) Flor. dan. t. 499. Chelidonium minus, officin.

In locis uliginoſis umbroſis paſſim. Floret Majo, Junio. 24 Чистякъ меньшій. Russ. Жабникъ чистотѣльный. Sobol.

367. RANUNCULUS CASSUBICUS. Foliis radicalibus ſubrotundocordatis crenatis, caulinis digitatis dentatis, caule multifloro. (B.)

Habitat in ſylvis umbroſis circa Petropolim, et alibi. Floret Junio. 24 Жабникъ кассубскій. Russ. Sobol.

368. RANUNCULUS AURICOMUS. Foliis radicalibus reniformibus crenatis inciſis, caulinis digitatis linearibus, caule multifloro. (Folium radicale cordatum, caulina ſubverticillata, caule debili plerumque decumbente, flores exigui flaui, vernalis apetali, adultioris petalis tribus aut quinque.) (G.) Flor. dan. t. 665.

Habitat in nemoribus et pratis paſſim. Floret Majo, Junio. 24 Жабникъ златовласый. Russ. Sobol.

369. RANUNCULUS SCELERATUS. Foliis inferioribus palmatis, ſummis digitatas, fructibus oblongis. (Foliis trilobis, lobis lateralibus trifidis, ſequentis crenatis, ſuperioribus integris, calyce glabro, reflexo, flaveſcente, petalis ex luteo-palleſcentibus. Stamina duodecim, fructu abortiente. Variat: foliis apioideis, lanuginoſis, inciſuris pluribus, floribus nitore pingui et fructibus in capitulum congeſtis ſurſum ſpectantibus.) (G.) Flor. dan. t. 570.

In foſſis ſuburbiis et locis uliginoſis nihil vulgatius. Floret Majo, Iunio. ☉ Жабникъ вредный. Russ. Sob.

370. RANUNCULUS BULBOSUS. Foliis compoſitis, caule erecto multifloro, pedunculis ſulcatis, calycibus retroflexis. (Radice ſimplici globosa napiformi, squamulis nectarii trigonis. Stamina ſexaginta.) (B.) Flor. dan. t. 551.

Habitat in pratis et locis gramineis circa Iamburgum. Floret Majo, Iunio. ♃ Жабникъ узлокоренный. Russ. Sobol.

371. RANUNCULUS REPENS. Foliis compoſitis, ſtolonibus repentibus, pedunculis ſulcatis, calycibus patulis. (Radix faſciculata, caule ſubdepreſſo, foliis maculatis trilobis glabris linea longitudinali cava, petiolis violaceis, calyce patulo glabro.) (Sob.) Flor. dan. t. 795.

Creſcit ad canales et foſſas, in hortisque oleraceis nimis frequens, unde eliminari vix poteſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Жабникъ стелистый. Russ. Sobol.

372. RANUNCULUS POLYANTHEMOS. Foliis multipartitis, caule erecto, pedunculis ſulcatis, calycibus patulis. (Foliorum laciniae anguſtae, apice calloſae.) (R.) Lobel. ic. 666.

Habitat in pratis elevatis circa petropolim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Жабникъ многоцвѣтный. Russ. Sobol.

373. RANUNCULUS ACRIS. Foliis tripartito-multifidis, ſummis linearibus, pedunculis teretibus, calycibus patulis. (Folia macula ab inſertio-

ne petioli per venas interdum diſperſa, ſubtus ſubincana, glabra, pedunculis erectis ramoſo-corymboſis, calycibus patulis, petalis flavis nitidis. Stamina quadraginta octo ad quinquaginta ſex. In locis pingvioribus foliis admodum latis et magis hirſutis occurrit.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 20. Ranunculus acris officin.

Habitat in pratis et ſylvis inſularum Nevae fluvii, et vbique vulgaris planta eſt. Floret Majo, Iunio. ♃ Жабникъ остросочный. Russ. Sobol.

374. RANUNCULUS ARVENSIS. Foliis ſuperioribus decompoſitis linearibus, ſeminibus aculeatis. (Flores minimi. Stamina quatuordecim) (B.) Flor. dan. t. 219.

Habitat in arvis humidis et ad ſegetes circa Jamburgum. Floret Majo, Iunio. ☉ Жабникъ полевый. Russ. Sobol.

375. RANUNCULUS AQUATILIS. Foliis ſubmerſis capillaceis, emerſis peltatis. (Foliis multifidis, laciniis divergentibus, foliolis calycinis reflexis coloratis, flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 376.

Habitat in paludibus et aquis ſtagnantibus inſularum Apothecariae, et lapideae; nec non ad habitacula aeſtiva aegrotantium nosocomii pedestris, atque in ramis minoribus Nevae fluvii circa inſulas. Floret Iunio. ♃ Жабникъ водяный. Russ. Sobol.

TROLLIUS. Calyx nullus. Petala quatuordecim. Nectaria novem, linearia, baſi perforata. Styli nulli. Stigmata mucronata. Capſulae plurimae filiquoſae, ovatae, tetraſpermae, introrſum dehiſcentes.

376. TROLLIUS EVROPAEUS. Corollis conniventibus, nectariis longitudine ſtaminum. (Foliis radicalibus quinquefidis, ſegmentis lobatis, lobis acutis, petiolatis, petiolis albis; flore maturo aureo, odorato, immaturo viridi, ſtriis rubris, petalis duplici ordine poſitis, ſupra ſtamina recurvatis octo, aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 133.

Habitat paſſim in ſylvis et pratis, in magna copia praecipue ad viam Sarſcoſelienſem et montem Pulcovum atque fabricam pyriam Ochtenſem. Floret Majo, Iunio. ♃ Желтоголовъ Европейскій. Russ. Sobol.

CALTHA. Calyx nullus. Petala quinque. Germina quinque ad decem. Styli nulli. Capſulae plures polyſpermae, leguminoſae, ſtellatim patentes.

377. CALTHA PALUSTRIS. (Dichotoma pedunculis ſulcatis petalis flavis, ſtamina ultra centum).)G.) Flor. dan. t 668.

In pratis a fluvio Neva inundatis et paſſim in paludibus, et locis uliginoſis. Floret Majo, Iunio, Iulio. ♃. Курослѣпъ болотный. Russ. Sobol.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA

GYMNOSPERMIA.

AJUGA. Corollae labium ſuperius minimum. Stamina labio ſuperiori longiora.

378. AJUGA PYRAMIDALIS. Tetragono-pyramidalis villoſa, foliis oblongis dentatis, radicalibus maximis, (decuſſatis, inferne purpureis, plerumque tridentatohaſtatis, corolla caerulea, calyce concolore. Labium corollae inferius orchioides.) (Sob.) Flor. dan. t. 185. Conſolida media, s. Bugula officin.

Creſcit inter gramina horti imperialis aeſtivi, ſpontanea. Floret Iunio, Iulio. 2 Дубровка пирамидальная. Russ. Sobol.

MENTHA. Corolla ſubaequalis, quadrifida, lacinia latiore emarginata. Stamina erecta diſtantia.

379. MENTHA SYLVESTRIS. Spicis oblongis, foliis oblongis ſerratis tomentoſis ſeſſilibus, ſtaminibus corolla longioribus. (Folia admodum venoſa rugoſa. Calyx coloratus. Corolla ex albo caerulea. Var. β Molliſſima.) (Sob.) Flor. dan. t. 484. Mentha ſylveſtris, officin.

Habitat in hortis oleraceis circa Petropolim in Jemskaja, et in vico Strelina, ſpontanea. Floret Iunio. 2 Мята лѣсная. Russ. Sobol.

380. MENTHA AQUATICA. Floribus capitatis, foliis ovatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. (Stolonibus reptantibus, caulibus coloratis, foliis ſaepe maculatis, corolla ex albo coerulea purpurea. Varietas β ramoſiſſima, caule villoſo ramoſo: ramis patentibus, foliis ſubcordatis.) (G.) Flor. dan. t. 673. Mentha aquatica, officin.

Creſcit in marginibus ſylvarum aquoſis, Catharinhoffii et paſſim. Floret Iulio. 2 Мята водяная. Russ. Sobol.

381. MENTHA GENTILIS. Floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, ſtaminibus corolla brevioribus. (Caule ramoſo, erecto, folio pallidiore, odore Meliſſae calaminthae. Variat, caule rubeſcente glabro.) (Sob.) Flor. dan. t. 736.

Habitat in urbe Petropoli ad foſſas et ſaepes hortorum et in Strelina alibique ſpontanea. Floret Auguſto. 24 Мята простая. Russ. Sobol.

382. MENTHA ARVENSIS. Floribus verticillatis, foliis ovatis acutis ferratis, ſtaminibus corollam aequantibus, (interdum et longioribus, verticillis tomentoſis, calycibus hiſpidis, caneſcentibus, ſquamis hirſutis lanceolatis ſubjectis, corolla ex albo profunde caerulea quadrifida, interdum quinquefida. Caules villoſi non multum diffuſi, adſcendentes.) (G.) Flor. dan. t. 512.

Habitat in pratis paſſim et circa ſegetes et hortos oleraceos. Floret Julio. 24 Мята полевая. Russ. Sob.

GLECOMA. Calyx quinquefidus. Antherarum ſingula paria in forma crucis conniventia. (Calyce quindecim ſtriato, labio ſuperiore obtuſo ſemibifido. Germinibus corolla villoſa tectis.)

383. GLECOMA HEDERACEA. Foliis reniformibus crenatis, caulibus procumbentibus, radicantibus, floribus ſubverticillatis, involucro diphyllo. (Floribus coarctatis, labio ſuperiore pone ſubcornuto. Varietas β ſepium, caule elongato ſubſcandente, foliis reniformibus glabris. γ. minor, antheris obliteratis.) (G.) Flor. dan. t. 789. Hedera terreſtris, officin.

Habitat ad ſegetes Craſnoſelii et paſſim ad ſepes hortorum in hortisque. Floret Majo, Iunio. ♃ Будра Russ. Будра ползучая. Sobol.

LAMIUM. Corollae labium ſuperius integrum, fornicatum, labium inferius obcordatum, faux utrinque dente ſetaceo reflexo.

384. LAMIUM ALBUM. Foliis cordatis acuminatis ſerratis petiolatis, verticillis viginti-floris. (Caules ramoſi, folia hirſuta venis ſuperne atris, floribus magnis albis rubrisve verticillatis in geniculis; calyx laciniis reflexis ariſtatis; faux dente unico; antherae baſi piloſae. Variat flore purpureo labio ſuperiore bifido.) (Sob.) Flor. dan. t. 594. Urtica mortua, ſeu Galeopſis, officin.

Creſcit ubique in locis cultis et ad ſepes hortorum. Floret Iunio, Iulio. ♃ Глухая крапива. Russ. Пчелнососка бѣлая. Sobol.

385. LAMIUM PURPUREUM. Foliis cordatis obtuſis petiolatis. (Spica floralis pyramidalis; bracteae venoſae herbido-flavae; flos exiguus albus purpureus ve hirſutus, fauce utrinque bidentatus. Omnia praecedente minora.) (G.) Flor. dan. t. 523.

Habitat inter ſegetes et in hortis paſſim. Floret Majo, Iunio. ☉ Курячья слѣпота, ſive Волшебная крапива. Russ. Пчелнососка лиловая. Sobol.

386. LAMIUM AMPLEXICAULE. Caulibus inermibus, corollae labio inferiore bifido, foliis caulinis ſeſſilibus rotundatis inciſis; radicalibus pe-

tiolatis cordato-lobatis. (Sob.) Flor. dan. t. 752. Nunc Pollichia amplexicaulis.

In hortis oleraceis et locis cultis frequens eſt, cum Lamio purpureo. Floret Iunio, Iulio. ☉ Пчелнососка круглолистая. Russ. Sobol.

GALEOPSIS. Corollae labium ſuperius ſubcrenatum, inferius trifidum; faux utrinque dente obtuſiuſculo concavo acuta. (Calyx longe ariſtatus.)

387. GALEOPSIS LADANUM. Verticillis omnibus remotis, calycibus campanulatis pubeſcentibus: dentibus lineari ſetaceis divergentibus longioribus, (caule internodiis aequalibus, foliis lanceolato-ovatis ſerratis hirſutis. Calyx dentibus tribus inferioribus majoribus ariſtatis; faux amplisſima, galea purpurea, alba, flavicans, maculata, denticulis ad faucem maximis.) (G.)

Habitat iu locis cultis, et ad margines ſylvarum uti in monte Poclonnaja, Oſinova Roſcha, et ad ſegetes paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Курятникъ. Russ. Курятникъ вонючій. Sobol.

388. GALEOPSIS TETRAHIT. Verticillis ſummis ſubcontiguis, calycibus ventricoſis, dentibus longiſſimis ſetaceis aequalibus pungentibus; (internodiis magnis coloratis; foliis cordatis ſerrato-ciliatis, petiolis ſquamis ariſtatis ſuffultis. Calyx pilis globulo glanduloſo terminatis; corolla calyce duplo-quadruplo majore, purpurea, alba, flavicans, maculata, denticulis ad faucem maximis. (G.) Rivin. monop. t. 44.

Habitat circa papos et ſegetes frequens. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Пѣтушьи головки. Russ. ſive Курятникъ конопляный. Sobol.

389. GALEOPSIS GALEOBDOLON. Calycibus pungentibus, corollae labio inferiore trifido, foliis omnibus cordatis dentatis petiolatis. (Verticilli dimidiati ſubſexflori, (involucum tetraphyllum,) floribus flavis, labii inferioris lobo medio purpura picto, ſtaminibus in ſtylum quaſi concretis.) (G.) Knorr del. hort. 1. t. N. 9. n. s.

Habitat in nemoribus montoſis, circa Kojrovam et in monte Poclonnaja atque Pargelovii. Floret Iunio, Iulio. 24 Курятникъ колючій. R. Sobol.

BETONICA. Calyx ariſtatus. Corollae labium ſuperius erectum planum; tubus cylindricus, incurvus. Stamina longitudine faucis, (deflorata exſerta.)

380. BETONICA OFFICINALIS. Spica interrupta, corollae galea integra, labii laciniа intermedia emarginata, calycibus glabriuſculis. (Verticilli quatuordecim-flori calycibus bracteisque ſpinuloſis, corollis purpureis horizontaliter patentibus tubo longiſſimo, ſtaminibus villoſis. Folia cordato-oblonga ſerrato-rugoſa, atro-virentia, ſpica foliis reflexis interrupta. Variat ſaepius: galea bifida et flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 726. Betonica, officin.

In ſylvis montoſis ad fluvium Wolchow et Lugam vulgaris planta eſt. Floret Iunio. 24 Буквица черная. Ross.

STACHYS. Corollae labium superius fornicatum; inferius lateribus reflexum, laciniа intermedia majore emarginata. Stamina deflorata verſus latera reflexa.

391. STACHYS SYLVATICA. Verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis, (acuminatis, late ſerratis. Calyx coloratus incurvus, dente maximo, corolla purpurea, labio inferiore lineis albis; filamenta medio villoſa. Odorata.) (G.) Flor. dan. t. 1101.

Habitat in nemoribus humidis umbroſis, uti in monte Pulcovo, et Duderovo, et circa urbem Gatczinam. Floret Iunio, Iulio. ☉ Змѣина трава. R. Колосница лѣсная. Sobol.

392. STACHYS PALUSTRIS. Verticillis ſubſexfloris, foliis linearilanceolatis, ſemiamplexicaulibus, ſeſſilibus. (Calyces ſeſſiles, bracteis duabus coloratis, floribus albis, purpureſcentibusve.) (G.) Flor. dan. t. 1102.

Ad ripas, Nevae fluvii locis humidis, et foſſas atque inter ſegetes paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Колосница болотная. Russ. Sobol.

393. STACHYS ANNUA. Verticillis ſexfloris, foliis ovato-lanceolatis trinervibus laevibus petiolatis, caule erecto. (Folia varia, ſpinulis quaſi ciliata, verticillis quinquefloris aut novem floris, calycis dentibus patentireflexis ariſtatis fere ſpinoſis; flos ochroleucus fauce maxima, maculis purpureis. Lamii odor.) (R. Sob.) Jacq. Flor. auſt. 4. t. 360.

Habitat in aſperis, ſiccis montanis circa Craſnoſelium et in arvis circa montem Duderovum. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Колосница лѣтняя. Russ. Sob.

394. STACHYS ARVENSIS. Verticillis ſexfloris, foliis obtuſis nudiuſculis, corollis longitudine ca-

lycis, caule debili, corollae labio ſuperiore integerrimo. (R. Sob.) Flor. dan. t. 587.

Habitat in arvis Oſinovae Roſchczae, et circa Ligovam, ſed parce. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Колосница полевая. Russ. Sobol.

LEONURUS. (Corollae labium ſuperius concavum integrum, labium inferius trifidum.) Antherae punctis nitidis adſperſae. (Calyce pentagono, dentibus inferioribus longioribus; germinibus tectis corona villorum e corollae tubo naſcentium.)

395. LEONURUS CARDIACA. Foliis caulinis lanceolatis trilobis. (Caules erecti ramoſiſſimi tetragoni, folia verticillis unifloris ſubjecta dependetia, calyces paleis ſuffulti ſpinoſis, flores ochroleuci. Stamina deflorata ad latera.) (G.) Flor. dan. t. 727. Cardiaca, officin.

In monte pulcovo, et Duderovo; ad ductum aquarum Ladogenſium, atque Petropoli in rudetatis et hortis paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Сердечная трава. ſive Львинохвостъ сердечный. Russ. Sobol.

PHLOMIS. Calyx angulatus. Corollae labium ſuſuperius incumbens, compreſſum, villoſum, (bifidum, inferius lacinia intermedia biloba, antheris puris.)

396. PHLOMIS TUBEROSA. Floribus involucratis involucris hiſpidis ſubulatis, foliis cordatis ſcabiis, caule herbaceo. (Foliis caulinis lanceolatis, binis oppoſitis, ſubjectis verticillis; calyci-

bus hiſpidis, floribus ochroleuco-purpureis. (G.) Gaertn. de fr. et ſem. cent. 5. t. 66. f. 9.

Habitat in pratis ſiccis arenoſis circa Petropolim rarius. Floret Iulio, Auguſto. 2 Запья трава. ſive посошокъ. Russ. Посошокъ узловатый. Sobol.

CLINOPODIUM. Stamina curvata, antheris conniventibus. (Involucrum multiſetum, verticillo ſubjectum. Labium ſuperius erectum concavum, inferius triſidum, utrumque emarginatum.

397. CLINOPODIUM VULGARE. Capitulis ſubrotundis, bracteis ſetaceis, (caule procumbente, foliis ovatis acutis, raris: capituli ſubrotundi denſiſſimi diffiti, floribus dilute purpureis, fauce et calyce admodum piloſo.) (Sob. B.) Sabb. h. rom. 3. t. 65.

Habitat in montoſis ſylvaticis, Pargelovii, Oſinova Roſchcza, circa Sarſcoſelium et Gatczinam, atque in monte Duderovo. Floret Iunio, Iulio. 2 Постельница обыкновенная. Russ. Sobol.

ORIGANUM. Strobilus tetragonus, ſpicatus, calyces colligens. (Involucrum ſpicatum, bracteis imbricatis, ovatis coloratis. Periathium inaequale, varium, bilabiatum diphyllum, quinquedentatum.)

398. ORIGANUM VULGARE. Spicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. Variat: ſpicis foliоſis breviſſimis umbellatis, et ſpicis decoloribus umbellatis, corollis albis. Utraque foliis ovato-acuminatis petiolatis integris acuminatis, calyce fauce piloſa,

bracteis purpuraſcentibus, ſtaminibus qnatuor, antherae octo.) (G.) Flor. dan. t. 638. Origanum vulgare offic.

Habitat in ripis editis Nevae fluvii, et ad margines ſylvarum, Pargelovii, montis duderovii, Gatczinae, ad pagum Colodeci et ad fluvium Lugam. Floret Iunio, Iulio. ♃ Душица, ſive материика. Russ. Душица пуостая. Sobol.

THYMUS. Faux villis clauſa. (Calyx labio ſuperiore tridentato, inferiore biſeto, incurvo-gibbus.)

399. THYMUS SERPYLLUM. Floribus capitatis, caulibus repentibus, foliis planis obtuſis baſi ciliatis, (utrinque punctis impreſſis, calyce lineis coloratis, labium inferius purpura maculatum. Varietates: majus, minus.) (G.) Zorn pl. med. ic. t. 17. Serpyllum, officin.

In locis arenoſis apricis Pargelovii, et ſuperiori regione Nevae fluvii tanta in copia creſcit, ut ripae ejus editiores et praeruptae pene ex toto hac planta veſtiantur. Floret Iulio. ♃ Богородская трава. Russ. Тимiянъ ползучiй. Sobol.

400. THYMUS ACINOS. Floribus verticillatis, pedunculis unifloris, caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis. (Caules decumbenti-erecti, foliis ſubhorizontalibus, verticillis dimidiatis, paleis et folio ſingulo ſuffultis; ex ſtrumoſus ſtriis undecim, corolla caerulea tubo longiſſimo.) (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 318.

Habitat in montoſis et locis editioribus arenoſis Pargelovii, in monte Pulcovo, et circa Strelinam, ad pagum Colodeci, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Тимiянъ остролистый. Russ. Sobol.

SCUTELLARIA. Calyx ore ſub integro, poſt floreſcentiam clauſo, operculato. (Labium ſuperius concavum trifidum, lacinula media concava; inferius emarginatum. Calyx galeam criſta et operculo repreſentat.)

401. SCUTELLARIA GALERICULATA. Foliis cordato-lanceolatis crenatis, floribus axillaribus, (caulibus geniculatis, purpureis, floribus gemellis, caeruleis ſubſeſſilibus, fauce villoſa: labium ſuperius ſegmentis criſpato-reflexis, inferius aggeribus albis, antherae fiſſura barbata.) (G.) Fl. dan. t. 637. Variat: floribus albis.

In ſylvis humidis declivibus et foſſis ſtagnorumque ripis nec non circa paludes paſſim. Floret Iulio. ♃ Щитовка шлемовная. Russ. Sobol.

PRUNELLA. Filamenta bifurca, altero apice antherifera. Stigma bifidum. (Stylo ſpiraliter convoluto. Calyx auricularis.)

402. PRUNELLA VULGARIS. Foliis omnibus ovato-oblongis ſerratis petiolatis, calycibus labio ſuperiore truncato ſubtridentato, (bracteis cordatis.) Blaczw. herb. t. 24. Prunella, s. Brunella, officin. Variat, flore albo.

In pratis ſiccis apricis, inſulae apothecariae aliarumque, et paſſim vulgaris planta eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Черноголовь простый. Russ. Sobol.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS. Calyx quadrifidus inflatus. Capſula bilocularis, obtuſa, compreſſa. Semina pauca. Antherae bifidae hirſutae. Corolla perſonata.

403. RHINANTHUS CRISTAGALLI. Corollis labio ſuperiori compreſſo, breviori, calycibus glabris. (Foliis inter flores latioribus, admodum variantibus, latioribus, anguſtioribus, prout ramoſa vel non, caule ſerpentario in geniculis ſtriis nigris; galea ochroleuca, ſegmentis caeruleis; piſtillo barba flava, glandula nectarifera ad baſin germinis.) (G.) Bulliard herb. Franc. t. 125. Varietas, β minor anguſtifolius, flore ſaturate luteo. (Sob.)

In pratis frequens. Var. β occurrit circa Ligovam et Strelinam, atque in monte Poclonnaja. Floret Iunio. ☉ Пѣтушій гребень, ſive копѣчникъ. Russ. Копѣчникъ гребенчатый. Sobol.

EUPHRASIA. Calyx quadrifidus, cylidricus. Antherae inferiores altero lobo baſi ſpinoſae. Capſula bilocularis, ovato-oblonga. Semina pauca deorſum incumbentia. (Corolla perſonata.)

404. EUPHRASIA OFFICINALIS. Foliis ovatis lineatis, argute dentatis. (Foliis oppoſitis, floribus axillaribus minimis albis, ſecundis; ſtaminibus incluſis, lacinia intermedia macula flava.) (G.) Flor. dan. t. 1037. Euphraſia, offic.

Creſcit ubique in pratis ſiccis copioſiſſime, uti in inſulis apothecaria, lapidea, baſileenſi, et paſſim. In humidioribus et ſylvoſis, caule ramoſiore foliis ſerratis majoribus nitidis occurrit. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Очная помощь. Russ. Глазница аптекарская. Sob.

405. EUPHRASIA ODONTITES. Foliis linearibus: omnibus ſerratis. (Caules atropurpurei; fo-

lia triſte viridia, floralia ſerrata; flores ſpicati pallide rubentes, calyx laciniis coloratis; labio ſuperiori hirſuto, inferiori trilobo, lobo medio minimo, omnibus erectis ciliatis. Euphraſiis caeteris non ſimilis.) (G.) Flor. dan. t. 655.

Habitat in pratis arenoſis ſiccis, et paſcuis circa fabricam pyriam Ochtenſem, Ligovam, Craſnoſelium et paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ☉ Глазница зубная. Russ. Sob.

MELAMPYRUM. Calyx quadrifidus. Corollae labium ſuperius compreſſum, margine replicato. Capſula bi-ocularis compreſſa, obliqua, hinc dehiſcens. Semina ſolitaria gibba duo. (Corolla perſonata vel ringens.)

406. MELAMPYRUM NEMOROSUM. Floribus ſecundis lateralibus: bracteis dentatis, ſummis coloratis ſterilibus, calycibus lanatis. (Foliis ovatis, interdum ſagittatis, ciliato-aſperis; bracteae caeruleo-violaceae inferne lanatae, flore axillari uno, luteſcente.) (G.) Flor. dan. t. 305.

In pratis et nemoribus praeſertim inſulae apothecariae, lapideae et Catharinhofii et paſſim in betuletis. Floret Iunio, Iulio, et Auguſto. ☉ Иванъ да марья. Russ. Огнецвѣтникъ дубровный. Sobol.

407. MELAMPYRUM PRATENSE. Floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis clauſis; (foliis lanceolatis horizontalibus. Flores in pedunculis binatis lutei, calyce maculis purpureis, galea margine non reflexo. Os clauſum variat.) (G.) Gaertn. de fr. et ſem. cent. 4. t. 53. f. 1.

Creſcit in inſulis apothecaria et lapidea et paſſim in pratis ſylvoſis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Огнецвѣтникъ луговый. Russ. Sobol.

408. MELAMPYRUM SYLVATICUM. Floribus ſecundis lateralibus, foliorum conjugationibus remotis, corollis hiantibus. (Flores minores, toti flavi. (F.) Flor. dan. t. 145.

Habitat in ſylvis et nemoribus amoeniſſimis circa Sarſkoje ſelo, et Gatczinam, in monte Duderovo, et ad Fabricam pyriam Ochtenſem. Floret Iulio. ☉ Огнецвѣтникъ лѣсный. Russ. Sobol.

LATHRAEA. Calyx quadripartitus aut quinquepartitus. Glandula depreſſa ad angulum alterum germinis. Capſula unilocularis: receptaculis fungoſis lateralibus, ſeu calyce patente veſtita. (Corolla perſonata.)

409. LATHRAEA SQUAMARIA. Caule ſimpliciſſimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido. (Squamae florales caulinis fere majores, ex albido coloratae, villoſae uniflorae, caeruleo-purpuraſcentes, nutantes. Calyce quinquefido coralloideo, colorato, labio inferiore trifido, apice ſphacelato. Antherae piloſae.) (G.) Flor. dan. t. 136.

Habitat in monte Pulcovo, et Duderovo ſatis frequens, atque in Oſinova Roſchcza; amat ſyſvas umbroſiſſimas, ſemper humidas et partem montis ſeptentrionalem, inter ſurculos arborum putreſentes et folia. Floret Majo, Iunio. ♃ петровъ крестъ. Russ.

PEDICULARIS. Calyx quinquefidus. Corolla perſonata, labio ſuperiore compreſſo. Capſula bilo-

cularis, mucronata, obliqua. Semina pauca tunicata, hilo receptaculo affixa. (Variat calycis ore bifido.)

410. PEDICULARIS PALUSTRIS. Caule ramoſo, calycibus criſtatis calloſo-punctatis, corollis labio obliquis. (Calycibus biſidis aut quadrifidis ſaepius, corollae ex albo-rubentis labium ſuperius utrinque denticulis; folia pinnato-ſerrata.) (G.) Flor. dan. t. 225.

Creſcit ubivis in paluſtribus. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Вшивая трава. Russ. Вшивица болотная. Sobol.

411. PEDICULARIS SCEPTRUM COROLINUM. Caule ſimplici, floribus terno-verticillatis, corollis clauſis, calycibus criſtatis, capſulis regularibus. (Caulis bipedalis ſpecioſiſſimus. Corollae clauſae luteae ore ſanguineo. Variat, caule ramoſo floribus ſparſis; foliis inferioribus ternis, ſuperioribus binis. In varietate rami caulis nonnunquam faſtigium attingunt.) (G.) Flor. dan. t. 26.

Naſcitur in ſylvis humidis ſuperiorum regionum Newae fluvii perquam copioſe, tum circa pagum Murino, et inter Sarſcoje ſelo et urbem Gatczinam. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Скипетръ каролинскій. Russ. Sob.

ANTIRRHINUM. Calyx quinquepartitus. Corolla baſi gibba aut calcarata. Capſula bilocularis polyſperma, apice in lacinulas reflexas dehiſcens. (Corollae labium ſuperius biſidum, inferius trifidum, palato ſaepiſſime prominente.)

412. ANTIRRHINUM CYMBALARIA. Foliis cordatis quinquelobis, caulibus procumbentibus, (pedunculis axillaribus ſolitariis, floribus violaceis. Variat: floribus albis. (St.) Curtis Flor. Londin. t. 55.

Habitat in muro arcis Petropolitanae. Floret Iunio, Iulio. ☉ Жабрей. R. Львиноустъ стелистый. Russ. Sobol.

413. ANTIRRHINUM MINUS. Foliis plurimis alternis lanceolatis obtuſis, caule ramoſiſſimo diffuſo, (plus minusve diffuſo; foliis dorſo purpuraſcentibus, ſobcarnoſis, inferioribus oppoſitis, ſaepius reflexis; floribus axillaribus exiguis, violaceo rubroque albidis, calcare brevi.) (Sob. R.) Flor. dan. t. 502.

Habitat in glareoſis, et cultis, uti inter ſegetes Craſnoſelii, et Ligovi, atque Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Львиноустъ меньшій. Russ. Sobol.

414. ANTIRRHINUM LINARIA. Foliis lanceolato-linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis, (calyce ochroleuco luteoque variis, calcare longo.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. L. 6. *a*. Eadem monſtroſa, floribus ſummis naturalibus, inferioribus degeneribus. Peloria. Linaria, officinarum.

Habitat in arvis ſiccis et ruderatis, ad vias et inter ſegetes, uti Pargelovii, Ligovi, Catharinhoſii, et in hortis cultis Petropoli. Floret Iunio, Iulio. Auguſto. ♃ Дикой ленъ. Russ. Львиноустъ льняный. Sobol.

SCROPHULARIA. Calyx quinquefidus. Corolla quinpuepartita, tubo globoſo, lacinia infima rereflexa. Capſula bilocularis: diſſepimento duplicato. (Labium inferius intus ſquamula acceſſoria acuta, labium ſuperius lacinia intermedia ad tubum reflexa. Corolla reſupinata.)

415. SCROPHULARIA NODOSA. Foliis cordatis trinervatis, caule obtuſengulo. (Foliis obſolete cordatis, vix trinervatis, ſerratis, petiolatis, erecto-patentibus, caule nudo, pedunculis ſubalatis in panicula terminali; bracteis exiguis laciniatis; corolla ſordide purpurea, labio inferiori rotundato, deflexo, capſula inflexa, ut duplex videretur.) (G.) Blackw. herb. t. 87. Scrophularia, officin.

In ſylvis humidis aquoſis Catharinhoffi et inſularum apothecariae, lapideae, et ad rudera domorum atque in hortis oleraceis ſaepius occurrit. Floret Iunio, Iulio. ♃ Норычникъ. ſive Собачья голова. Russ. Норыч-никъ узлокоренный. Sobol.

LINNAEA. Calyx duplex: fructus tetraphyllus; floris quinquepartitus ſuperus. Corolla campanulata. Bacca ſicca trilocularis.

416. LINNAEA BOREALIS. (Calyx fructus tetraphyllus: foliolis duobus minoribus, magis acutis, rubellis. Caule repente foliis oppoſitis ovatis, pedunculis erectis apice nudis biſloris, floribus ſubrubentibus.) (G.) Flor. dan. t. 3.

Habitat in ſylvis umbroſis et muſcoſis, uti Peterhoffi, Strelinae, et Petropoli in inſula Baſileenſi frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♄ Линнея сѣверная. Russ. Sobol.

LIMOSELLA. Calyx quinquefidus. Corolla quinquefida aequalis. Stamina per paria approximata. Germen bilioculare. Capſula ſubunilocularis, bivalvis, polyſperma.

417. LIMOSELLA AQUATICA. Foliis lanceolatis, (longe petiolatis, parum carnoſis; ſcapi in fine flore uno muſcoſo. Calyce maculis purpureis, ſaepiſſimae bifido, corolla laciniis albis purpuraſcentibus; filamenta longitudine potius aequalia, antherae ſubrotundae nigrae, villo cum ſtigmate globoſo conjuctae, dein per paria ſe removent.) (G.) Flor. dan. t. 69.

Ad ripas fluvii Siſtae et in locis vere inundatis circa Ligovo et Goreloy cabac magna copia crescit. Floret Iulio, Auguſto. ☉ et ♃ Грязница водяная. Rnss. Sobol.

OROBANCHE. Calyx ſubbifidus. Corolla ringens. Glandula ſub baſi germinis. Capſula unilocnlaris, bivalvis, polyſperma. (Calyx interdum quinquefidus, variat. Stigma obcordatum, tuberculo flavo.)

418. OROBANCHE MAJOR. Caule ſimpliciſſimo pubeſcente, ſtaminibus ſubexſertis. (Squamis caulinis laxis piloſis emarcidis, ſpica denſa floribus ex albo flaveſcentibus, ferrugineis, atropurpureisve, polline albo conſperſis, calyce trifido lacinia media longiore.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 232. Orobanche, officin.

Habitat in montoſis, et pratis ſiccis editioribus, uti circa Craſnojé ſelo, montem Duderovium, urbem Gatczinam et pagum Colodetzi. Floret

Iunio, Iulio. Parasitica. Заразиха, sive Львиный хвостъ. Russ. Заразиха солнечная. Sobol.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA

I. SILICULOSA.

MYAGRUM. Silicula stylo rigido conico terminata, bibalvis; loculis quibusdam saepe vacuis.

419. MYAGRUM SATIVUM. Siliculis obovatis pedunculatis polyspermis, (Foliis scabris sagittatis leviter dentatis, flore luteo exiguo, silicula obcordata tumente.) (R. B. Sob.) Lindern flor. als. t. s.

Habitat inter segetes ad viam Sarscoseliensem et in regione Wiburgensi. Floret Iunio. ☉ Рѣзъ sive рѣзуха. Russ. Рѣзуха сѣяльная. Sobol.

420. MYAGRUM PANICULATUM. Siliculis lentiformibus orbiculatis punctato-rugosis. (Foliis sagittatis. Floribus luteis. Semine rotundo unico.) (G.) Flor. dan. t. 204.

Ad ductum aquarum ladogensium, tum in agris et arvis circa Ligovam, et insulis apothecaria, et lapidea ad saepes frequens est. Рѣзуха вѣточная. Russ. Sobol.

SUBULARIA. Silicula integra, ovata: valvis ovatis, concavis, dissepimento contrariis. Stylus silicula brevior.

421. SUBULARIA AQUATICA. Foliis teretiusculis. (Caules tenuiſſimi nudi, foliis radicalibus pene breviores, ſaepiſſime ramoſi.) (G.) Flor. dan. t. 53.

In ripis humidis et uliginoſis Nevae fluvii paſſim copioſeque provenit, et circa Ligovam in foſſis et aquoſis, aliisque in locis ſimilibus frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Шильница водяная. Russ. Sobol.

DRABA. Silicula integra, ovali-oblonga, valvis planiuſculis (membranaceis) diſſepimento parallelis. Stylus nullus.

422. DRABA VERNA. Scapis nudis, foliis ſubſerratis, hirſutis. (Petalis bifidis.) (G.) Flor. dan. t. 983.

Habitat circa noſocomium maritimum, et paſſim in locis ſabuloſis ſterilibus. Floret Aprili, Majo. ⊙ Быльникъ весенный. Russ. Sobol.

LEPIDIUM. Silicula, cordata, emarginata, compreſſa, polyſperma; valvis acute carinatis; diſſepimento lanceolato, contrario.

423. LEPIDIUM RUDERALE. Floribus diandris, apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis, ramiferis linearibus integerrimis. (Silicula emarginata; floribus vix conſpicuis flavis, paſſim et tetrandris.) (G.) Flor. dan. t. 184.

Ad vias plateasque et ruderata ubique creſcit copioſiſſime. Floret Majo, Iunio. ⊙ Дикой кресъ. Russ.

THLASPI. Silicula emarginata, obcordata, polyſperma, valvis navicularibus, marginato-carinatis, alato- marginatis.

424. THLASPI ARVENSE. Siliculis orbiculatis, foliis oblongis, dentatis, glabris. (Silicula latiſſima.) (G.) Flor. dan. t. 793.

Habitat in arvis et in hortis cultis paſſim. Floret Majo, Iunio. ⊙ Ярутка! ſive Комелекъ. Russ. Ярутка полевая. Sobol.

425. THLASPI BURSA PASTORIS. Siliculis obcordatis, triangulis, compreſſis, valvis dorſo nudis obtuſis, foliis radicalibus pinnatifidis. Varietas *a.* foliis omnibus pinnatifidis. /3 Foliis radicalibus longe petiolatis ovatis integerrimis, caule aphyllo. *γ.* Foliis longe petiolatis integerrimis caule folioſo. (G.) Flor. dan. t. 729. Burſa paſtoris, officin.

In hortis oleraceis et circa domos et ſepes vulgatiſſima planta eſt. Floret, a menſe Aprili ad Septembrem. ⊙ Пастушья сумка. Russ.

ALYSSUM. Filamenta quaedam introrſum dente notata. Corolla aequalis. Silicula ſubgloboſa leviter emarginata, compreſſula, ſtylo coronata.

426. ALYSSUM INCANUM. Caule erecto, foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymboſis, petalis bifidis, (albis), ſiliculis ovatis. Nunc Moenchia. (G.)

Habitat circa urbem Gatczinam, et in monte Pulcovo, circa Sarſcoje ſelo, ad margines agrorum, in ſiccis arenoſis, et Petropoli in horto Nobilium Cadetorum terreſtrium ſpontaneo. Floret Iunio,

Iulio. ♃ et ♂ Торица. ſive икотная трава. Russ. икотка сѣдая. Sobol.

LUNARIA. Silicula integra elliptica, compreſſo-plana; diſſepimento valvis parallelo, aequali, plano. Stylo brevi. Semina compreſſa marginata.

427. LUNARIA REDIVIVA. Siliculis oblongis, foliis alternis, (cordatis. Radix perennis.) (G.) Gaertn. de fr. et ſem. pl. Cent. 9. t. 142. f. 1.

Ad Lugam fluvium inter pagos Curovitza et Novaja in ſylvis magna copia occurrit. Floret Iunio, Iulio. ♃ Мѣсячникъ. ſive лунная трава. Russ. Мѣсячникъ иноголѣтній. Sobol.

SILIQUOSA.

CARDAMINE. Siliqua longa, cylindraceo-compreſſa, bilocularis, bivalvis, valvulis elaſtice dehiſcentibus ſpiraliter (ſurſum) revolutis. Calyx ſubhians. Stigma obtuſo-capitatum, integrum. (Stamina ſaepius quatuor longiora tantum. Petala ſaepius abortiva.)

428. CARDAMINE PRATENSIS. Foliis pinnatis: foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis. (G.) Curt. fl. Londin. t. 175. Variat. flore albo, et flore pleno, purpureo.

In pratis humidis inſulae apothecariae et lapideae et paſſim frequens eſt. Floret Majo, Iunio. ♃ Кресъ луговой. Russ. Robol.

429. CARDAMINE AMARA. Foliis pinnatis, axillis ſtoloniferis. (Caule flexuoſo, foliis glabris.

Stolones in plantis defloratis tantum.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 158.

Habitat in aquis et ad ductus aquarum, uti in ſylvis inſulae apothecariae, et lapideae. Floret Majo, Iunio. ♃ Кресъ горькій. Sobol.

SISYMBRIUM. Petala unguibus minimis. Siliqua incurvula, gibba, teres, valvulis dehiſcendo rectiuſculis, diſſepimento paulo brevioribus. Calyx patens. Corolla patens.

430. SISYMBRIUM NASTURTIUM. Siliquis declinatis, foliis pinnatis; foliolis ſubcordatis. (G.) Flor. dan. t. 990. Naſturtium aquaticum, officinarum.

Habitat ad rivulos fluentes, et fontes circa officinam pyriam Ochtenſem, ad Goreloy cabac, et paſſim. Floret Iunio. ♂ Брунъ кресъ. Russ. Кресъ водяный. Sobol.

431. SISYMBRIUM SYLVESTRE. Siliquis declinatis, oblongo ovatis, foliis pinnatis, foliolis lanceolato-ſerratis. (Caule ramoſiſſimo, floribus parvis flavis.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 153.

In humidis, paluſtribus et ad foſſas paſſim. Floret Iunio. ♃ Гулявикъ. ſive гулявникъ. Russ. гулявникъ лѣсный. Sob.

432. SISYMBRIUM AMPHIBIUM. Siliquis declinatis, oblongo-ovatis, foliis pinnatifidis ſerratis, petalis calyce majoribus. (Folia calycina et petala flava) (G.) Tabernam. Kraeuterb. p. 408. Variat foliis ſimplicibus et pinnatis.

In ripis inundatis Nevae fluvii, et in aquis lente fluentibus et paludoſis circa pagum Zapolje. Flo-

ret Majo, Iunio. 2 Гулявникъ водоземный. Russ. Sobol.

433. SISYMBRIUM SOPHIA. Petalis calyce minoribus, foliis decompoſito-pinnatis. (G.) Flor. dan. t. 528. Sophia, officin.

Creſcit ubique in arvis, aggeribus, ad vias et ſepes. Floret Majo, Iunio. ☉ Гулявникъ. ſive мудрость лѣкарская. Russ. Sobol.

ERYSIMUM. Siliqua longa linearis, ſtricta, erecte tetragona, bilocularis, bivalvis. Calyx clauſus. Stigma capitatum.

434. ERYSIMUM OFFICINALE. Siliquis ſpicae adpreſſis, foliis runcinatis, (extremo lobo triangulo dentato, calycum apicibus coloratis, ſiliqua villoſa, longitudinaliter ſtriata.) (Flor. dan. 560. Eryſimum officin.

Habitat in arvis, ad vias et in ruderatis ſiccis inſulae baſilenſis et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горчица полевая. ſive Свирѣпка. Russ. Свирѣпка аптекарская. Sobol.

435. ERYSIMUM BARBAREA. Siliquis obſolete tetragonis, foliis lyratis extimo ſubrotundo, (carnoſo, ſplendido.) (G.) Flor. dan. t. 985.

Habitat in quantitate ad foſſas viae Sarſcolienſis, et in pratis humidis paſſim. Floret Majo, Iunio. 2 Варварка. Russ. Sobol.

436. ERYSIMUM CHEIRANTHOIDES. Caule ramoſiſſimo, foliis integris lanceolatis, oblique repando-dentatis, patulis. (Foliis radicalibus emarcidis, roſmarinoidibus. Caules ramoſi ex nigro

maculati, planta exſucca. Siliquae a ſcapo racemi diſtantes.) (G.) Flor. dan. t. 923.

Ad agrorum margines et inter ſegetes frequenter occurrit, atque petropoli in cultis, et hortis paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Свирѣпка рукоцвѣтная. Russ. Sobol.

ARABIS. Nectaria quatuor, ſingulum ex ſquamula intra fundum folioli calycini reflexa. Siliqua longa, compreſſa, linearis, apice integra, capitata. (Calyx ſuperne patens; ſiliqua lata; petala limbo ampliſſimo, patulo.)

437. ARABIS THALIANA. Foliis petiolatis lanceolatis integerrimis ſubdenticulatis, ad exortum ramorum caulinis ſeſſilibus. Corolla nivea ad faucem ſubflaveſcens.) (G.) Flor. dan. t. 1195.

Creſcit in hortis oleracis Petropoli et ad pagos circa viam Schlüſſenburgenſem. Floret Majo. ☉ Аранская горчица. Russ. Sobol.

TURRITIS. Petala erecta (in hac claſſi anguſtiſſima.) Siliqua omnium longiſſima, ſtricta, tetragona, (interdum pendula.) Calyx connivens erectus.

438. TURRITIS GLABRA. Foliis radicalibus dentatis hiſpidis, caulinis integerrimis, amplexicaulibus glabris.) Braſſicae fere habitus; petalis albidis, foliis cichoraceis.) (G.) Flor. dan. t. 809.

Habitat in pratis ſiccis montoſis, ſylvoſis Pargelovii, et circa Catherinhoffium, aliisque in locis ſimilibus. Floret Iunio, Iulio. ♂ Бешенница гладкая. Russ. Sobol.

439. TURRITIS HIRSUTA. Foliis omnibus hiſpidis; caulinis amplexicaulibus. (Foliis caulinis ſeſſilibus, acutiuſculis, ſubſagittatis, integerrimis, dentato-ciliatis; ſiliquis erectis linearibus compreſſis, petalis niveis maximis, calycibus apice ſaepius ſphacelatis, glandula triloba inter ſtamina longiora et calycem, ſimilis Arabidibus. Pili in foliis furcati, in caule ſimplices.) (R. Sobol.) Flor. dan. t. 1040.

Habitat in paſcuis montoſis, ſylvoſis Craſnoſelii, et paſſim circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. ♂ Бешенница шершавая. Russ. Sobol.

BRASSICA. Calyx erectus connivens. Siliqua utrinque depreſſa, longa, valvulis diſſepimento apice tereti brevioribus. Glandulae quatuor, inter ſtamina longiora et calycem, una utrinque. Semina globoſa.

440. BRASSICA CAMPESTRIS. Radice caulèque tenui, foliis caulinis uniformibus cordatis ſeſſilibus. Radicalibus lyratis, ſubhiſpidis. Variat, flore albo, et luteo. (G.) Flor. dan. t. 550.

Inter ſegetes et ad ſepes hortorum oleraceorum frequens eſt. Floret Iunio. ☉ Капуста полевая. Russ. Sobol.

441. BRASSICA NAPUS. Radice cauleſcente fuſiformi. (G.) Blackw. herb. t. 224.

Habitat in agris circa Pargelovium et Oſinova Roſchcza, nec non ad rudera domorum et ſepes hortorum. Floret Majo, Iunio. ♂ Рѣпа дикая. Russ.

SINAPIS. Calyx patens. Petala unguibus erectis linearibus. Glandulae quatuor inter ſtamen bre-

vius et piſtillum, utrinque unica, et inter ſtamina longiora et calycem. Siliqua toroſa inferne, ſcabra, roſtrata; diſſepimento valvulis duplo ſaege longiore. (Glandulae? Cornu ſiliquae bifidum.)

442. SINAPIS ARVENSIS. Siliquis multangulis, toroſo-turgidis, roſtro ancipiti longioribus. (Foliis inciſo-ſerratis, floribus luteis, cornu brevi. (Sob. B.) Flor. dan. t. 753.

Habitat in agris et inter ſegetes circa urbem Jamburgum, Boeber, circa montem Pulcovum, Pargelovii. Sobol. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горчица полевая. Russ. Sobol.

RAPHANUS. Calyx clauſus erectus, (ſetoſus.) Siliqua toroſa, ſubarticulata, teres cum acumine. Glandulae nectariferae quatuor, unica utrinque inter ſtamen breve et piſtillum, unica inter ſtamina longiora et calycem. (Flos fere Heſperidum habitu.)

443. RAPHANUS RAPHANISTRUM. Siliquis teretibus articulatis laevibus unilocularibus, (ſaepius intortis. Calyce colorato hiſpido, glandula nulla. Hirſuta aſpera planta; caulis retrorſum hiſpidus, folia inferiora runcinata; fructus diſcedens ſecundum articulos. Variat flore albo et luteo.) (Sob.) Curtis flor. Londin. t. 267.

Habitat inter ſegetes Pargelovii et in agris paſſim. Floret Majo, Iunio, Iulio. ☉ Редька полевая. Russ. Sobol.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA DECANDRIA.

GERANIUM. Calix quinquepartitus. Corolla pentapetala. Piſtillum unum. Stigmata quinque. Staminum urceolus decempartitus. Receptaculum commune roſtratum, cauda longiſſima tortili longitudinaliter interne dehiſcente. Cocculi quinque.

444. GERANIUM CICUTARIUM. Caule remoſo proſtrato, foliis pinnatis, pinnulis ſubovatis, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris. (Glandulis nigris inodorum.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 53.

In pratis Oſinovae Roſchczae aliisque, tum ad vias et plateas atque in hortis oleraceis frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ☉ Журавлиный носъ. ſive Журавлинникъ омиговый. Russ. Sobol.

445. GERANIUM SYLVATICUM. Pedunculis biſloris, foliis ſubpeltatis inciſo-ſerratis quinquelobis, caule etecto ſubtetragono, petalis emarginatis, (lineis tribus purpureis. Folia pilis adpreſſis gaudent, ſubtus pallida venis flexuoſis. Petala baſi ſubhirſuta. Pedunculi breves piloſi. Arilli hirſuti, annulo elevato.) (R. Sob.) Flor. dan. t. 124.

Habitat circa Petropolim, in ſylvis montoſis ad fabricam pyriam Ochtenſem, Pargelovii, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Журавлиникъ лѣсный. Russ. Sobol.

446. GERANIUM PALUSTRE. Foliis quinquelobis inciſis caule que herbaceo villoſis, pedunculis biſloris oppoſitis longiſſimis declinatis, petalis integris. (Rami divaricatiſſimi, bifariam angulati, angulis obtuſis. Foliis rugoſis ſubtus, cum petalis dilute rubris lineis tribus fuſcis, baſi villis albis.) (G.) Flor. dan. t. 596.

Habitat in ſylvis humidis et ripis Nevae fluvii; circa inſulam lapideam, et inſulam crucis, alibique in locis ſimilibns paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Журавлинникъ болотный. Russ. Sobol.

447. GERANIUM PRATENSE. Pedunculis biſloris, caule herbaceo erecto, foliis oppoſitis ſubpeltatis multipartitis rugoſis, lobis pinnatis acutis, petalis integris. (Totum hirſutum; petioli radicales longi. Corolla magna violacea.) (G.) Curts flor. Londin. t. 250.

In pratis ſylvoſis circa fabricam pyriam Ochtenſem, in monte Poclonnaja et ad viam Peterhoffianam et Strelinam frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Журавлинникъ луговый. Russ. Sob.

448. GERANIUM ROBERTIANUM. Pedunculis biſloris, foliis ternatis pinnatis inciſis, calycibus piloſis decemangulatis. (Odor hircoſus.) (R .Sob.) Flor. dan. t. 694. Geranium robertianum, offic.

Habitat in rupibus umbroſis circa Pargelovium, et Strelinam. Floret Iunio, Iulio. ♂ Журавлинникъ робертіанскій. Russ. Sobol.

449. GERANIUM LUCIDUM. Pedunculis bifloris, caule herbaceo, foliis oppositis pilosis quinquelobis rotundatis, calycibus pyramidatis transverse elevato-rugosis. (G.) Flor. dan. t. 213.
Crescit circa Novogrodium. Gorter. Et circa pagum Colodeci, atque urbem Gatczinam. Sob. Floret Majo, Iunio. ☉ Журавлинникъ свѣтлый. Russ. Sobol.

450. GERANIUM COLUMBINUM. Caule procumbente, foliis oppositis palmatis angulatis, laciniis pinnatis glabris, calycibus aristatis, pedunculis solitariis, foliis longioribus. (Sob.) Cavanill. diss. 4. t. 82. f. 1.

Habitat in hortis oleraceis, uti in horto imperiali vulgo Italico dicto, et in regione Peterburgensi, atque in aliis, passim. Floret Majo, Iunio. ☉ Журавлинникъ голубиный. Russ. Sobol.

451. GERANIUM ROTUNDIFOLIUM. Pedunculis bifloris, caule prostrato, foliis oppositis inferioribus subrotundis semiquinquepartitis, superioribus subcuneatis; petalis integerrimis calyce paulum longioribus. (Arillis laevibus pilosis seminibus reticulatis.) (Sob.) Regn. bot. t. 214.

Habitat in agris circa montem Duderovum, et Crasnoselium, atque Petropoli in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Журавлинникъ кругло-листый. Russ. Sobol.

POLYANDRIA.

MALVA. Perianthium duplex, exterius triphyllum, interius monophyllum semiquinquefidum. Petala quinque. Capsulae numero stigmatum, octo aut

plures, monoſpermae, unilocularis, rarius biloculares aut diſpermae in verticillum diſpoſitae.

452. MALVA ROTUNDIFOLIA. Caule proſtrato, foliis cordato-orbiculatis plicatis, obſolete quinquelobis ſeptemlobisque, pedunculis uno aut tribus fructiferis declinatis. (G.) Flor. dan. t. 721. Malva, officin.

Creſcit iu ruderatis, ad vias et ſepes hortorum, uti in regione peterburgenſi, in regimento Semenowſky et Iſmaylowſky, circa noſocomium maritimum, et ed fluvium Lugam. Floret tota aeſtate. ☉ Просвирки, ſive калачики. Russ. Присвирничка круглолистая. Sobol.

453. MALVA VERTICILLATA. Caule erecto, foliis angulatis, floribus axillaribus glomeratis ſeſſilibus, calycibus ſcabris. (Sob.) Iacq. hotr. vind. t. 40.

Creſcit copioſe in horto Imperiali italico dicto, et in hortis oleraceis circa Regimentum Preobrazſchensky, ſpontanea. Floret Iunio, Iulio. ☉ Просвирничка цвѣтоколесная. Russ. Sobol.

454. MALVA CRISPA. Caule erecto, foliis angulatis criſpis, floribus axillaribus glomeratis. (R.) Cavanill. diſſ. 2. t. 23. f. 1.

Habitat circa P.tropolim, in ruderatis. Floret Iulio. ☉ Просвирничка кудрявая. Russ. Sobol.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA

HEXANDRIA.

FUMARIA. Calyx diphyllus. Corolla ringens, fauce clauſa, (tetragona,) nectarifera, nectario ſtamina occultante. Filamenta duo membranacea, ſingula antheris tribus. Silicula unilocularis, ſubmonoſperma.

455. FUMARIA BULBOSA. Radice bulboſa, caule ſimplici, bracteis ovato-lanceolatis integerrimis flore brevioribus. (Coloratis, caulis unicus albidus diphyllus, foliis Liguſtici, trifidis, bracteis foliolis tribus, fere calycis longitudine, floribus ſubſeſſilibus, calycibus ſtipulantibus, corollis carina alata, alis lateralibus latiſſimis. Variat floribus purpuraſcentibus, et albis.) (L. Sob.) Flora dan. t. 60. Ariſtolochia cava, officin.

Habitat in ſylvis montoſis umbroſis, uti in monte Pulcovo, et Duderovo, et circa pagum Colodeci, et urbem Gatczinam, Sob. atque Petropoli in vallè circa praedium Mandere, aliisque vallibus ſubhumidis; ad ripas minorum ramorum Nevae fluvii. Laxmann. Floret inter primas plantas, ad finem Aprilis, et Majo. ♃ Дымница орѣшистая. Russ. Sobol.

456. FUMARIA OFFICINALIS. Leguminibus monoſpermis racemoſis, caule diffuſo acutangulo,

foliis decompoſitis glaucis, corollis purpuraſcentibus. (G.) Zorn pl. officin. ic. t. 14. Fumaria, officinarum.

Habitat inter ſegetes, Pargelovii, Oſinovae Roſczae, Craſnoſelii, et ad viam Peterhoffianam, circa Strelinam, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Земный дымъ. Russ. дымница аптекарская. Sobol.

OCTANDRIA.

POLYGALA. Calyx pentaphyllus, foliolis duobus majoribus alaeformibus, ante maturitatem ſeminis coloratis; exterioribus tribus minoribus. Corolla ſubpapilionacea, inaequalis, vexillum cylindricum. Capſula obcordata, compreſſa, biloculari. Semina ſolitaria.

457. POLYGALA AMARA. Floribus racemoſis, Caulibus erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. (Caulinis declinatis, ellipticis, alternis, ſeſſilibus; pedunculis calycibusque floribus caeruleis concoloribus. Caule procumbente. Amaritie mox diſtinguitur a vulgari ſimili. Folia radicalia ceſpitoſa craſſa. Flores ſemper violacei.) (Sob. B.) Iacq. flor. auſtr. 5. t. 412. Polygala amara, officin.

Habitat circa Petropolim. Creſcit in magna quantitate in pratis circa montem Pulcovum, et Duderovum, ad Craſnoje ſelo, et Colodeci, et paſſim in montoſis. Floret Iunio. ♃ Истодъ горкій. Russ. Sob.

458. POLYGALA VULGARIS. Floribus racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbenti-

bus, foliis lineari-lanceolatis. (Caulibus procumbenti-erectis; foliis fere buxinis; floribus alis majoribus dependentibus, vexillo bifido, variis, albis, purpureis caeruleisve, laciniis ſexdecim, aut ſeptemdecim. Capſula thlapſidea, fructu hilo trifido. (G.) Flor. dan. t. 516.

Ad ductum aquarum Ladogenſium, et ad montem Pulcovum, Duderovium, fluvium Lugam et pagum Colodeci, frequens eſt, atque in inſula lapidea occurrit. Floret Iunio, Iulio. ♃ Истодъ обыкновенный. Russ. Sobol.

DECANDRIA.

ANTHYLLIS. Calyx ventricoſus, villoſus quinquedentatus. Legumen minimum, ſubrotundum, tectum, intra calycem.

459. ANTHYLLIS VULNERARIA. Foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato, (terminali. Caules proſtrati, ad inſidentes flores incurvati; alae carina longiores, carina roſtro longo. Folia ternata, quina, trifida ſeu quinquefida. Variat floribus flavis et luteis, apice rubro et ſanguineo, foliisque variis.) (G.) Flor. dan. t. 988. Vulneraria, officin.

Circa oſtium Narovae fluvii in pineto, praeterea nullibi viſa. Floret Majo, Iunio. ♃ Язвенникъ. ſive сольникъ. Russ. Сольникъ ранецъ-лебный. Sob.

OROBUS. Calyx baſi obtuſus, dentibus ſuperioribus duobus profundioribus, brevioribus. Stylus linearis, teres, ſupra villoſiuſculus.

460. OROBUS VERNUS. Foliis pinnatis ovatis: ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis, caule ſimplici, (purpureo quadrangulo, ſtipulis involucrantibus, pedunculis ſex floris, aut octo floris, floribus purpureis vexillo caeruleo-rubenti, plica ſingulari.) (G.) Blackw. herb. t. 208. f. 1. 2. Orobus, officin.

Habitat in ſylvis umbroſis montoſis Duderovii, Pulcovo, Oſinovae Roſchczae, circa urbem Gatcznam, pagum Colodeci, circa fabricam pyriam Ochtenſem, et in plerisque aliis ſimilibus. Floret Majo. ♃ Горногорошникъ весенній. Russ. Sob.

LATHYRUS. Calycis laciniae duae ſuperiores breviores. Stylus planus, ſupra villoſus, ſuperne latior. Legumen plurimis aequale latum longiſſimum. (Vexillum obcordatum, maximum.)

461. LATHYRUS PRATENSIS. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis; foliolis lanceolatis (binatis, utrinque acutis, petiolis alatis, ſtipulis duabus ad nodos ſingulos, floribus luteis, odoratis, vexillo lineis atris angulis duobus cartilagineis carinam amplexante.) (G.) (Flor. dan. t. 527.

Habitat frequens in pratis laetioribus; uti circa fabricam pyriam Ochtenſem, Catharinhoffi, et in inſulis Nevae fluvii. Floret Iunio, Iulio. ♃ Гороховникъ луговый. Russ. Sobol.

462. LATHYRUS SYLVESTRIS. Pedunculis multfloris, cirrhis diphyllis, foliolis enſiformibus, internodiis membranaceis. (Caules trianguli, folioſo-alati, cirrhi plerumque triphylli; foliola in ſpinulam terminata; vexillum tota ora cincina-

tum, purpureum. Variat flore rubente et albido.) Flor. dan. t. 525.

Habitat in ſylvis montoſis circa Petropolim. (B.) Florrt Iunio. 2l Гороховникъ лѣсный. Suss. Sob.

463. LATHYRUS LATIFOLIUS. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. (Caules alati, alis ciliato-aculeatis; folia bina oppoſita ovato-obtuſa ſubſeneſcentia maxima. Cirrhi ſaepius triphylli. Flores roſei magni, ſubinde caeruleo-virides, carina adſcendente, intorta ſaepius.) (G.) Rivin. tetrap. t. 40.

Habitat circa montem Pulcovum, et ad fluvium lugam, atque in montoſis Duderhovii et Craſnoſaelii. Floret Iunio. 2l Гороховникъ широколиſтный. Russ. Sobol.

464. LATHYRUS HETEROPHYLLUS. Pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis tetraphyllisque: foliolis lanceolatis, internodiis membranaceis. (B.) Hacq. it. carp. ſept. 1. 32.

Habit circa Petropolim. In vallibus et montibus Pargelovii, et Oſinovae Roſchczae (Sob.) Floret Iunio, Iulio. 2l Гороховникъ разнолиſтный. Russ. Sob.

465. LATHYRUS PALUSTRIS. Pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, ſtipulis lanceolatis; (internodiis membranaceis; foliis auriculis calcaratis; calycis ora ciliata; carina ad angulum fere rectum adſcendente. Flores Orobi verni ſubcaerulei, pallide purpuraſcentes. (G.) Flor. dan. t. 399.

Habitat in in locis paludosis et pascuis humidis circa Catharinhoffium et ad viam Peterhoffianam passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Гороховникъ болотный. Russ. Sob.

VICIA. Stigma latere inferiore transverse barbatum. Legumen coriaceum, longum, acumine terminatum, (multis nodosum. Calyx semiquinquefidus. Stylus ad angulum rectum.)

466. VICIA SYLVATICA. Pedunculis (elongatis) multifloris foliolis ovalibus, stipulis denticulatis. (Floribus albentibus, lineis caeruleis.) (G.) Flor. dan. t. 277.

Habitat in sylvis umbrosis montis Pulcovi, Duderovi, Strelinae et passim. Floret Iunio, Iulio. 2 Мышій горохъ лѣсный. Russ. Sob.

467. VICIA CRACCA. Pedunculis multifloris, foliolis lanceolatis pubescentibus, stipulis integris, floribus imbricatis. (Caulis villis pubescens, foliis fere linearibus, interdum glabris, stipulis hirsutis tripartitis. Flores ex violaceo-purpureocaerulei, fauce aggeribus duobus, alia carina multo longioribus carina bipede; siliquae subhirsutae longae.) Flor. dan. t. 804.

In pratis et inter segetes atque in hortis ubique et maxima copia. Floret Iunio, Iulio. 2 Мышій горохъ полевый. Russ. Sob.

468. VICIA SATIVA. Leguminibus sessilibus subbinatis erectis, foliolis omnibus oblanceolatis retusis emarginatis, stipulis dentatis, seminibus compressis. (Stipulis dentibus aristatis, postice exsustulatis. Calyx dentibus longissimis rectis

ſubaequalibus, alis purpureis. Stigma ſaepius nudum. Tota villoſula.) (G.) Flor. dan. t. 522.

Habitat inter ſegetes, et in ripa Nevae fluvii inter Kazatchiam, et Ochtam. Floret Iunio, Iulio. ☉ Мышій горохъ сѣяльный. Russ. Sob.

469. VICIA SEPIUM. Leguminibus pedicellatis ſubquaternis erectis, foliolis ovatis integerrimis: exterioribus decreſcentibus. (Coſtae auriculis ſubariſtatis, foliis ovato-obtuſis quinque aut ſex, mucrone adunco inſtructis; ſtipulae ſubtus nigro-maculatae, calycis dentes curti corollae tubo breviores; corollis albocaeruleis liveſcentibus, floribus plerumque quatuor. (G.) Flor. dan. t. 699.

Habitat ubique, in ſylvis herboſis, in pratis, inſulae Iapideae aliarumque, et ad ſaepes hortorum frequens. Floret Majo, Iunio. ♃ Мышій горохъ заборный. Russ. Sob.

470. VICIA MONANTHA. Pedunculis unifloris ariſtatis, foliolis lanceolatis obtuſis: ſtipulis bifidis. (R.) Retz. obſ. bot. 3. p. 39.

Habitat circa Petropolim. In agris circa Craſnoje ſelo, et montem Duderovium. (Sob.) Floret Iunio, Iulio. ☉ Мышій горохъ одноцвѣтный. Russ. Sobol.

ERVUM. Calyx quinquepartitus, ſubaequalis, longitudine fere corollae. (Simillimum viciae, a qua ſtigmate imberbi deffert.)

471. ERVUM TETRASPERMUM. Pedunculis ſubbifloris, ſeminibus globoſis quaternis. (Caulis infimus ſubquadrangulus, folioſus, foliis linearibus quadijugis aut qunquejugis, denticulatis, calyce

purpureo, corolla dilute caerulea, albidave, ſtamen decimum connatum ſaepius.) (G.) Curtis flor. Londin. t. 41.

Occurrit paſſim in agris, et inter ſegetes, ſed rarius quam vicia cracca. Floret Iunio. ⊙ Чечевица четыресемянная. Russ. Sob.

472. ERVUM HIRSUTUM. Pedunculis multifloris, ſeminibus globoſis binis. (Caulibus proſtratis quadrangulis, utrinque ſubalatis, foliis quinque aut novem, cirrhis involutis, corolla dilute caerulea, vexillo medio denticulato, carina lateribus margine purpurea. Legumen hirſutum.) (G.) Flor. dan. t. 639.

Habitat cum vicia ſativa, tum inter ſegetes ad Goreloj cabac, et in hortis cultis. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Чечевица шершавая. Russ. Sob.

TRIFOLIUM. Flores ſubcapitati. Capſula vel Legumen vix calyce longius, non dehiſcens, deciduum. (Perianthium quinquedentatum: Stamen decimum liberum.)

473. TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. Capſulis racemoſis ſubdiſpermis acutis rugoſis, caule erecto. (Flores penduli racemoſi flavi, rarius albi, vexillo emarginato recedente a carina, alis convolutis divergentibus, capſulis turgidulis.) Blackw. hab. t. 80.

Ad cataractas fluvii Wolchow, praeterea nuſquam vidi. Gorter. Floret, Iulio. ⊙ Melilotus, officin. Дикой хмѣль, ſive донникъ. Russ. трилистникъ донный. Sobol.

474. TRIFOLIUM HYBRIDUM. Capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule adſcendente. (Flores primo congeſti capituliformes albi, dein patuli rubelli, tandem reflexi marcidi ferruginei evadunt.) (Sob. R.) Rivin. tetrap. t. 127. f. 3.

Habitat circa Petropolim. In pratis inſulae apothecariae et lapideae et in hortis oleraceis ſaepe occurrit, floribus odoratis gratiſſimis. Sobol. Floret Iunio, Iulio. 2 трилистникъ подложный. Russ. Sobol.

475. TRIFOLIUM REPENS. Capitulis umbellaribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente. (Folia macula albente lambdoidea; flores albi ſubquadripetali, vexillo longiſſimo plicato, defloratis recedentibus. Folia aëre ſicco flaccida, et aëre humido erecta.) (G.) Flor. dan. t. 980.

Creſcit ubivis in pratis. Floret Majo, Iunio, Iulio. 2 трилистникъ ползучій. Russ. Sobol.

476. TRIFOLIUM RUBENS. Spicis longis villoſis, corollis monopetalis, caule erecto, foliolis ferrulatis. (Caules admodum folioſi foliis lanceolate-linearibus, ſpica longiſſima rubente, calycis dente imo longiſſimo; ſtipulae longiſſimae, flores purpurei. Radix ingrata amaricans.) Iacq. flor. auſtr. v. 385.

Habitat circa Petropolim. Boeber. In montoſis ſylvaticis Pargelovii. (Sob.) Floret Iunio. ☉ трилиотникъ краснѣющій. Russ. Sob.

477. TRIFOLIUN PRATENSE. Spicis globoſis ſubvilloſis cinctis, ſtipulis oppoſitis membrana-

ceis. (Caules incurvi, ſtipulae ſeſſiles ſetaceae, folia ovata integra, corolla monopetala, tubo, ut prius, ſtaminifero, ſtigmate papillis duabus, purpurea, vel ochroneuca. Flores odorati.) (G.) Blackw. herb. t. 20.

In pratis ubique frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Дятлина, ſive кашка. Russ. Трилистникъ луговый. Sob.

478. TRIFOLIUM ARVENSE. Spicis ovalibus villoſis, calycis dentibus ſetaceis villoſis aequalibus. (Caulibus erectis, mollibus, lanuginoſis, ſubdichotomis, foliis nervo in ſpinulam terminato, inciſis, ſtipulis exiguis, calycibus dentibus quinque longiſſimis, pappo pinnato; flores magni, quadripetali carnei; deflorati aurantiaci, alae intus macula ſanguinea.) (G.) Flor. dan. t. 724.

Habitat in arvis et agris montoſis, apricis uti circa Sarskoje ſelo, et Murzincam, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Заячьи лапы. Russ. Трилистникъ полевый. Sob.

479. TRIFOLIUM FRAGIFERUM. Capitulis ſubrotundis, calycibus fructiferis reflexis, labio ſuperiore inflato bidentato, caule repente. (Foliis argute ſerratis; floribus rubicundis, quadripetalis, calycibus roſeis. Flor. dan. t. 1042.

Habitat circa Petropolim. Boeber. In locis humidis circa Catharinhoffium et alibi frequens eſt. Sobol. Floret Iunio, Iulio. ♃ трилистникъ земляничный. Russ. Sobol.

480. TRIFOLIUM MONTANUM. Spicis ſubimbricatis ſubtribus: vexillis ſubulatis emarceſcen-

tibus, calycibus nudis, caule erecto. (Caules nudiuſculi, foliis lanceolatis, duris, ſtrigoſis, ſubplicatis cauleque piloſis, calycibus albis, floribus monopetalis, florentibus erectis albidis. Capitulum eſt vere Racemus coarctatus bracteis ſubulatis minimis interſtinctis.) Rivin. tetrap. t. 12.

Habitat in inſula Petri, et ad fluvium lugam ſed rarius. Gorter. Occurrit etiam in monte Pulcovo, et circa Murzincam et Ribacziam in pratis ſylvaticis montoſis. Sob. Floret Iunio. Iulio. 2ℓ Трилистникъ горный. Sobol.

481. TRIFOLIUM AGRARIUM. Spicis ovalibus imbricatis; vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus ſubpubeſcentibus, ſtipulis cordatis ciliatis, foliolo impari petiolato, caule diffuſo (interdum ſubdichotomo, foliis ſerratis, capitulis oblongis, floribus quadripetalis luteis, vexillo plicatulo ſerrulato.) (G.) Flor. dao. t. 558.

Habitat in agris cultis et pratis, Pargelovii, et Ligovi, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Трилистникъ пашенный. Russ Sobol.

482. TRIFOLIUM SPADICEUM. Spicis ovalibus imbricatis, vexillis deflexis perſiſtentibus, calycibus piloſis, caule erecto. (Floribus rufeſcentibus.) Barr. pl. rar. ic. 1024.

Vulgatiſſima, in inſula praeſertim apothecaria, planta eſt, tum in monte Poclonnaja et ad viam Sarſcoſelienſem in pratis ſylvoſis humidis frequens. Vide ejus deſcriptionem in flora ingrica. Gorteri. Floret Iunio, Iulio. ☉ Дикой хмѣль. Russ. Трилистникъ красноголовый. Sobol.

483. TRIFOLIUM FLEXUOSUM. Spicis ſubglobosis villosis terminalibus, caule adscendente flexuoso ramosissimo, foliolis ovato-lanceolatis serrulatis. (Stipulae strictae inferne lineis rubellis, ad oras, ut folia maculata maculis albescentibus, hirsutulis; calyces decemstriati ochroleuci superne purpurascentes, lacinia infima longitudine corollae dilute rubentes. Roth. flor. gern. 1. p. 314.

Habitat circa Petropolim. Rudolph. Ad margines sylvarum in pratis elevatis, circa Sarscoje selo. Sob. Floret Iunio, Iulio. Durationis incertae. Трилистникъ изгибистый. Russ. Sob.

LOTUS. Calyx tubulosus. Alae sursum longitudinaliter conniventes. Legumen teres, strictum, (multis) loculamentosum, farctum seminibus inflexum. (Vexillum ungue oblongo concavo. Stigma punctum inflexum. Legumen saepius membranaceo-quadrangulare.)

484. LOTUS CORNICULATUS. Capitulis depressis decumbentibus herbaceis, leguminibus patentibus. (Caulibus purpureis, foliis oblique cordatis subamplexantibus, floribus umbellatis flavis, leguminibus cnneiformibus, compressis, maculatis. Variat flore majore luteo splendente, prout in udis, sabulosis vel in alpibus crescit.) Curtis flor. Londin. t. 107.

Ad urbem Jamburgum inde inferiora versus fluvii Lugae in pascuis vulgaris est planta. Gorter. Occurrit. etiam in Strelinae pratis elevatis et ad littus maris arenosum. (Sob.) Floret Iunio, Iulio. 24 Леденецъ рожковатый. Russ. Sob.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA POLYANDRIA.

HYPERICUM. Calyx quinquepartitus. Petala quinque. Filamenta capillaria multa basi in tres aut quinque phalanges connata. Stili tres, interdum unus duo, quinque; capsula loculis numero stylorum polyspermis. (Petala secundum motum solis rotata.)

485. HYPERIUM QUADRANGULUM. Floribus trygynis, foliis ovatis, (trinervibus) caule quadrangulo (alato. Flores et calyces puri, vel in laciniarum margine punctati; stamina quindecim, folia margine reflexa.) (G.) Flor. dan. t. 640.

Habitat Pargelovii, in monte Poclonnaja et Osinova Roschcza, in pratis humidis submontanis, uti circa Colodeci, et ad montem Pulcovium ejusque in viciniis copiose provenit. Floret Iulio. 2|. Звѣробой четвероугольный. Russ. Sob.

486. HYPERICUM PERFORATUM. Floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido-punctatis. (Petalis oblique-truncatis crenulatis puncto atro inter crenas notatis. Variat: foliis pellucido-et obscure punctatis, et petalis calyce minoribus acuminatis integris. Stamina viginti

unum. Antherae puncto atro. Stigmata ſanguinea. (G.) Blackw. herb. t. 15. Hypericum offic.

In inſula rotunda frequens eſt; in pratis ſylvaticis, nemoroſis inſularum apothecariae, lapideae, et in monte Poclonnaja, copioſe provenit. Floret Iunio, Iulio. ♃ Звѣробой. Russ. Звѣробой проколотый. Sobol.

487. HYPERICUM HIRSUTUM. Floribus trigynis, calycibus ſerrato-glandulosis, caule tereti erecto, foliis ovatis ſubpubeſcentibus, (pedicellatis perforatis. Petala lineolis nigris notata. Variat, foliis oppoſitis ternatis, caulibus admodum foliosis, foliis non punctatis, atroviridibus, floribus puris. (G·) Flor. dan. t. 803.

Habitat circa Petropolim in locis montoſis apricis, uti Pargelovii, et Oſinovae Roſchze. Floret Iunio, Iulio. ♃ Звѣробой мохнатый. Russ. Sobol.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA

POLYGAMIA AEQUALIS.

SCORZONERA. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindraceus, ſquamis quindecim margine ſcarioſis. Pappus plumoſus.

488. SCORZONERA HUMILIS. Foliis lato-lanceolatis nervoſis planis, caule ſubnudo unifloro.

(Folia glauca varia, petala linearia ſulphurea; lacteſcit lacte demum aurantiaco.) (G.) Flor. dan. t. 816.

Habitat in pratis ſylvoſis, circa fluvium Strelnaja, et in viciniis Fabricae pyriae Ochtenſis, Pargelovii, Murinae, et paſſim. Floret Majo, Iunio. ♃ ужовникъ. ſive Козелецъ. Russ. Козелецъ низкій. Sobol.

PICRIS. Receptaculum nudum. Calyx duplicatus, exterior penthaphyllus. Pappus plumoſus. Semina tranſverſim ſulcata.

489. PICRIS HIERACIOIDES. Perianthiis laxis, foliis integris, pedunculis ſquamatis in calycem. (Scapus plerumque dichotomus villis rigidus; folia radicalia dentata, ſuperiora amplexicaulia; ſemina flaveſcentia. Pedunculi in calycem usque adſperſi ſquamis ſubulatis. Tota ſcabra, ſetis furcatis obſita. Caulis uno latere purpuraſcens (G.) Sow. Engl. bot. t. 196.

Habitat ad limites agrorum et in pratis circa Sarſcoje ſelo, et Craſnoje ſelo. Floret Iunio. ♃ Горчавка сокольная. Russ. Sobol.

SONCHUS. Receptaculum nudum. Calyx imbricatus baſi ventricoſus. Pappus capillaris ſeſſilis.

490. SONCHUS PALUSTRIS. Pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi ariſtatis. (B.) Flor. dan .t. 1007.

Creſcit in paludibus et humidis circa Petropolim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Молочай болотный. Russ. Sobol.

491. SONCHUS ARVENSIS. pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis runcinatis baſi cordatis. (Calycibus villoſis, floribus maximis. (Sob. R.) Flor. dan. t. 606.

Habitat in agris et inter ſegetes circa Ligovam, Goreloj cabac, tum in hortis paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Молочай полевый. Russ. Sobol.

492. SONCHUS OLERACEUS. Pedunculis tomentoſis, calycibus glabris, umbella terminali breviore. (G.) Var. β Sonchus laevis. foliis amplexicaulibus laciniatis latioribus calycibus laevibus. (Sob.) Flor. dan. t. 682.

Var. γ Sonchus aſper. Foliis amplexicaulibus rigidiusculis integris aut ſemipinnatis, petiolo foliaceo ſerrato, pinnis triangularibus ſerratis. (Sob.) Flor. dan. t. 843.

In ruderatis et hortis oleraceis paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉ Молочай огородный. Russ. Sobol.

493. SONCHUS SIBIRICUS. Pedunculis ſquamatis, foliis lanceolatis indiviſis ſeſſilibus. Flores caerulei. (G.) Kniph. bot. orig. cent. 10. n. 82.

Habitat in ſuperiori regione Nevae fluvii in utraque ejus ripa locis humidis umbroſis, et in plurimis hortis oleraceis atque ad ſepes hortorum inſulae baſileenſis. Floret Iulio, Auguſto. ♃ молочай сибирский. Sobol.

LEONTODON. Receptaculum nudum punctatum. Calyx imbricatus, ſquamis interioribus linearibus linearibus parallelis, exterioribus tandem reflexis. Pappus capillaris ſtipitatus.

494. LEONTODON TARAXACUM. Calyce ſquamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis laevibus. (G.) dan. Flor. t. 574. (Pappus ſtipitatus plumoſis: Taraxacum officinale nonnullorum.) Taraxacum, officin.

Creſcit ubivis in pratis et ad vias. Floret Majo, Iunio. ♃ Хасимъ, попово гуменцо. et одуванчики. Russ. Одуванчикъ аптекарскій. Sob.

495. LEONTODON AUTUMNALE. Caule ramoſo, pedunculis ſquamoſis, foliis lanceolatis dentatis integerrimis glabris, pappo ſubſeſſili. (Fo) liis lanceolato-pinnatifidis: pinnis patentibus linearibus longiſſimis. Variat foliis minus incifis.- (Sob. B.) Flor. dan. t. 501. Apargia autumnalis.

Habitat in pratis agrisque incultis et ad vias ubique. Floret. Iulio, Auguſto. ♃ Одуванчикъ осенній. Sob.

496. LEONTODON HISPIDUM. Calyce toto erecto, folis dentatis integerrimis hiſpidis: ſetis furcatis. (Variat foliis ſinuatis, ſubruncinatis, piloſis ſcabris. Scapus furſum incraſſatus calyx que pilis rigidis hiſpida.) (G.) Flor. dan. t. 862. Apargia hiſpida. Variet. Foliis glaberrimis.

Habitat in pratis ſylvaticis prope fluvium et vicum Strelina, in paſcuis ſuperiorum regionum Nevae fluvii, in monte Duderovo, ad pagum Colodeci, et Oſinova Roſchcza ſatis in magna copia cum ſua varietate. Floret Iunio, Iulio. ♃ Одуванчикъ шершавый. Russ. Sobol.

HIERACIUM. Receptaculum nudum, ut plurimum. Calyx imbricatus, ovatus, ſquamis pluribus ii-

nearibus valde inaequalibus, interdum calyculatus. Pappus ut plurimum ſeſſilis capillaris, rarius ſtipitatus plumoſus ve.

497. HIERACIUM PILOSELLA. Foliis integerrimis ovatis ſubtus tomentoſis, ſtolonibus repentibus, ſcapo unifloro. (Stolonibus piloſis, corolla extus ſubrubella. Variat ſcapo trifloro vel multifloro, foliis tomentoſis ſubtus ſcabris, dentatis et integerrimis.) (G.) Elor. dan. t. 1108. Auricula muris, officin.

Nihil vulgatius hac planta in paſcuis et prâtis ſylvoſis ſiccis, praeſertim in inſulis Nevae fluvii. Floret Majo, Iunio. 2 мышье ушко. Russ. Сокольникъ волосатый. Sob.

498. HIERACIUM DUBIUM. Foliis integris ovato-oblongis, ſtolonibus repentibus, ſcapo nudo multifloro. (Caulis hirtus. Folia hirta, praeſertim ſubtus.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 1044.

Habitat in ſylvis ſiccioribus inſulae apothacariae lapideae et paſſim. Floret Iunio, Iulio. 2 Сокольникъ сумнительный. Russ. Sobol.

499. HIERACIUM AURICULA. Foliis integerrimis lanceolatis, ſtolonibus repentibus ſcapo nudo multifloro. (Amodum variat, caule interdum et foliis hirtis.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 1109.

Habitat in pratis aridis montoſis Pargelovii, in monte Poclonnaja, ad Fabricam pyriam Ochtenſem et paſſim in locis ſimilibus. Floret Iunio, Iulio. 2 Сокольникъ ушковатый. Russ. Sob.

500. HIERACIUM CYMOSUM. Foliis lanceolatis integris piloſis, ſcapo ſubnudo baſi piloſo, flori-

bus ſubumbellatis. (Caules ſtriati, calyces incani hirſuti. Lacteſcit.) (Sob. B.) (Habitus procerus. Scapus bipedalis deorſum villoſus. Folia radicalia plura obſolete dentata baſi villoſa.) Flor. dan. t. 810.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, aliisque in locis elevatis ſiccis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Сокольникъ верхоцвѣтный. Russ. Sob.

501. HIERACIUM PRAEMORSUM. Foliis ovatis ſubdentatis, ſcapo ramoſo, floribus ſuperioribus prioribus- (G.) Gmelin. flor. ſib. 2. t. 13. f. 2. Flor. dan. t. 942.

Habitat in pratis juxta viam Peterhovianam, et circa Ligovo, Goreloy cabac atque Pargelovii. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Сокольникъ коротькокорній. Russ. Sobol.

502. HIERACIUM AURANTIACUM. Foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. (Floribus aurantiacis amplis, odore violarum, calycibus pilis atris; foliis pilis rigidulis incanis.) (R.) Iacq. fl. auſtr. v. 5. t. 410.

Habitat in montoſis ſylvaticis circa Petropolim parcius. Floret Iunio, Iulio. ♃ Сокольникъ помаранцовый. Russ. Sobol.

503. HIERACIUM MURORUM. Caule ramoſo, foliis radicalibus ovatis dentatis petiolatis; caulinis minoribus. (G.) Blackw. herb. t. 538.

Habitat paſſim in ſylvis ſiccioribus montoſis. Floret Iulio. ♃ Сокольникъ сѣрнный. Russ. Sob.

504. HIERACIUM PALUDOSUM. Caule paniculato, foliis amplexicaulibus dentatis glabris, ca-

lycibus hiſpidis, (pilis nigris, floribus parvis) (G.) Flor. dan. t. 928.

Habitat in pratis humidis ſylvoſis inſulae apothecariae, lapideae, Caterinhoffii, et paſſim. Floret Iunio, Iulio. 2 Сокольникъ болотный. Russ. Sobol.

505. HIERACIUM SABAUDUM. Caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis ſemiamplexicaulibus. (Caulis ſulcatus ſcaber. Rami axillares folioſi multiflori. Folia ovato-lanceolata, ſinuata. Flores corymboſi.) (B.) Flor. dan. t. 872.

Habitat in pratis ſylvoſis ſiccis circa Petropolim. Floret Iulio. 2 Сокольникъ савойскій. Russ. Sobol.

506. HIERACIUM UMBELLATUM. Foliis linearibus ſubdentatis ſparſis, floribus ſubumbellatis. (Calyx ſquarroſus. Caulis laeviſſimus. Folia floralia ſub umbella ſpuria quatuor inaequalia. Flos centralis ſtrictus ceteris major.) (G.) Flor. dan. t. 680.

Habitat in ſylvis ſuperiorum regionum Nevae fluvii, ad Fabricum pyriam Ochtenſem, et ad viam Sarſcoſelienſem nec non Pargelovii frequens eſt. Floret Iulio. 2 Сокольникъ щитоцвѣтный. Russ. Sobol.

CREPIS. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, exterior deciduus. Pappus capillaris ſtipitatus, (plumoſus, Gmel. S. N.)

507. CREPIS TECTORUM. Foliis lanceolato-runcinatis ſeſſilibus laevibus, inferioribus dentatis.

(Caule laevi. Folia interdum ſcabra; ſquamae calycis apice ſphacelatae duodecim aut tridecim; caulis ut plurimum ſulcatus.) (G.) Flor. dan. t. 501.

Habitat in monte Duderovo, et circa Craſnoje ſelo, atque in aridis ad pagum Murina. Floret Iulio. ☉ Скрипуха кровельная. Russ. Sob.

508. CREPIS BIENNIS. Foliis runcinato pinnatifidis ſcabris: baſi ſuperne dentatis, calycibus muricatis. (Caulis tripedalis, ſubramoſus hinc inde ſcaber. Folia ſubtus piloſa. Calyx pilis glanduliferis nigreſcentibus obtectus: ſquamulae patulae glabrae.) (G.) Bauh. hiſt. pl. 2. p. 10. 25. ic. Variat foliis omnibus fere integris; vel ſuperioribus integris, inferioribus pinnatifidis et dentatis. (G.)

Ad vias et in agris incultis freqnens eſt. Floret. Iulio. ♂ Скрипуха двулѣтняя. Russ. Sob.

HYPOCHAERIS. Receptaculum paleaceum. Calyx ſubimbricatus, baſi ventricoſus. Pappus plumoſus ſtipitatus.

509. HYPOCHAERIS MACULATA. Caule ſubnudo: ramo ſolitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis, (flore magno: hirſutie incana, ſemina rugoſa, foliis maculis rubris.) (G.) Fl. dan. t. 149.

Habitat in pratis elatioribus ſylvoſis ad fluvium Strelnaja, in montoſis Duderovi, Craſnoſelii et ad viam Wiburgenſem, Pargelovii, aliisque in locis ſimilibus. Floret Iunio. ♃ Ястребная трава. Russ. Ястребка пятнистая. Sobol.

510. HYPOCHAERIS RADICATA. Caule ramoſo nudo laevi, foliis runcinatis optuſis ſcabris, pedunculis ſquamoſis. (Calycum ſquamulae carina ciliata, ſpinuloſae, pappus ſetis triginta.) (G.) Flor. dan. t. 150.

Habitat in pratis et ſylvis, circa Caterinhoffium in monte Poclonnaja et ad viam Peterhoffianam. Floret Iunio, Iulio. 2 Ястребка коренастая. Russ. Sob.

LAPSANA. Receptaculum nudum. Calyx calyculatus, ovatus, angulatus, ſquamis tubi octo linearibus, cavo-canalicalatis, carinatis, baſeos ſex, alternis minimis. Pappus nullus.

511. LAPSANA COMMUNIS. Calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis. (Foliis pinnatifidis, ſegmento ultimo ovato ſinuato dentato, inferioribus lyratis planis; floſculis octodecim ant viginti duobus.) (G.) Flor. dan. t. 500.

Habitat in cultis et ad rudera domorum frequens. Floret Iunio, Iulio. ⊙ Бородавочная трава. Russ. Бородавчица обыкновенная. Sob.

CICHORIUM. Receptaculum ſubpaleaceum. Calyx calyculatis, iterior ſquamis octo, exterior quinque. Pappus ſubquinquedentatus obſolete piloſus.

512. CICHORIUM INTYBUS. Floribus geminis ſeſſilibus, foliis runcinatis, (ſquamis calycinis octo longioribus, quinque brevioribus, floribus caeruleis.) (G.) Flor. dan. t. 907. Cichorium, officin.

Habitat ad margines agrorum circa Ribacziam, et in ſuperiori regione Nevae fluvii, in prato vero juxta hortum Palatii imperialis aeſtivi omnes plantae nunc deſtructae ſunt. Floret. Iunio, Iulio. 24 Цихорій дикій. Russ.

ARCTIUM. Calyx globoſus, ſquamis apice hamis inflexis.

513. ARCTIUM LAPPA. Filiis cordatis inermibus petiolatis, capitulis tomentoſis. (G.) Flor. dan. t. 642. Bardana, officin. Variet. β Arctium glabrum, foliis cordatis inermibus, calycibus glabris primo conicis, demum haemiſphaericis. (Sob.) Schkuhr Handb. 49. t. 227.

Habitat α, in locis cultis et ruderatis ubique. Var. β in meridionali regione Nevae fluvii, prope vicum Uljankam, et ad ſepes hortorum. Sob. Floret Iulio, Auguſto. ♂ Лопушникъ ſive Репейникъ. Russ.

SERRATULA. Calyx ſubcylindricus, imbricatus, muticus; ſquamis lanceolatis acutis.

514. SERRATULA TINCTORIA. Foliis lyratopinnatifidis; pinna terminali maxima, floſculis conformibus. (Folia ciliata; calycis ſquamae margine albidae.) Variat foliis integris. (Sob. R.) Flor. dan. t. 281.

Habitat in pratis ſylvoſis circa pagum Ochtam et prope ejus Eccleſiam, atque in viciniis Sarſkoſelii et montis Pulcovi. Floret Iulio, Auguſto. 24 Серпуха. Russ. Серпуха красильная. Sob.

515. SERRATULA. ARVENSIS. Foliis dentatis ſpinoſis, (lanceolatis; floribus purpuraſcentibus.

Variat foliis glabriuſculis, ſubtus albido-tomentoſis.) (G.) Flor. dan. t. 644.

Habitat in ſylvis ad ripas Nevae fluvii et inter ſegetes Pargelovii, prope Ligovo et Creſnoy cabac et paſſim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Серпуха полевая. Russ. Sobol.

CARDUUS. Calyx ventricoſus, imbricatus, ſquamis numeroſis ſpinoſis. Receptaculum piloſum. Pappus ſeſſilis piloſus.

516. CARDUUS LANCEOLATUS. Foliis decurrentibus pinnatifidis hiſpidis: laciniis divaricatis, lanceolatis calycibus ovatis ſpinoſis villoſis, caule piloſo. (Flore purpureo.) (G.) Tabern. Kraeuterb. p. 699. ic.

Habitat ad ſepes et ad ductus aquarum ubique. Floret Iulio, Auguſto. ♂ Колючка копьелистая. Russ. Sob.

517. CARDUUS CRISPUS. Foliis decurrentibus ſinuatis margine ſpinoſis, floribus aggregatis terminalibus; ſquamis calycis inermibus ſubariſtatis patulis. (Caulis ramoſiſſimus divaricatus, flores nutantes.) (G.) Flor. dan. t. 621.

Ad ſepes hortorum et ad vias paſſim. Floret Iunio, Iulio. ☉. Колючка кудрявая. Russ. Sob.

518. CARDUUS PALUSTRIS. foliis decurrentibus dentatis margine ſpinoſis, floribus racemoſis erectis, pedunculis inermibus. (Folia linearia ſpinoſiſſima, caule alto ut plurimum ſimplici criſpo, floribus conglomeratis ſubverticillatis terminalibus rubris, calycis ſquamis viſcoſis rubentibus.) (G.) Moriss. hiſt. pl. 3. t. 32. 13.

Habitat in ſylvis paludoſis circa Murinam, Strelinam, Caterinhoffii, et in multis aliis locis ſimilibus. Floret Iulio. ♃ Колючка болотная Russ. Sob.

519. CARDUUS HETEROPHYLLUS. Foliis amplexicaulibus lanceolatis ciliatis integris laciniatisque, caule ſubunifloro, calyce inermi, (foliis inaequaliter ſpinuloſo-ciliatis, ſubtus niveis totomentoſis, caule ſub trifloro. Caulis niveo obductus tomento.) (G.) Flor. dan. t. 109.

In ripa fluvii Nevae circa Caterinhoffium, in inſulis lapidea rotundaque et ubique in pratis humidis ſylvoſis frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ колючка разнолистая. Russ. Sob.

520. CARDUUS TATARICUS. Foliis amplexicaulibus lanceolatis: ſerraturis ſpinoſo-ſetaceis, floribus triphyllis. (Flores odorati albidi antheris principio purpureis, dein fuſcis. Calyces externe villis arachnoideis.) (Sob.) Iacq. flor. auſtr. s. t. 90.

Habitat in monte Pulcovo, tum in ſylvis humidis inter Sarſcoje ſelo, Gatczinam, et Montem Duderovium. Floret Iunio, Iulio. ♃ колючка татарская. Russ. Sob.

CNICUS. Calyx ovatus, imbricatus, ſquamis ramoſo-ſpinoſis, (ſaepe) obvallatus bracteis. Corollulae aequales. Receptaculum planum villoſum, pappo ſeſſili plumoſo.

521. CNICUS OLERACEUS. Foliis amplexicaulibus pinnatifidis glabris, bracteis concavis integris ſubcoloratis. (Flores ochroleuci, calycibus

inermibus, inter folia flavicantia.) (G.) Flor. dan. tab. 860.

Creſcit in ſylvis ſubhumidis et in hortis oleraceis paſſim. Floret Iulio, Auguſto. 2 Осотъ, ſive осетъ. Russ. Осотъ кухонный Sob.

CARLINA. Calyx radiatus imbricatus, ſquamis marginalibus longis coloratis. Receptaculum paleis ternis fiſſis.

522. CARLINA VULGARIS. Caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus, calycum radio albo. (Caule folioſo.) (G.)

Habitat in locis ſiccioribus elevatis paſſim, praeſertim circa montem Duderovium, et Craſnoje Selo. Floret Iulio, Auguſto. ♂ Пуховникъ Russ. Пуховникъ обыкновенный. Sob.

BIDENS. Receptaculum paleaceum, paleis deciduis. Pappus ariſtis duabus pluribus ve duabus majoribus erectis ſcabris. Calyx imbricatus. Corolla rarius floſculo uno altero ve radiante inſtructa.

523. BIDENS TRIPARTITA. Foliis trifidis, calycibus ſubfolioſis, ſeminibus erectis. (Foliis trilobatis et quinque lobatis ſerratis.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. B. 1. f. 2.

In paludibus inſulae apothecariae et paſſim ad ductus aquarum circa vias frequentiſſima planta eſt. Floret Iunio, Iulio. ☉ двузубецъ. Russ. двузубецъ трилистный. Sob.

524. BIDENS MINIMA. Foliis lanceolatis integerrimis ſeſſilibus, flore recto ſolitario baſi involucrato bracteis duabus, radice repente. (Radix repens, filiformis articulata. Folia plerumque ci

liata hinc inde ſubdentata. Flos erectus baſi tantum bracteis duabus, rariſſime tribus ſuffultus.) (B.) Flor. dan. t. 312.

Habitat in locis uliginoſis circa urbem Jamburgum. Floret Iunio, Iulio. ☉ Двузубецъ малѣйшій. Russ. Sob.

525. BIDENS CERNUA. Foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis, ſeminibus erectis. (Flore luteo, radicibns nudis.) (G. Flor. dan. t. 841.

Habitat in paludibus circa Ceterinhoffium ad ripas Nevae fluvii et in inſulis apothecaria lapidea et Baſileenſii alibique ſed in minori quantitate quam B. tripartita. Floret Iunio, Iulio. ☉ Двузубецъ кривоцвѣтный. Russ. Sob.

EUPATORIUM. Receptaculum nudum. Pappus plumoſus. Calyx inbricatus oblongus, ſquamis linearibus. Stylus ad ſtamina usque bifidus longiſſimus.

526. EUPATORIUM CANNABINUM. Calycibus quinquefloris, foliis digitatis, (Squamae calycinae oris rubellis.) (G.) Flor. dan. t. 745. Eupatorium, officin.

In inſula Narovae fluvii, quae ſupra cataractas freques eſt, alias nullibi viſa. Floret Iulio. ☉ конопельникъ, ſive посконникъ Russ. Благородникъ конопельный. Sob.

POLYGAMIA SUPEPERFLUA.

TANACETUM. Receptaculum nudum. Pappus nullus, vel membranaceus ſubmarginatus. Calyx

imbricatus haemiſphaericus. Corollae radii obſoletae, trifidae, lineari ligulatae, interdum nullae.

527. TANACETUN VULGARE. Foliis bipinnatis inciſo ſerratis. (Radius calidiore aeſtate prodit.) (G.) Flor. dan. t. 871. Tanacetum, officin.

Habitat in ſylvis montoſis, ad fabricam pyriam Ochtenſem, Pargelovii, in monte Pulcovo, in inſulis apothecaria, lapidea, petri, Baſileenſi et paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Дикая рябинка, ſive пижма. Russ. Пижма обыкновенная. Sob.

Variet. β Tanacetum vulgare foliis criſpis.

Creſcit in quantitate Petropoli in hortis cultis, oleraceis, et in ſylvis circa Strelinam. Floret eodem tempore. ♃ Пижма кудрявая. Russ. Sob.

ARTEMISIA. Receptaculum ſubvilloſum vel nudiuſculum. Pappus nullus. Calyx imbricatus: ſquamis rotundatis conniventibus. Corollae radii nullae.

528. ARTEMISIA CAMPESTRIS. Foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis. (Floſculi racemoſi alterni, ſolitarii, ultra quadraginta in calyce.) (G.)

Habitat in pratis ficcioribus, in monte Poclonnaja, Pulcovo, circa fabricam pyriam Ochtenſem, et paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Чернобыльникъ полевый. Russ. Sob.

Variet. β Artemiſ. Camp. Caule foliisque atro rubris. (Sob.) Creſcit ad viam Pargelovienſem in

tis ficcioribus. Floret Iulio, Auguſto. 24 Черно-быльникъ полевый темнокрасный. Sob.

529. ARTEMISIA ABSINTHIUM. Foliis compoſitis multifidis, floribus ſubglobofis pendulis, receptaculo villoſo.) (G.) Knorr. del. hort. 2. t. A. 17. Abſinthium, officin.

Habitat circa pagos montis Duderovii et Craſnofelium, et circa urbem Staraja Ladoga frequens. Floret Iulio, Auguſto. 24 Полынь, ſive Глистникъ. Russ.

530. ARTEMISIA VULGARIS. Foliis pinnatifidis planis inciſis, ſubtus tomentoſis, racemis ſimplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. (Floribus rubellis, duodecim in calyce.) (G.) Blackw. herb. t. 431. Artemiſia, officin. (Variat caule ſuſco purpureo.) Sob.

Habitat in ruderatis et cultis, circa ſepes hortorum et in hortis oleraceis ubique frequentiſſima planta eſt. Floret Iulio, Auguſto. 24 Чернобыльникъ, Russ. Чернобыльникъ обыкновенный. Sob.

GNAPHALIUM. Receptaculum nudum. Pappus plumoſus vel capillaris. Calyx rotundatus imbricatus: ſquamis marginalibus rotundatis, ſcarioſis, coloratis.

531. GNAPHALIUM DIOICUM. Sarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici, floribus dioicis. (Foeminae calycibus rubellis. Variat folio longiore incano, flore albo ſvave-rubente purpureove. Pappi radii plurimi baſi ſetacei, apice penicillato-plumoſi.) (G.)

Gaertn. de fruct. 2. p. 410. t. 167. f. 3. Gnaphalium, officin.

Habitat in inſulis apothecaria, lapidea, et ubique in pratis ficcioribus. Floret Majo, Iunio. ♃ Кошечья лапа, ſive Змѣевикъ. Russ. Змѣевикъ двудомный. Sob.

532. GNAPHALIUM ALPINUM. Sarmentis procumbentibus, caule ſimpliciſſimo, capitulo aphyllo, floribus oblongis, (denſe ſpicatis; foliis linearibus, villoſulis.) (G.) Flor. dan. t. 332.

Habitat in montoſis circa Novogrodium. Floret Iulio. ♃ Змѣевикъ горный. Russ. Sob.

533. GNAPHALIUM SYLVATICUM. Caule ſimpliciſſimo erecto, floribus ſparſis. (Pedunculis axillaribus multifloris, foliis lanceolato-linearibus ſemiamplexicaulibus.) (G.) Flor. dan. t. 254.

Habitat in ſylvis, circa cemeterium ſti. Iohannis, in inſulis apothecaria, lapidea et paſſim ad ductus aquarum. Floret Iulio. ♂ Змѣевикъ лѣсный. Russ. Sob.

534. GNAPHALIUM ULIGINOSUM. Caule ramoſo diffuſo, floribus confertis terminalibus. (Calycibus fuſco ſpadiceis, aridis, laxis.) (G.) Flor. dan. t. 859.

Habitat in locit uliginoſis humidis apricis, et paſſim in hortis oleraceis. Floret Iunio, Iulio. ☉ Змѣевикъ болотный. Russ. Sob.

CONYZA. Receptaculum nudum, planum. Pappus capillaris. Calyx imbricatus ſubrotundus, ſquamis exterioribus patentiuſculis. Corollae radii trifidae.

535. CONYZA SQUARROSA. Foliis lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboſo, calycibus ſquarroſis. (Folia fere verbaſci.) (vid. deſcript. Gubern. Petropol. Georgi.) Flor. dan. t. 622.

Habitat in pratis ſiccis gramineis circa Petropolim rarius. Floret Iunio, Iulio. ♂ Богатница. Russ. Богатница чешуйчатая. Sobol.

ERIGERON. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Calyx oblongus ſquamis ſubulatis. Corollae radii lineares anguſtiſſimae.

536. ERIGERON CANADENSE. Foliis lanceolatis ciliatis, caule floribusque paniculatis hirtis. (R.) Hoffmann bot. Taſchenb. 1791. t. 12.

Habitat circa Petropolim in agris cultis, rarius. Floret Iunio. Iulio. ☉ Блошница канадійская. Russ. Sob.

537. ERIGERON ACRE. Pedunculis alternis unifloris. (Flore caeruleo.) (G.) Iungh. pl. officin. ic. t. 12. Erigeron, officin.

Habitat in pratis ſiccis ſylvoſis et montoſis, in inſulis apothecaria, lapidea, in monte Poclonnaja, et paſſim in locis ſimilibus. Floret Iunio. ♃ Блошница ѣдкая. Russ. Sob.

TUSSILAGO. Receptahulum nudum. Pappus capillaris. Calyx ſquamis quindecim aut viginti aequalibus, diſcum aequantibus, ſubmembranaceis.

538. TUSSILAGO FARFARA. Scapo unifloro imbricato, foliis ſubcordatis angulatis denticulatis. (G.) Flor. dan. t. 595. Farfara, offlcin.

Habitat in locis editioribus argillofis humidis in utraque ripa Nevae fluvii circa Ochtam, et Fabricam Porcellaneam, in monte Pulcovo, et Strelina et paffim. Floret Aprili, Majo. ♃ Бѣлокопытникъ, five мать да мачиха. Russ.

539. TUSSILAGO PETASITES. Thyrfo ovato, floſculis faemineis nudis paucis. (Floſculi faeminei inter hermaphroditos duo five tres, vix petaloidei, ligulati, albi. Piſtillis exſertis clavatis.) (G.) Flor. dan. t. 842. Petaſites, officin.

Habitat ad fluvium Lugam infra pagum Howskaja. Floret Aprili, Majo. ♃ Подбѣлъ, five Чумный корень. Russ.

SENECIO. Receptaculum nudum. Pappus capillaris longus. Calyx conicus, calyculatus, ſquamis parallelis apice ſphacelatis, paucioribus baſin imbricatim tegentibus.

540. SENECIO VULGARIS. Corollis nudis foliis pinnato-ſinuatis amplexicaulibus, floribus ſparſis. (Squamae omnes ſphacelatae, calycis laciniae vero non omnes. Folia plana glabra.) (G.) Flor. dan. t. 515. Senecio, officin.

Creſcit ubique in cultis et ruderatis. Floret a Majo, ad Octobrem. ☉ Старина обыкновенная. Russ. Sob.

541. SENECIO IACOBAEA. Corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto. (Flores lutei.) (G.) Flor. dan. t. 945.

Habitat ad ductum agrarum Ladogenſem et in declivibus et pratis humidis ſylvoſis Oſinovae

Roſchczae, et Dranicinae. Floret Iunio, Iulio. 2 Старина яковля. Russ. Sob.

542. SENECIO PALUDOSUS. Corollis radiantibus, foliis enſiformibus acute ſerratis ſubtus villoſis, caule ſtricto. (Foliis viſcidulis ſemiamplexicaulibus floribus luteis.) (G.) Flor. dan. t. 385.

Habitat ad ductum aquarum Ladogenſem in paludoſis. Floret Iunio, Iulio. 2 Старина болотная. Russ. Sob.

543. SENECIO SARRACENICUS. Corollis radiantibus, foliis lanceolatis ſerratis glabriuſculis, floribus corymboſis. (Foliis anguſte confertis, corollulis luteis ſubfoetentibus, radii floſculis octo. Radix amaricans, longiſſima, late reptans fibras numeroſas emittens, hinc caules plures angulati glabri veſtiti foliis anguſtis confertis. Corymbus foliis ſuperioribus vix altior: ramis plerumque villoſis.) (G.) Iacq. Flor. auſt. 2. t. 186.

Habitat circa Oſtium Narovae fluvii in ſalicto. Floret Iulio, Auguſto 2 Старина сарацинская. Russ. Sob.

SOLIDAGO. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Corollae radii circiter quinque, remotae. Calyx ſquamis imbricatis anguſtis conniventibus.

544. SOLIDAGO VIRGA UREA. Calyce erecto tereti pubeſcente ſuperne ramoſo, racemis erectis foliis inferioribus ellipticis ſerratis. (Floſculi in radiis quinque aut decem.) (G.) Flor. dan. t. 663. Virga aurea. officin.

Creſcit in ſylvis et paſcuis paſſim. Floret Iulio. 2 Золотушникъ, ſive Золотая розга, Russ.

CINERARIA. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Calyx ſimplex polyphyllus, foliolis aequalibus.

545. CINERARIA SIBIRICA. Racemo ſimplici, foliis cordatis obtuſis denticulatis laevibus, caule ſimpliciſſimo monophyllo. (Bracteae duae, emarceſcentes.) (Sob. B.) Amman. ruth. t. 24.

Habitat circa urbem Gatczinam et in monte Duderovo. Floret Iulio. ♃ Пепельникъ сибирскій. Russ. Sob.

546. CINERARIA GLAUCA. Racemo ſimplici, foliis ſpathulato-cordatis integerrimis, caule ſimpliciſſimo. (Folia colore crambes maritimae, ſubcarnoſa, glauca, petiolis marginato-ſpathulatis.) (Sob. R.) Gmelin. Flor. ſib. t. 74.

Habitat in monte Duderovo et circa pagum colodeci in ſylvis montoſis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Пепельникъ сизый. Russ. Sob.

INULA. Receptaculum nudum. Pappus capillaris. Antherae baſi in ſetas duas deſinentes.

547. INULA HELENIUM. Foliis amplexicaulibus ovatis rugoſis ſubtus tomentoſis, calycum ſquamis ovatis. (G.) Flor. dan. t. 728. Enula, officin.

Habitat ubique in hortis et ad ſaepes hortorum ſpontanea. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Девясилъ, Russ. ſive девясилъ большій.

548. INULA DYSENTERICA. Foliis amplexicaulibus cordato-oblongis, caule villoſo paniculato,

calycis ſquamis ſetaceis, (floribus ſubcorymboſis.) (G.) Flor. dan. t. 410.

Habitat ad foſſas et canales inſularum baſileenſis, et lapideae, nec non ad vias prore Noſocomium pedeſtre, et in aliis locis humidis. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Девясилъ меншій. Russ.

549. INULA SALICINA. Foliis lanceolatis recurvis ſerrato-ſcabris, ramis angulatis, floribus inferioribus altioribus, (ſquamarum calycinarum ordine inferiori rufeſcente erecto, foliis villoſis.) (G.) Flor. dan. t. 786.

Habitat in pratis ſiccioribus herboſis et ſylvoſis in monte Duderovo, et circa Gatczinam. Floret Iulio. ♃ Девясилъ верболистый. Russ. Sob.

CHRYSANTHEMUM. Receptaculum nudum convexum, punctatum. Pappus marginatus, vel nullus. Calyx hemiſphaericus imbricatus: ſquamis marginalibus membranaceis, intimis terminatis ſquama ſcarioſa. Semina coronata.

550. CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. Foliis amplexicaulibus oblongis ſuperne ſerratis inferne dentatis. (Germina floſculorum decagona, ſtylis croceis.) (G.) Blackw. herb. t. 42.

In pratis ſiccioribus frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Ивановъ цвѣтъ. Russ.

551. CHRYSANTHEMUM INODORUM. Foliis pinnatis multifidis, caule ramoſo diffuſo. (Semina quadrangularia marginata, latere tranſverſim ſulcata. Pedunculi nudi apice inprimis ſulcati. Petioli deorſum latiuſculi. Receptaculo conico to-

to nudo et ſquamis margine nigricantibus, nec non odoris defectu ab Anthemide arvenſi et Cotula etc, facile dignoſcitur.) (R. B.) Flor. dan. t. 896.

Habitat in ſylvis montoſis circa Petropolim rarius. Floret Iulio. ☉ Ивановъ цвѣтъ бездушный. Russ. Sob.

552. CHRYSANTHEMUM SEGETUM. Foliis amplexicaulibus: ſuperne laciniatis, inferne dentato-ſerratis. (Sob. R. B.) Flor. dan. t. 995.

Habitat inter ſegetes et ad margines agrorum. circa Ligovo et Craſnoje ſelo. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ивановъ цвѣтъ нивяный, ſive полевый. Russ. Sob.

MATRICARIA. Receptaculum nudum, convexum. Pappus nullus. Calyx haemiſphaericus imbricatus: ſquamis marginalibus ſolidis, acutiuſculis, non ſcarioſis.

554. MATRICARIA PARTHENIUM. Foliis compoſitis planis: foliolis ovatis inciſis, pedunculis ramoſis. (Sob. B.) Flor. dan. t. 674. Matricaria officin.

Habitat circa Petropolim et in ipſa urbe ad ſepes hortorum et in hortis oleraceis, atque in ruderatis. Floret Iunio, Iulio. ♂ Маточная трава. Russ. Маточница. Sob.

554. MATRICARIA CHAMOMILLA. Receptaculis conicis, radiis patentibus, ſquamis calycis margine aequalibus. (Tota glaberrima dilute viridis. Foliis pinnatis, pinnis capillaribus multifidis. Calyx margine ſcarioſus, floſculis viginti aut vigintiduobus. Receptaculum acute conicum. Semina ſtriata.) (G.) Zorn pl. officin. ic. 139. Chamomilla vulgaris, officin.

Ad ductus aquarum in locis arenoſis, et agris deſertis, nec non inter ſegetes circa Ribacziam, et Ligovo, atque in hortis oleraceis et ruderatis in urbe Petropoli frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ☉ Ромашка простая. Russ.

ANTHEMIS. Receptaculum paleaceum, conicum. Pappus nullus. Calyx haemiſphaericus, ſubaequalis. Floſculi radii plures quam quinque.

555. ANTHEMIS ARVENSIS. Receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus coronato-marginatis. (Foliis duplicato-pinnatis, caule ſtriato, radio diſcolore ſive albo.) (Sob. B.) Kniph. bot. orig. cent. 11. n. 5.

Habitat in pratis ſiccis argilloſis et inter ſegetes circa Ligovo, Goreloy cabac, et Oſinova Roſchcza. Floret Iulio, Auguſto. ♂ Пупавка полевая. Russ. Sob.

556. ANTHEMIS COTULA. Receptaculis conicis: paleis ſetaceis, ſeminibus nudis. (Foliis duplicato-pinnatis glabris pinnulis linearibus, nervo foliaceo: caulibus diffuſis, radio albo; Semine laevi. Odore foetido.) (Sob.) Blackw. herb t. 67. Cotula foetida, officin.

Creſcit in regionis petropolitanae hortis oleraceis, et ubique ad pagos et vias in locis ruderatis et inter ſegetes. Floret Iunio, Iulio. ☉ Собачья ромашка. Russ. Пупавка вонючая. Sob.

557. ANTHEMIS PYRETHRUM. Caulibus ſimplicibus, foliis pinnato-multifidis. (Radio albo; foliis glabris, imis petiolatis palmatis, ad caulem ſemipinnatis. Facies matricariae, ſed flos ſpecio-

ſior, diſco luteo, radiis albis nervoſis, plerumque bidentatis.) (G.) Mill. hort. angl. t. 38. Pyrethrum, officin.

Habitat ad fluvium Wolchow, in pratis circa pagum Czortovo. Floret Iunio, Iulio. ♃ Огневица ſive Пупавка огневая. Russ. Sob.

558. ANTHEMIS TINCTORIA. Radio flavo, concolore, foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo. (Foliorum laciniis linearibus, floribus pedunculatis, luteis.) G.) Flor. dan. t. 741.

Habitat in montoſis aſperis ſylvaticis et agris, circa pagum Oſtrowki, ad vias Ligovi, Craſnoſelii et in monte Duderovo, nec non Pargelovii, aliisque in locis ſimilibus. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Пупавка красильная. Russ. Sob.

ACHILLEA. Receptaculum paleaceum, elevatum. Pappus nullus. Calyx ovatus imbricatus, ſquamis conniventibus ovatis. Floſculi radii quinque aut decem.

559. ACHILLEA PTARMICA. Foliis lineari-lanceolatis amplexicaulibus ſerrulatis. (Flore albo.) (G.) Flor. dan. t. 643. Ptarmica, officin.

In ſylvis et ad margines agrorum nuſquam hoſpes eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Чихотная трава. Russ.

560. ACHILLEA MILLEFOLIUM. Foliis bipinnatis nudis, pinnarum laciniis linearibus dentatis, caulibus ſuperne ſulcatis. (Variat flore albo et rubro.) (G.) Flor. dan. t. 737. Millefolium, officin.

In locis ficcioribus et ad vias paſſim occurrit. Floret Iunio, Iulio. 2| Гулявица, ſive деревей. Russ. Variet. β flore rubro, in montoſis Pargelovii, et Oſinovae Roſchczae, Peterhovii et in Oranienbaum, atque Strelina copioſe provenit. (Sob.)

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

COREOPSIS. Geceptaculum paleacem. Semina cincta margine membranaceo, apice bicorni aut quadricorni. Calyx erectus polyphyllus; exterior foliolis ſaepe octo (floribus totidem) in orbem poſitis, interior totidem majoribus membranaceis coloratis.

561. COREOPSIS BIDENS. Foliis lanceolatis ſerratis oppoſitis amplexicaulibus, pappo bicorni. (R.) Moris. hiſt. 3. t. 5. 25.

Creſcit ad foſſas et ductus aquarum ctrca Petropolim. Floret Iulio, Auguſto. ⊙ Клоповница двузубая. Russ. Sob.

CENTAUREA. Receptaculum ſetoſum. Pappus plumoſus vel capillaris. Corollae radii infundibuliformes longiores, irregulares.

562. CENTAUREA PHRYGIA. Calycibus recurvato plumoſis, foliis indiviſis oblongis ſcabris. (Caulis ſulcatus multiflorus. Folia lanceolata ſubſerrata. Ciliis calycis longis reflexis fuſcis.) (G.) Flor dan. t. 520.

Habitat in pratis circa Caterinhoffium et paſſim in ſylvis montoſis. Floret Iunio, Iulio. 2| Чер-

тополохъ, ſive Лоскутный цвѣтъ. Ruſs. Лоскутница пѣристая. Sob.

563. CENTAUREA CYANUS. Calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis. (Corollis radiantibus horizontalibus novem.) (G.) Flor. dan. t. 993. Cyanus, officin.

Eſt vulgetiſſima inter ſegetes. Floret Iunio, Iulio. ☉ Василекъ. Ruſs.

564. CENTUAREA SCABIOSA. Calycibus ciliatis, foliis pinnatifidis, laciniis lanceolatis. (Caulis et folia ſcabra. Ramo terminari flore perpetuo breviore. Variat: foliorum pinnis lanceolatis et linearibus.) (G.) Sowerby engl. bot. t. 56.

Habitat in monte Pulcovo. circa Strelinam, in monte Poclonnaja et Murinae, aliisque in locis montoſis et ſylvoſis. Floret Iunio, Iulio. ♃ Лоскутница свербѣжнолиſтая. Ruſs. Sob.

565. CENTAUREA JACEA. Calycibus ſcarioſis laceris, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. (Squamis calycinis lamina fuſca. Variat foliis radicalibus integris et pinnatifidis.) (G.) Flor. dan. t. 519.

Habitat in ſylvis et pratis paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Лоскутница шелушчатая. Ruſs. Sob.

POLYGAMIA NECESSARIA.

FILAGO. Receptaculum nudum, paleis ad latera calycis floſculos diſtinguentibus. Pappus nullus, vel brevis ſimplex. Calyx imbricatus. Floſculi foeminei partim apetali inter ſquamas calycis locati.

566. FILAGO MONTANA. Caule ſubdichotomo erecto, floribus conicis terminalibus axillaribusque. (Sob.) Lob. ic. 481.

In monticulis arenoſis et ſylvoſis Pargelovii ſatis raro occurrit. Floret Iunio, Iulio. ☉ Жабная трава, ſive Горлянка. Russ. Горлянка горная. Sob.

567. FILAGO ARVENSIS. Caule paniculato, floribus Conicis lateralibus. (Foliis molliſſimis tomentoſis, florum acervis ſeſſilibus in ſpicas continuatis.) (Sob. R.)

Habitat in arvis montoſis Ligovi, Craſnoſelii, et ad pagum Rjabowa, rarius. Floret Iunio, Iulio. ☉ Горлянка полевая. Russ. Sob.

MONOGAMIA.

LOBELIA. Calyx quinquefidus. Corolla monopetala, irregularis. Tubus calyce longior ſuperne diviſus. Limbus quinquepartitus. Capſula infera, bi-ſive trilocularis, bi-ſive trivalvis.

568. LOBELIA DORTMANNA. Foliis linearibus bilocularibus integerrimis, caule ſubnudo. (L.) Flor. dan. t. 39.

Habitat ad littus inſulae Crucis et paſſim in aqua ad ripas minorum ramorum Nevae fluvii. Floret Iulio. ♃ Лобелія дортманская. Russ. Sob.

VIOLA. Calyx pentaphyllus, ſupra baſin corollae adhaerens. Corolla pentapetala, irregularis, poſtice cornuta. Stamina lamina germen tegentia, antheris apice cohaerentibus. Capſula trivalvis unilocularis.

569. VIOLA HIRTA. Foliis cordatis piloſo-hiſpidis. (Flores dilute violacei albidique, petalo inferiore emarginato.) (G.) Flor. dan. t. 618.

Habitat in montoſis et umbroſis Duderhovii. Floret Majo. ♃ Фіялка. Russ. Віолетка мохнатая. Sob.

570. VIOLA PALUSTRIS. Foliis reniformibus, Crenulatis, longe petiolatis, ſcapo medio ſquamis duabus ſeſſilibus, petalis duobus ſuperioribus dilute caeruleis decurrentibus in unguem, lateralibus tranſverſe villoſulis albidis, infimo maximo integro.) (G.) Flor. dan. t. 83.

In pratis humidis ſylvoſis inſularum baſileenſis, apothecariae, et lapideae alibique copioſe provenit. Floret Majo. ♃ Віолетка болотная. Russ. Sob.

571. VIOLA ODORATA. Foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus. (G.) Flor. dan. t. 309. Viola martia, odorata, officin.

Habitat in montoſis et umbroſis Duderovii, et in ejus viciniis. Floret Majo. ♃ Віолетка пахущая. Russ. Sob.

572. VIOLA CANINA. Caule adultiore aſcendente, foliis oblongo cordatis, floribus caulinis apetalis. (Stigma aſcendens; ligulae nectarii lineares, inodora, deflorata odorata. Calcar longius, ſulco exaratum.) (G.) Curtis Flor. Londin t. 108.

Habitat ubique in ſylvis humidis, praeſertim circa fabricam pyriam Ochtenſem et Murinam. Floret Iunio. ♃ Віолетка собачая. Sob.

573. VIOLA MIRABILIS. Caule triquetro, foliis reniformi-cordatis, floribus caulinis apetalis. (Folia glabra. Flores radicales albido-purpurascentes ſteriles, caulini apetali fertiles breviter pedunculati, ſtylo circulariter incurvato. Stolones nulli. Capſulae elateres.) (G) Iacq. Fl. auſtr. t. 19.

Habitat in ſylvis montoſis umbroſiſſimis, uti in montibus Pulcovo, et Duderovo, atque ad pagum Colodeci, et circa oſtium fluvii Strelna. Floret Majo. ♃ Віолетка удивительная. Russ. Sob.

574. VIOLA TRICOLOR. Foliis ovatis dentatis, corollis calyce glabro duplo majoribus. (Pedunculi angulati, ſtigma utrinque ad latera denticulo·) (G.) Flor. dan. t. 623.

In arvis et agris incultis et ad margines ſylvarum circa Caterinhoffium, in monte Poclonnaja et paſſim, copioſe provenit. Floret Iunio, Iulio, et Auguſto. ♃ Троичной цвѣтъ, Веселыя глазки. Russ. Віолетка трицвѣтная. Sob.

575. VIOLA ARVENSIS Foliis ovato oblongis dentatis, corollis calyci hirſuto aequalibus. (Caule procumbente diffuſo: corolla albida, luteola minore.) (Sob.)

Habitat in arvis et ad vias, Pargelovii, Oſinovae Roſchczae, Murinae, in monte Poclonnaja et paſſim in pratis ſiccis incultis. Floret Iunio, Iulio, Auguſto. ♃ Віолетка полевая. Sob.

IMPATIENS. Calyx diphyllus. Corolla pentapetala irregularis, nectario monophyllo cucullato. Stamina cohaerentia. Capſula ſupera unilocula-

ris, in valvas quinque ſpiraliter diſſiliens. (Antherae connatae. Calyx deciduus.)

576. IMPATIENS NOLI TANGERE. Pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ovatis, geniculis caulinis tumentibus. (Caulis ramoſiſſimus. Flores flavi punctis purpureis.) (G.) Flor. dan. t. 588.

Habitat in ſylvis et locis humidis arenoſo-argilloſis, umbroſis, uti ad fabricam pyriam Ochtenſem, in vico Strelina et Caterinhoffii, et paſſim. Floret Iunio , Iulio. ♃ Бальсамина неприкосновенная. Russ. Sob.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA

DIGYNIA.

ORCHIS. Nectarium cornu referens pone florem. Corolla ringens.

577. ORCHIS BIFOLIA. Bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato integerrimo , cornu longiſſimo, petalis patentibus. (Scapus ſtrictus , foliis duobus magnis; flores in ſpica longa, rara, ſvaveolentes albi, cornu ſetaceo, labello lineari , ad baſin aucto, fovea nectarifera patentiſſima , antheris albis loculamentis fulveſcentibus.) (G.) Flor. dan. t. 235. Satyrium, officin. Variat, floribus paucioribus foliis binis ovatis, pumila.

Habitat in pratis apricis, et butulelis verno tempore humidis; erat in insula apothecaria, sed nunc eliminata, occurrit in quantitate circa fabricam pyriam Ochtensem, montem Pulcovum, et Crasnoje selo, Murinam, et Murzincam. Floret Iunio. 2 Ядрушки, яички, дѣтская трава, кокушкины слезы, бѣлый сатиръ. Russ. Кокушница двулистая. Sob.

578. ORCHIS LATIFOLIA. Bulbis subpalmatis rectis, nectarii cornu conico, labio, trilobo, lateralibus reflexis, bracteis latis flore longioribus, (cordatis, petalis tribus conniventibus, tegentibus stylum, duobus erectis in cornu. Caulis fistulosus, apice polygonus. Folia maculata.) (G.) Flor. dan. t. 268.

Habitat in pratis paludosis et sylvosis circa pagum Murina, et Strelinam, Rumkinam, atque in aliis locis similibus. Variat bracteis florum longitudine, et flore brevioribus. Floret Iunio. 2 Кокушница широколистая. Russ. Sob.

579. ORCHIS MACULATA. Bulbis palmatis patentibus. nectarii cornu germinibus breviore, labio plano, petalis dorsalibus erectis, (bracteis serratis, longitudine germinis, cornu recurvo, labio trilobo, lacinia intermedia acuminata: caulis solidus. Folia lanceolata maculata. Nectarium rectum floribus dilute violaceis. Lineis saturatioribus. Variat flore albo, staminibus flavescentibus.) (G.) Regnaut bot. t. 353.

Habitat in pratis laetioribus humidis, ad coemeterium sti. Iohannis et ubique in sylvis graminosis. Floret Iunio, Iulio. 2 Кокушкины слезы. Russ. Кокушница пятнистая. sobol.

580. ORCHIS ODORATISSIMA. Bulbis palmatis, nectarii cornu recurvo breviore, labio trilobo, foliis linearibus, (ſcapo adpreſſis: ſpicae laxiuſculae; bracteis germine longioribus, longeariſtatis, coloratis, floribus albis, carneisve, aut purpureis, petalis duobus lateralibus revolutis, antheris flaveſcentibus.) (Sob.) Iacq. flor. auſtr. 3. t. 264.

Habitat in pratis ſylvoſis humidis et montoſis Murinae, Strelinae et Peterhoffiii. Floret Iunio. 2|. Кокушница благовоннѣйшая. Russ. Sob.

581. ORCHIS CONOPSEA. Bulbis pulmatis, nectarii cornu ſetaceo germinibus longiore recurvo, labio trifido, petalis duobus patentiſſimis. (Folia longa anguſta in ſcapo purpuraſcente, bracteis lanceolatis, obſcure purpureis; floribus violaceis, rubris, carneis albisve, odore dianthi caryophylli. Labium trifidum aequale crenulatum. Nectarii cornu longiſſimum incurvum.) (G.) Flor. dan. t. 224.

Habitat in pratis montoſis circa fabricam pyriam Ochtenſem, et frequentiſſima in betuletis circa Nevam et Wolchow, fluvios. Floret Iunio, Iulio. 2| Кокушница гвоздичная. Russ. Sob.

OPHRYS. Nectarium ſubtus ſubcarinatum.

582. OPHRYS NIDUS AVIS. Bulbis fibroſo-faſciculatis, caule vaginato aphyllo, nectarii labio bifido. (Flores ſcapo concolores, virideſcentes labio obliquo, ſubbicorni, petalis carnoſis emarceſcentibus omnibus, integerrimis, ſtaminibus ferrugineis, abditis, germine pedicellato, capſu-

lis erectis. Tota ſucculenta fragilis, interdum ſcapo lignoſo.) (G.) Flor. dan. t. 181.

Habitat in monte Duderovo, ad pagum Colodeci et circa Gatczinam in ſylvis umbroſis. Floret Majo, Iunio. ♃ Птичье гнѣздо. ſive дѣтская трава. Russ. Младенчица гнѣздичная. Sob.

583. OPHRYS OVATA. Bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis ovatis, nectarii labio bifido, (epiglottide expanſa antheras tegente, labii laciniis luteo-viridibus, germine ſulcato pedicellato.) (G.) Flor. dan. t. 137.

Habitat in montoſis humidis umbroſis circa ſarſcoje ſelo et Duderovium. Floret Iunio, Iulio. ♃ Младенчица листояичная. Russ. Sob.

584. OPHRYS CORDATA. Bulbo fibroſo, caule bifolio, foliis cordatis. (Caule herbaceo ſuperne puraſcente, foliis ſubtriangularibus glaucis, floribus quinque aut ſex rubellis, labio inferiore bi aut trifido, purpuraſcente, laciniis acutis, expanſis, germine in ſex valvulas dehiſcente. Tenella.) (L.) Haller hiſtor. ſtirp. helv. t. 22. f. 4.

Habitat in ſylvis paludoſis umbroſis vaſtiſſimis rarius. inter myriades rubi Chamemori, in ſylva paludoſa circa Craſnoy cabak quatuor tantum ſpecimina legit D. Laxmannus. Gort. Floret Iuio. ♃. Младенчица листосердечная. Russ. Sob.

585. OPHRYS LILIFOLIA. Bulbo ſubrotundo, ſcapo nudo, foliis lanceolatis, nectarii labio integro, petalis dorſalibus linearibus. (G.) Ehret. act. angl. 1764. n. 53. p. 81. t. 4.

Habitat in monte Duderovo. Floret Iunio. 2 Младенчица лилейная. Russ. Sob.

586. OPHRIS PALUDOSA. Bulbo ſubrotundo, ſcapo ſubnudo pentagono, foliis apice ſcabris, nectarii labio integro. (L.) Flor. dan. t. 877.

Habitat in paludoſis cum antecedente circa Craſnoy cabac, rarius. Floret Iunio, Iulio. 2 Младенчица болотная. Russ. Sob.

587. OPHRYS MONORCHIS. Bulbo globoſo, ſcapo nudo, nectarii labio trifido cruciato. (Bulbus fuſco-rubens; folia caulina duo vaginantia, flores virideſcentes, parviſſimi, petalis nec ſurſum conniventibus nec nectario carinato, labio ſuperiore operculo barbae ſimili; ſtamina ferruginea. Variat floribus luteis hirſutis.) (G.) Flor. dan. t. 102.

Habitat in monte Duderovo, et ad pagum Colodeci, in pratis montoſis humidis umbroſis. Floret Iunio. 2 Младенчица однокоренная Russ. Sob.

SERAPIAS. Corolla patens, hexapetala. Nectarium ovatum gibbum: labio ovato. Capſula infera, unilocularis, trivalvis, feneſtrata.

588. SERAPIAS LATIFOLIA. Bulbis fibroſis, foliis ovatis amplexicaulibus, floribus pendulis. (Caule multifolio, multifloro, floribus virentibus, labello plicato-emarginato-cordiformi, pàtalis villoſulis, antheris glandula flava. Variat foliis elliptico-enſiformibus, floribus erectis albis magnis, nectarii labio acutiuſculo nunc, nunc obtuſiore.) Helleborine. (G.) Flor. dan. t. 811.

Habitat in montosis ad Duderovium et Colodeci atque sylvis humidis Sarscoselii frequens. Floret Iunio, Iulio. 2 Ядро лисье. Russ. Лисье ядро широколистное. Sob.

589. SERAPIAS RUBRA. Bulbis fibrosis, foliis ensiformibus, floribus erectis, nectarii labio acuto. (Folia ovato-lanceolata amplexicaulia disticha, bracteis floribus longioribus. Variat, flore minimo atro-rubente, labello vomeriformi, per oras crenulato, medio rugoso, cymba dura cartilaginosa; foliis variis, radice profundissima; floribus rubiginosis.) (Sob. B.) Flor. dan. t. 345.

Habitat in sylvis circa Sarscoje selo, et in ipso horto imperiali Sarscoselienši nec non in monte Duderovo, Colodeci, et in viciniis urbis Gatczinae. Floret Iunio, Iulio. 2 Лисье ядро красное. Russ. Sob.

CYPRIPEDIUM. Nectarium ventricosum, inflatum cavum.

590. CYPRIDIUM CALCEOLUS. Radicibus fibrosis, foliis ovato-lanceolatis caulinis alternis. (Similibus Veratro albo, floribus purpureo-rubiginosis, tetrapetalis, petalis duobus patentibus, exterioribus, majoribus, capsulis lateralibus, in quibus antherae.) (G.) Mill. ic. t. 242.

Habitat in monte Duderovo in sylvis montosis umbrosisque prope Colodeci, frequens. Floret Majo, Iunio. 2 Кокушкины сапожки, sive Марінъ башмачокъ. Russ. Sob.

POLYANDRIA.

CALLA. Spatha monophylla, ovato-cordata, plana. Spadix digitiformis, simplicissimus fructificatio-

nibus tectus. Corolla nulla. Stamina longitudine piſtillorum germinibus intermixta. Bacca tetragono-globoſa, unilocularis, polyſperma. (Stamina ſex, in ſingulo floſculo numerus appropriatus.)

591. CALLA PALUSTRIS. Foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice ubique hermaphrodito. (Spatha ſupra alba, ſubtus viridi, filamentis et antheris albis, germinibus nitentibus in baccas ruberrimas mutandis. Piperita.) (G.) Flor. dan. t. 422.

Habitat in inſulis apothecaria, lapidea, et baſileenſi, et ubique in paluſtribus. Хлѣбница болотная. Russ. Sob.

CLASSIS XXI.

MONOECIA

MONANDRIA.

CHARA. Maſculus flos. Calyx nullus. Corolla nulla. Anthera germini ſubjecta.

Foemineus flos. Calyx tetraphyllus. ſtigma quinquefidum. Pericarpium, bacca ſpiraliter ſtriata, unilocularis, polyſperma. Semina plurima ſpherica minutiſſima.

592. CHARA VULGARIS. Caulibus laevibus, frondibus interne dentatis. (Ceſpites lati foetidi,

caulibus fragilibus. Baccae oblongae polyſpermae.) (G.) Vaillant. act. pariſ. 1719. t. 3. f. 1.

Habitat in aquis lente fluentibus Lugae. Floret Iunio. ☉ Рукосвѣчникъ обыкновенный, Russ. Sob.

DIANDRIA.

LEMNA. Mas. Calyx monophyllus, latere vel parte ſuperiore dehiſcens. Corolla nulla.

Foemina. Calyx monophyllus. Corolla nulla. Stilus unicus. Capſula uni-vel bilocularis, monoſperma aut diſperma, globoſa, compreſſa.

593. LEMNA TRISULCA. Foliis petiolatis lanceolatis (oblongis, ad dichotomias caulis dichotomi.) (G.) Mih. nov. plant. gen. 26. t. 11. f. 5.

Habitat paſſim in paludibus et aquis ſtagnantibus. Floret Iunio. ♃ Ряска. Russ. Ряска трижолобная. Sob.

594. LEMNA MINOR. Foliis ſeſſilibus utrinque planiuſculis, radicibus ſolitariis, (Foliis utrinque viridibus.) (G.) Blackw. herb. t. 380.

Nuſquam non obvia eſt in aquis ſtagnantibus. Floret Iunio, Iulio. ♃ Ряска меньшая. Russ. Sob.

595. LEMNA POLYRRHIZA. Foliis ſeſſilibus, radicibus confertis, (inferne atro-purpureis.) (Sob. R.) Mich. n. plant. gen. 16. t. 11. f. 1.

Habitat Caterinhcffii, et paſſim in aquis foſſarum ſtagnantibus. Floret Iunio. ♃ Ряска многокоренная. Russ. Sob.

TRIANDRIA.

TYPHA. Amentum cylindricum denſiſſimum. Corolla nulla. Mas. Calyx obſoletus triphyllus, ſeta eus; floribus magis terminalibus.

Foemina. In eadem planta infra. Calyx capillo pappoſo. Semen unicum inſidens ſetae pappove capillari, Stylo perſiſtente.

596. TYPHA LATIFOLIA. Foliis ſubenſiformibus, ſpica maſcula foemineaque approximatis. (Major, culmo breviore. Filamenta antheris longiora.) (G.) Flor. dan. t. 645.

Habitat in paludibus ad viam regiam Strelinae, Peterhovianam, et ad viam Sarſcoſelienſem circa montem Pulcovum. Floret Iulio, Auguſto. 24 Pogoza широкая. Russ. Sob.

597. TYPHA ANGUSTIFOLIA. Foliis ſemicylindricis, ſpica maſcula foemineaque remotis. (Foliis ſublinearibus culmo longioribus. Filamenta antheris breviora.) (G.) Flor. dan. t. 815.

Habitat in inſula lapidea, et circa inſulas ſinus Cronſtadienſis; atque in paludoſis ad viam regiam Peterhovianam frequentiſſima occurrit. Floret Iulio, Auguſto. 24 Pogoza узкая. Russ. Sob.

SPARGANIUM. Flores conglobati in capitulum. Corolla nulla. Mas: Calyx triphyllus, linearis, deciduus.

Fonmina. Calyx hexaphyllus. (Aut triphyllus.) Stylus unus aut duo, ſtigmate bifido. Drupa ex-

ſucca, ſupera, unilocularis monoſperma aut diſperma.

598. SPARGANIUM ERECTUM. Foliis erectis lineari-lanceolatis: nervo elevato. (Staminibus glumis duplo longioribus, antheris erectis fuſcefcentibus.) (G.) Gaertn. defr. et ſem. cent. 1. t. 19. f. 4.

Habitat in inſulae apothecariae locis verno tempore mundatis e regione ſeptentrionali; et ubique in lacubus et paludibus frequens eſt. Floret Iunio, Iulio. ♃ Ежова головка, волчьи бобки, ſive пырей водяный. Russ. Ежоголовка прямая. Sobol.

CAREX. Amentum ſpicatum imbricatum glumis. Calyx monophyllus. Corolla nulla.

Mas: ſquamis unifloris. Foemina: Nectarium inflatum, apice bi-aut tridentatum. Stigmata duo aut tria, vel ſimplex, aut trifidum fingulum. Semen triquetrum, pedicellatum intra nectarium ſen nux coriacea.

* Spica unica ſimplici.

599. CAREX DIOICA. Spica ſimplici dioica. (Stigma bifidum; folia tenuiſſima triangularia.) (R.) Flor. dan. t. 369.

In pratis humidis circa Petropolim. Flotet Majo, Iunio. ♃ Осока. Russ. Осока двудомовная. Sobol.

600. CAREX PULICARIS. Spica ſimplici androgyna ſuperne maſcula, capſulis divaricatis reflexis: feminibus teretibus. (Caules foliaque capil-

lacea, culmus teres. Stigma bifidum. (Sob. R.) Flor. dan. t. 166.

In paludosis circa Petropolim frequens est. Floret Majo, Iunio. 24 Осока тонколистая. Russ. Sobol.

** Spicis androgynis.

601. CAREX ARENARIA. Spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus foliolo longiori instructis, culmo triquetro. (Spiculis ferrugineis sessilibus. Terminalibus masculis; inferioribus foemineis, culmo incurvo. Stigmate bifido.) (G.) Flor. dan. t. 425. Carex arenaria, officin.

Ad ripam Nevae fluvii circa Caterinhoff. Floret Iunio. 24 Осока песочная. Russ. Sob.

602. CAREX ULIGINOSA. Spica composita, spiculis androgynis: inferioribus remotioribus folio longiori instrictis, culmo tereti. (R.) Habitat in locis humidis uliginosis. Floret Iunio. 24 Осока болотная. Russ. Sob.

603. CAREX LEPORINA. Spica composita, spiculis ovatis sessilibus approximatis alternis androgynis nudis. (Stigmate bifido. Spiculae huic solummodo tres.) (Sob. R.) Scheuchz. gram. t. 10. f. 15.

In pratis humidis ad viam Sarscosdiensem et passim. Floret Iunio. 24 Осока заячья. Russ. Sobol.

604. CAREX VULPINA. Spica supradecomposita inferne laxiore, spiculis ovatis adrogynis glomeratis: superne masculis. (Capsula squama longi-

ore, nectario digyno bifido. Variat: panicula flavo-viridi compacta; panicula ſpadiceo-fuſca, ſpiculis laxioribus; panicula fuſco-rubra, ſpiculis oblongis ſe ſe contingentibus.) (G.) Flor. dan. t. 308.

In paluſtribus circa Caterinhoffium et in ripis inſularum apothecariae et lapideae. Floret Majo, Iunio. 2 Осока лисичья. Russ. Sob.

605. CAREX MURICATA. Spiculis ſubovatis ſeſſilibus remotis androgynis, ſuperne maſculis, capſulis acutis divergentibus bicuſpidatis. (Stigma bifidum. Ore ſiſſo radice fibroſa.) (G.) Flor. dan. t. 284.

In ſilvis humidis non infrequens eſt. Floret Majo, Iunio. 2 Осока колючая. Russ. Sob.

606. CAREX ELONGATA. Spiculis oblongis ſeſſilibus remotis androgynis, capſulis ovatis acutis. (Stigma bifidum.) (R.) Leers fl. herb. t. 14. f. 7.

In humidis circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. 2 Осока долгая. Russ. Sob.

*** Spicis ſexu diſtinctis: foemineis ſeſſilibus.

607. CAREX FLAVA. Spicis confertis ſubſeſſilibus ſubrotundis: maſcula lineari, capſulis acutis recurvis, (echinatulis. Culmus ſubteres. Stigma trifidum.) (G.) Flor. dan. t. 1047.

Variet. *a.* Spica maſcula gemina.

β. Spica maſcula in ſummo feminifera. Gort.

In paludibus quae aeſtate exſiccantur, nihil hac planta frequentius eſt, uti circa Caemete-

rium ſti. Iohannis. Floret Majo, Iunio. 24 Осока желтая. Russ. Sob.

608. CAREX GLOBULARIS. Spicis ternis approximatis: maſcula filimormi; foemineis ſubrotundis ſuperne echinatis. Spica foeminea ſeſſili ovata folio florali breviori approximata.) (R.) Villar. pl. Delph. 2. p. 211. n. 27.

In ſylvis humidis circa Petropolim. Floret Iunio. 24 Осока шароголовная. Russ. Sob.

**** Spicis ſexu diſtinctis: foemineis pedunculatis.

609. CAREX LIMOSA. Spicis ovatis pendulis: maſcula longiore erectiore, radice repente. (Capſulae ovatae ſubcompreſſae nervoſae mucronatae, ore integro, bractea breviores. Culmus triqueter, ſpiculae tres.) (R.) Flor. dan. t. 646.

In paludibus circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. 24 Осока грязная. Russ. Sob.

610. CAREX PANICEA. Spicis pedunculatis erectis remotis; foemineis linearibus, capſulis obtuſis inflatis. (R.) Flor. dan. t. 261.

In uliginoſis circa Petropolim. Floret Majo, Iunio. 24 Осока просяная. Russ. Sobol.

611. CAREX CAESPITOSA. Spicis erectis cylindricis ternis ſubſeſſilibus: maſcula terminali, culmo triquetro. (Digyna, vaginis nullis, ſpicis ſubcylindricis obtuſis, foliis erectis molliuſculis.) (G.) Scheuchz. agroſtogr. t. 10. f. 11.

In pratis uliginoſis. Floret Iunio, Iulio. 24 Осока дерниcтая. Russ. Sob.

***** Spicis ſexu diſtinctis: maſculis pluribus.

612. CAREX ACUTA. Spicis maſculis pluribus, foemineis ſubſeſſilibus, capſulis obtuſiuſculis, (villoſulis, ſtaminibus dextrorſum declinatis, ſexu vario.) Varietas *a.* nigra vulgaris. Curtis Flor. Londin. t. 281. *β.* Ruffa ſive maxima. Sc. ſpicis longiſſimis, foemineis quatuor aut quinque pendulis, capſulis confertis acutis. (G.)

Nihil vulgatius hac planta tum alibi, tum praecipue in inſula Baſileenſi. Floret Majo, Iunio. 24 Осока остpая. Russ. Sobol.

613. CAREX VESICARIA. Spicis masculis pluribus, foemineis pedunculatis, capſulis inflatis acuminatis. (Spicae culmique trigoni.) (G.) Flor. dan. t. 647.

Habitat circa paludes inſulae Baſileenſis et lapidee frequens. Floret Majo, Iunio. 24 Осока пузыpистая. Russ. Sob.

614. CAREX HIRTA. Spicis remotis: maſculis pluribus: foemineis ſubpedunculatis erectis, capſulis hirtis. (Sob. B.) Flor. dan. t. 379.

Habitat in pratis arenoſis ſiccis, Caterinhoffii et ad fabricam pyriam Ochtenſem, necnon ad littora ſinus Cronſtadienſis alibique. Floret Majo, Iunio. 24 Осока мохнатая. Russ. Sob.

TETRANDRIA.

BETULA. Calyx monophyllus, trifidus aut quinquefidus. Corolla quadripartita.

Mas: in amento et ſquamis trifloris.

Foemina: calyx biflorus, ſquamis pedicellatis, cordatis cum acumine. Semina duo aut tria, utrinque membrana alata.

615. BETULA ALBA. Foliis deltoidibus acutis duplicato-ſerratis glabris, ramis erectis ſtrictis. (Cortice albo. Amenta maſcula, ut coryli, autumno pullulant.) (G.) Blackw, herb. t. 240. Betula alba, officin.

Nullibi non creſcit: Floret ſub medium Maij, vix explicatis foliis. ♄ Береза. Russ. Береза бѣлая. Sob.

616. BETULA PENDULA. Foliis deltoidibus acutis duplicato-ſerratis glabris, ramis flaccidis pendulis. (Sob.) Roth. flor. germ. 1. p. 405.

Habitat in ſylvis humidiuſculis cum Betula alba. Floret majo. ♄ Береза. Russ. Non diſtiguitur vulgo a Betula alba. Береза повислая. Sobol.

617. BETULA NANA. Foliis orbiculatis crenatis. (Arbor ramoſiſſima procumbens, cortice gemmisque atro-rubentibus, amentis ſingulis alaribus, floribus tribus in mare, duobus in foemina.) (G.) Flor. dan. t. 91.

Habitat in ſilvis humidis paludoſis, ad ductum aquarum Ladogenſem, circa Monaſterium Alexandro Newsky, Pargelovil, et paſſim. Floret Majo. ♄ Березовой ерникъ in Sibiria vocatur. Береза приземистая. Sobol.

618. BETULA ALNUS. Pedunculis ramoſis cunei formibus obtuſiſſimis, foliis ſubrotundis glutinoſis, venarum axillis ſubtus villoſis. (Variat: foliis

rotundis, glutinosis viridibus ; et foliis incanis hirsutis.) (G.) Batula alnus incana. (Sob.) Regn. bot. t. 326. Alnus officin.

Ubivis in sylvis. var. incana. locis elevatis gaudet. Floret Aprili, Majo. ♄ Ольха. Russ.

619. BETULA FRUTICOSA. Foliis ovato-rhomboideis versus apicem acuminatum inaequaliter serratis. (Sob.) Pall. flor. ross. t. 40.

Habitat in sylvis humidis montosis circa urbem Gatczinam, et ejus viciniis, similibus. Fforet Aprili, Majo. ♄ Береза кустарная. Russ. Sob.

URTICA. Calyx quadrifigus. Corolla nulla.

Mas : Nectarium centrale, cyathiforme.

Foemina : Calyx foliola duo oppositа exigua. Stigma villosum. Semen unicum ovatum, nitidum.

620. URTICA URENS. Foliis ovalibus, caule ramoso. (Racemis erectis.) (G.) Flor. dan. t. 739. Urtica minor, officin.

Crescit copiosissime in ruderatis, ad sepes hortorum, imo et in ipsis hortis odiosa planta. Floret Iunio. ☉ Крапива sive крапива меншая. Russ.

621. URTICA DIOICA. Foliis cordatis oppositis, racemis geminis, (pendulis, majoribus.) (G.) Flor. dan. t. 746. Urtica major, officin.

Habitat ad vias et sepes hortorum nec non in marginibus sulvarum frequontatarum. Floret Iunio. ♃ Крапива большая. Russ.

PENTANDRIA.

AMARANTHUS. Calyx triphyllus aut pentaphyllus coloratus. Corolla nulla.

Mas: Stamina duo aut quinque.

Foemina: Styli tres. Capsula unilocularis, circumscissa, monosperma.

622. AMARANTUS BLITUM. Glomerulis lateralibus, floribus trifidis, foliis ovatis retusis, caule diffuso. (Folia maculata, floribus polygamis.) (Sob. R.) Pluckn. phyt. 212. f. 2.

Habitat in ruderatis cultis et ad sepes hortorum, Petropoli, praecipue inter Regimenta Praetoriana. Floret Iulio. ☉ Амарантъ кухонный. Russ. Sobol.

POLYANDRIA.

MYRIOPHYLLUM. Calyx tetraphyllus. Corolla nulla. Mas. Stamina octo. Foemina. Pistilla quatuor. Styli nulli. Stigmata pubescentia. Semina quatuor nuda.

623. MYRIOPHYLLUM SPICATUM. Caule ramoso, spicis terminalibus nudis interruptis, floribus bracteatis, foliis pinnatis capillaribus. (Verticilli floribus quatuor plerumque.) (G.) Flor. dan. t. 681.

In lacubus et aquis stagnantibus frequens est. Floret Iunio, Iulio. ♃ Водопѣрица колосистая. Russ. Sob.

624. MYRIOPHYLLUM VERTICILLATUM. Caule simplici, floribus verticillatis hermaphroditis,

foliis pinnatis; pinnis linearibus carnosis. (Frequentius monoicum: flores masculini nimirum superiorem spicae partem; foeminini inferiorem occupant. Etiam petala ovalia decidua a Sowerby sunt observata.) (G.)

In fluvio Neva locis vadosis non raro occurrit, nec non in rivo prope Goreloy cabac fluente. Floret Iunio, Iulio. ♃ Водопѣрица колесоцвѣтная. Russ. Sob.

SAGITTARIA. Calyx triphyllus. Corolla tripetala.

Mas: Stamina viginti quatuor.

Foemina: styli nulli. Pistilla multa. Capsulae utriculares semilunatae numerosissimae. Semina multa, nuda, teretiuscula, conduplicata, (in capitulo haamisphaerico infra masculos.

625. SAGITTARIA SAGITTIFOLIA. Foliis sagittatis acutis. (G.) Flor. dan. t. 172.

Habitat in paludibus et aquis stagnantibus fluviorum, uti ad rivum Nevae fluvii Carpovcam, et circa insulas lapideam, basileensem, et apothecariam. Floret Iulio, Augusto. ♃ Стрела sive Желтая вахта. Russ. Стрѣла водяная. Sob.

QUERCUS. Corolla nulla.

Mas: in amento. Calyx quinefidus aut septemfidus. Stamina quinque ad decem.

Foemina: in gemma, squamis imbricatis, in cupulam coalitis. Calyx minimus monophyllus sexfidus, vel integerrimus, scaber. Styli duo ad

quinque, unicus, bifidus aut quinquefidus. Nux ovata, coriacea, monoſperma, matura unilocularis, cupula excepta.

626. QUERCUS ROBUR. Foliis petiolatis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus, angulis obtuſis, fructibus ſubſeſſilibus. (Styli tres.) (G.) Von. Gleichen das neueſt. aus dem Reiche der Pflanz. t. 29. Quercus, officin.

Habitat in variis locis circa Petropolim et ad montem Duderovium. Cronſtadii duae tantum erbores annoſae et procerae reperiuntur, ſub quibus glorioſae memoriae Petrus Magnus reſidere ſolebat, cum urbis illius fundamenta jacerentur, et in una arborum ciſtam ad reponenda, quae ad victum ſpectant, fieri curavit. Floret Majo. ♄ Дубъ. Russ.

CORYLUS. Corolla nulla.

Mas. Amentum ex ſquamis trifidis, lacinia media latiſſima, unifloris.

Foemina: Involucrum diphyllum, lacerum, ex gemma. Calyx obſoletus ex margine epidermidis nucis breviſſimo. Nux ovata. (Receptacum villoſum, gemma foliacea.)

627. CORYLUS AVELLANA. Stipulis lanceolatis, ramulis piloſis. (Foliis dentatis nervoſis, dentibus ariſta herbacea.) (G.) Blackw. herb. t. 293.

In ſylvis montoſis Pargelovii, Oſinovae Roſchczae et in monte Duderovo atque circa urbem Gatczinam et Colodeci copioſiſſime invenitur. Floret Aprili. ♄ Орѣшникъ, ſive Лѣщина. Russ. Орѣшникъ лѣсный. sob.

MONADELPHIA.

PINUS. Corolla nulla.

Mas: Calyx racemi ſquamae hiantes. ſtamina plurima Antherae nudae. (Calyx tetraphyllus?)

Foemina: Calyx ſtrobili: ſquamae biflorae. Piſtillum unicum. Nux cincta ala membranacea, unilocularis evalvis.

628. PINUS SYLVESTRIS. Foliis geminis rigidis, primordialibus ſolitariis glabris, ſtrobilis ovato-conicis ſubgeminis foliorum longitudine, ſquamis oblongis obtuſis. (G.) Oelhaf. Abb. t. 1.-4. Pinus, officin.

Nuſquam non obvia eſt, praeſertim autem montoſa tractus Coporienſis notari merentur, quae admodum proceris hujus generis arboribus ſuperbiunt. Floret Majo. ♄ Сосна. Russ.

629. PINUS ABIES. Foliis ſolitariis ſubulatis mucronatis laevibus bifariam verſis. (Folia compreſſa, utrinque ſubcarinata, ſupra lucida. ſtrobilis ſubcylindricis pendulis.) (G.) Flor. dan. t. 193. Abies, officin.

Variet. β P. Abies ſtrobilorum ſquamis margine undulatis. (sob) Syſt. Nat. edit. Gmelin. Pinus Picea.

Ubique in ſylvis obvia eſt; variet β Caterinhoffii. Floret Majo. ♄ Ель. Russ.

CLASSIS XXII.

DIOECIA.

DIANDRIA.

SALIX. Amenti ſquamae uniflorae imbricatae ; involucro coriaceo e gemma. Corolla nulla.

Mas: Glandula baſeos nectarifera vel ſimplex vel duplex. (Antheris una ad quinque.)

Foemina: Stylus bifidus. Capſula unilocularis, bivalvis, valvulis revolutis, ſemina pappoſa, baſi pappo ſimplici.

630. SALIX HERMAPHRODITICA. Foliis ſerratis glabris, floribus hermaphroditis diandris. (sob.)

Habitat in ſylvis prope viam quae ducit a ſarſcoſelo, ad Gatczinam. Floret Aprili, Majo. ♄ Ива, ſive верба. Russ. Верба женомужная. Sob.

631. SALIX TRIANDRA. Foliis oblongo-lanceolatis ſerratis glabris, floribus triandris. (ſquamae remotae patulae fuſco-virides.) (G.) Hoffm. Salic. 1. t. 9. 10. f. 1-4.

Habitat paſſim in ingria; frequens ad ductus aquarum circa viam Peterhovianam et Wiburgenſem. Floret Aprili, Majo. ♄ Ветла, ſive Верба. Russ. Верба тримужная. Sob.

632. SALIX PENTANDRA. Foliis ovatis acutis ſerratis glabris floribus pentandris. (Petioli multiglanduloſi.) (G.) Flor. dan. t. 943. Salix pentandra, officin.

In inſula Petri copioſa arbuſcula eſt ſed nec alibi hoſpes. Flort Majo. ♄ Ветла, ſive Ива. Russ. Верба пятимужная. Sob.

633. SALIX FRAGILIS. Foliis ſerratis glabris ovato-lanceolatis, petiolis dentato-glandulofis. (Folia juniora utrinque pilis albidis adpreſſis obſita.) (Sob.) Flor. lapp. t. 8. f. B.

Ad ſepes hortorum in regione Wiburgenſi, et inſula apothecaria aliisque Arbor procera ſatis vulgaris. Floret Majo. Ива, ſive Верба. Russ. Верба ломкая. Sob.

634. SALIX PURPUREA. Foliis ſerratis glabris lanceolatis, inferioribus oppoſitis. (Sob.)

Habitat in ſylvis circa Strelinam et ad ſepes hortorum ubique Petropoli, arbor mediocris altitudinis. Floret Aprili, Majo. ♄ Верба красная. Russ.

635. SALIX MYRTILLOIDES. Foliis integris glabris ovatis acutis. (R.) Flor. lapp. t. 8. f. K.

Habitat in montoſis circa Petropolim. Floret Majo. ♄ Верба черниколистая. Sob.

636. SALIX AURITA. Foliis integerrimis utrinque villoſis obovatis, appendiculatis. (R.) Hoffm. Salic. 1. p. 30. t. 4. f. s. 2. et t. 5. f. 3.

Habitat ad ductus aquarum paſſim. Floret Majo. ♄ Тальникъ, ſive Ветла. Russ. Верба ушистая. Sob.

637. SALIX LANATA. Foliis integerrimis utrinque lanatis ſubrotundis acutis. (R.) Flor. lapp. t. 7. f. 7. et t. 8. f. N. et X.

Habitat in montoſis humidis circa Petropolim. Floret Majo. ♄ Тальникъ, ſive Ветла. Russ. Верба мохнатая. Sob.

638. SALIX ARENARIA. Foliis integris ovatis acutis ſupra ſubvilloſis, ſubtus tomentoſis, (candicantibus, non nigris.) (G.) Flor. dan. t. 197.

Creſcit ad ductum aquarum Ladogenſem, et circa Fabricam pyriam Ochtenſem copioſe. Floret Majo. ♄ Тальникъ. Russ. Верба песочная. Sob.

639. SALIX INCUBACEA. Foliis in tegerrimis lanceolatis: ſubtus villoſis nitidis, ſtipulis ovatis acutis. (Radice repente, ramis decumbentibus, foliis ſubtus glaucis.) (G.)

Habitat paſſim in pratis et fructicetis humidis. Floret Majo. ♄ Тальникъ. Russ. Верба лежачая. Sob.

640. SALIX FUSCA. Foliis integerrimis ovatis ſubtus pubeſcentibus. (Caules diffuſiſſimi, ramis fuſcis, foliis fuſco-viridibus ſubſeſſilibus; amento oblongo, ſquamis ciliatis atrorubentibus, intus fuſceſcentibus, genitalibus rubris.) (R. Sob.) Iacq. Flor. auſtr. 5. t. 409.

Habitat in pratis humidis circa Murinam, et Pargelovium. Floret Majo. ♄ Верба темная. Russ. Sob.

641. SALIX ROSMARINIFOLIA. Procumbens foliis integerrimis lanceolato-linearibus ſtrictis ſubſeſſilibus ſubtus tomentoſis. (Supra ſuturate

virideſcentibus, nudis, ſubtus ex decumbente pube albidis, margine revoluto. Caulis ſaepe in terra latens.) (Sob.) Lobel. ic. 2. p. 137.

Habitat in ſylvis humidis, circa Fabricam pyriam Ochtenſem, ad pagos Rjabova, et Murina. Floret Majo. ♄ Верба розмаринная. Russ. Sob.

642. SALIX CAPREA. Foliis ovatis rugoſis ſubſerratis ſubtus tomentoſis undatis ſuperne denticulatis. (Filamentis duobus diſtinctis, amenta ex gemmis ſuperioribus.) (G.) Hoffm. ſalic. 1. p. 25. t. 3. f. 1. 2. et t. 5. f. 4.

In ſylvis humidis, circa fabricam pyriam Ochtenſem, ad pagos Rjabova, et Murina. Floret Majo. ♄ Верба козья. Russ. Sob.

643. SALIX VIMINALIS. Foliis ſubintegerrimis lanceolato-linearibus longiſſimis acutis ſubtus ſericeis, ramis virgatis. (Amenta flava copioſa reflexa, involucrum marium flavo-rubrum; ſquamulae virides in foeminis.) (G.) Hoffm. ſalic. 1. t. 2. f. 1. et t. 5. f. 2.

Ad pagos paſſim. Floret Aprili, Majo. ♄ Ива, ſive Лоза. Russ. Верба лозная. Sob.

644. SALIX CINEREA. Foliis ſubſerratis oblongo-ovatis ſubtus ſubvilloſis, ſtipulis dimidiato-cordatis. (Amenta florum fuſca, infra folia collocata. Pedunculo foliolis aliquot minimis, lanceolatis. Stipulae dimidiato-cordatae, utrinque ſerratae glandulis tribus.) (Sob.)

Habitat in monte Pulcovo et paſſim in ſylvis humidis. Floret Aprili, Majo. ♄ Верба сѣрая. Russ. Sob.

645. SALIX ALBA. Foliis lanceolatis acuminatis ſerratis utrinque pubeſcentibus: ſerraturis infimis glanduloſis. (Folia ſubtus albida, quaſi polline inſperſa; involucrum marium bifidum, ſquamae patulae villoſae.) (Sob.) Blackw. herb. t. 327.

Habitat circa ſepes hortorum in vico Strelina et paſſim in ſylvis arbor procera, excelſa. Floret Aprili, Majo. ♄ Верба бѣлая. Russ. Sobol.

TRIANDRIA.

EMPETRUM. Calyx tripartitus. Corolla tripetala.

Mas: Stamina longa.

Foemina: Stigmata novem. Bacca orbiculata unilocularis. Semina novem articulatim in orbem poſita.

646. EMPETRUM NIGRUM. Procumbens. (G.) Mill. illuſt. ic. Flora dan. t. 975.

Circa urbem Schlüſſelburg tam in pratis quam etiam in ſylvis inter ericam et ad ductum aquarum Ladogenſem frequens eſt. Creſcit etiam in monte Poclonnaja, Pargelovii et Oſinova Roſchza, et prope Czeſma; locis humidis. Floret Aprili, Majo. ♄ Ерникъ ягодный. Russ. Sobol.

TETRANDRIA.

MYRICA. Flores amentacei Amentum ſquamis lunatis. Calyx diphyllus. Corolla nulla.

Foemina: Styli duo. Bacca, ſive drupa monoſperma, ſupera, unilocularis.

647. MYRICA GALE. Foliis lanceolatis ſubſerratis, caule ſuffrutieoſo. (Fructu ſicco.) (G.) Flor dan. t. 327.

Habitat in Inſulis Nevae fluvii praeſertim in ea quae nomen a rotunditate habet. Floret Iunio, Iulio. ♄ Пахучка сухоягодная. Russ. Sob.

PENTANDRIA.

HUMULUS. Corolla nulla.

Mas: Calyx pentaphyllus.

Foemina: Calyx monophyllus, oblique patens, integer; involucrum tetraphyllum. Styli duo. Semen unicum intra calycem foliatum.

648. HUMULUS LUPULUS. (Caulis volubilis, folia inferiora triloba.) (G.) Knorr del. hort. 2. t. l. 5. Lupulus, officin.

Habitat in ſylvis umbroſis circa Caterinhoffium, ad pagum Camennoy Nos et paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ♂ et ♀ Хмѣль. Russ.

OCTANDRIA.

POPULUS. Flores amentacei. Calyx, lamina lacera. Corolla turbinata obliqua integra.

Foemina: Stigma quadrifidum. Capſula unilocularis aut bilocularis, bivalvis. Semina multa pappoſa.

649. POPULUS TREMULA. Foliis ſubrotundis dentato-angulatis utrinque glabris. (Glandulis duabus ad baſin coadunatis. Petioli apice compreſſi, unde folia tremula.) (G.) Blackw. herb. t. 248.

Ubivis in ſylvis frequens eſt. Floret Aprili, Majo. ♄ Осина. Russ.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS. Calyx tripartitus. Corolla nulla.

Mas: Stamina novem, aut duodecim. Antherae globoſae, didymae.

Foemina: Styli duo. Capſula dicocca, bilocularis, monoſperma.

650. MERCURIALIS PERENNIS. Caule ſimpliciſſimo, foliis ſcabris. (G.) Flor dan. t. 400. Mercurialis, officin.

Habitat in ſylvis humidis umbroſis prope fluvium ſiſtam, in montibus Pulcovo et Duderovo, atque in aliis locis ſimilibus. Floret Majo, Iunio. ♃ Полѣска. Russ. Полѣска многолѣтняя. Sob.

HYDROCHARIS. Calyx trifidus. Corolla tripetala.

Mas: Spatha diphylla. Filamenta tria interiora ſtylifera; (exteriora mediaque baſi connata.)

Foemina: Styli ſex. Capſula ſexlocularis, polyſperma, infera.

651. HYDROCHARIS MORSUS RANAE. (Foliis circinatis, floribus albis.) (G.) Flor dan. t. 878.

Habitat ubique in paludibus, praecipue circa Caterinhoffium prope pagum Tenteleva, et adviam Peterhoffianam. Floret Iulio. ☉ et ♃ Лягушникъ. Russ. Водопріятность лягушная. Sobol.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS. Mas: Amentum floribus ter tribus oppositis. Calyx, squama, corolla nulla. Stamina in flosculo terminali duo. Drupa succulenta, clausa, polypyrena.

Foemina: Calyx tripartitus. Petala tria. Styli tres, calycis tuberculis tribus inaequalis unilocularis, glandulis balsamiferis ad basin enternam stipati. Bacca sive Drupa trisperma.

652. JUNIPERUS COMMUNIS. Foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. (G.) Flor. dan. t. 1118. Juniperus, officin.

Habitat in sylvis circa Strelinam, Peterhoffium, ad pagum Rjabova, et passim. Floret Aprili, Majo. ♄ Можжевельникъ, sive можжуха. Russ.

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

HOLCUS. Hermaphroditus: Calyx, Gluma ſubbiflora bivalvis. Corolla. Gluma ariſtata. Stamina tria. Styli duo. Semen unicum.

Mas: Calyx, Gluma bivalvis. Corolla nulla. Stamina tria.

653. HOLCUS LANATUS. Glumis bifloris villoſis: floſculo hermaphrodito mutico; maſculo ariſta recurva. (Folia pubeſcentia, ſuperiora alaria contracta; Vaginae laxae ſtriatae villoſae. Floſculi nonnulli in ramulis inferioribus paniculae ſteriles emarcidi: glumae antherae que virides rubreve.) (R. Sob.) Schreb. gramin. t. 20. f. 1.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, et Oſinova Roſchcza, et paſſim in pratis montoſis declivibus. Floret Iunio, Iulio. ♃ Просяникъ мохнатый. Russ. Sob.

654. HOLCUS ODORATUS. Glumis trifloris muticis acuminatis, floſculo hermaphrodito diandro. (Sob. R.) Loeſ. fl. pruſſ. t. 26.

Habitat in ſylvis herboſis et pratis elevatis Oſinovae Roſchczae. Floret Iunio, Iulio. ♃ Просяникъ пахучій. Russ. Sob.

PARIETARIA. Flores mere foeminei hermaphroditis in eodem trunco interſiti. Calyx quadrifidus. Corolla nulla.

Semen unicum ſuperum, elongatum. (Flores hermaphroditi duo in involucro hexaphyllo, foliolis duobus exterioribus majoribus; hermaphroditus unus inter foeminas duas.)

655. PARIETARIA OFFICINALIS. Foliis lenceolato-ovatis, pedunculis dichotomis, calycibus diphyllis. (Folia hirſuta venoſa; calyx ſegmentis rubellis. Flores foeminei tetragoni, pyramidati. Caule ſimplici, floribus inferioribus pluribus maſculis pedicellatis: ſuperioribus foemineis ſeſſilibus. Filamenta antea ſummo artificio ſpiraliter intorta, inſtante foecundatione elaſtice diſſiliunt.) (R.) Flor. dan. t. 521. Parietaria, officin.

Habitat in ruderatis circa Petropolim. Floret Iunio, Iulio. ♃ Стѣнная трава, ſive день и ночь. Russ.

ATRIPLEX. Corolla nulla. Flores alii hermaphroditi, alii in eadem planta mere foeminei.

Hermaphroditus: Calyx pentaphyllus. Stamina quinque. Stylus bipartitus. Semen unicum depreſſum; erectum.

Foemina: Calyx diphyllus. Semen unum, compreſſum.

656. ATRIPLEX PATULA. Caule herbaceo patulo foliis ſubdeltoideolanceolatis, calycibus ſeminum diſco dentatis. (Caulis diffuſus subquadrangularis: ramis patentibus elongatis, folia

haſtata lanceolataque integra. Floſculi maſculi tetrandri, valvulae dentatae.) G.) Lob. ic. 257.

Habitat in cultis, ruderatis hortiſque oleraceis, prope pagum et fluvium Siſtam, necnon in ipſa urbe Petropoli et paſſim. Floret Iulio, Auguſto. ⊙ Лебеда розвилистая. Russ. Sob.

ACER. Flores multi mere maſculi reliquis (hermaphioditis) interjecti. Calyx quinquefidus. Corolla quinquepetala. Stamina octo. Piſtillum unum (hermaproditis) capſulae duae aut tres, monoſpermae, ala terminatae.) (Samarae duae, unialatae.)

657. ACER TATARICUM. Foliis cordatis indiviſis ſerratis: lobis obſoletis, floribus racemoſis. (R.) Pallas fl. roſſ. t. 3.

Habitat in ſylvis et inſulis Nevae fluvii rarius. Floret Aprili, Majo. ♄ Кленъ татарскій. Russ.

658. ACER PLATANOIDES. Foliis quinque-lobis dentatis; dentibus acuminatis, glabris, corymbo ſimplici erecto. (Cortex laevis. Corymbus et ſamarae glabra: alis patentibus. Lacteſcit. (G.) Mill. ic. t. 8. f. 1.

Habitat in ſylvis montoſis circa vicum Hoſtilitza, et paſſim. Elegans arbor, et ad hortorum ſepes et ambulacra in maximo uſu. Floret Majo, Iunio. ♄ Кленъ. Russ.

DIOECIA.

FRAXINUS. Calyx nullus, aut perianthium quadripartitum. Corolla nulla, aut quadripetala.

Hermaphroditus: Stamina duo. Piſtillum unum. Semen unicum lanceolatum. (Samara.)

Foemina: Piſtillum unum, lanceolatum. Capſula bilocularis, ſuperne foliaceo-compreſſa. Semina pauca pendula.

659. FRAXINUS EXCELSIOR. Foliolis ſerratis, floribus apetalis. (Flores omnes hermaphroditi. Gemmae laterales racemos, terminales folia promunt.) (G.) Flor. dan. t. 969. Fraxinus, officin.

Habitat in ſylvis montoſis circa Sarſcoje Selo, et Peterhoffium, creſcit etiam copioſe in inſula rotunda, atque ad ſepes hortorum paſſim. Floret Majo. ♄ Ясенъ, ſive ясень. Russ.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

FILICES.

EQUISETUM. Clava, ſeu ſpica ovato-oblonga multivalvis: fructificationes peltatae intus dehiſcentes. Filamenta duo, apicibus duobus antheriferis.

660. EQUISETUM SYLVATICUM. Frondibus compoſitis, ſpica terminali flaccida. (Setis verticillatis viginti quatuor ad triginta.) (G.) Weinm. phytanth. t. 479. f. F.

Habitat in ſylvis umbroſis paſſim. Floret Aprili, Majo. 24 Хвощъ лѣсный. Russ. Sob.

661. EQUISETUM ARVENSE. Scapo fructificante nudo, fronde ſterili verticillato-ramoſo decumbente.) (Simile Aſparagis.) (G.) Curtis Flor. Londin. t. 285. Equiſetum, officin.

Habitat in arvis et pratis arenoſis ſiccis. Floret Aprili, Majo. 24 Хвощъ полевый. Russ. Sob.

662. EQUISETUM PALUSTRE. Caule angulato, frondibus ſimplicibus (Setis verticillatis paucis.) (Sob.) Weinm. phytauth. t. 479. f. d. e.

Creſcit abunde in paludibus circa Fabricam pyriam Ochtenſem , et in inſulis Nevae fluvii paſſim. Floret Majo. ♄ Хвощъ болотный. Russ. Sob.

663. EQUISETUM FLUVIATILE. Caule ſtriato, frondibus ſubſimplicibus, (vaginis quatuordecim ad octodecim dentatis.) (Sob. R.) Blackw. herb. t. 2. 17. f. 2. Equiſetum majus, officin.

Habitat in fluvio Neva et in rivulis circa inſulam lapideam, et apothecariam atque aliis in locis ſimilibus. Floret Iunio. 24 Хвощъ рѣчный. Russ. Sob.

664. EQUISETUM LIMOSUM. Caule ſubnudo laevi. (R. Sob.) Saj. Angl. 3. t. 5. f. 2.

Habitat in limoſis circa Petropolim, uti circa fabricam porcellaneam, Murinam, Czornaja Reczca, et paſſim. Floret Majo, Iunio. 24 Хвощъ иловастый. Russ. Sob.

665. EQUISETUM HIEMALE. Caule nudo ſcabro baſi ſubramoſo. (G.) Regn. bot. t. 401.

Paſſim ad paludes. Floret Auguſto. 24 Хвощъ. Russ. Хвощъ зимній, ſive обыкновенный. Sob.

LYCOPODIUM. Fructificationes in axillis ſquamarum in ſpicas oblongas imbricatas digeſtarum, vel (diſtinctae,) ipſorum foliorum, axillares, ſeſſiles. Capſulae? reniformes, bivalves, elaſticae diſſilientes, polyſpermae. Flos maſculus in alis foliorum, ſquama oblonga. Foemineus, perianthium tetraphyllum.

666. LYCOPODIUM CLAVATUM. Foliis ſparſis filamentoſis, ſpicis teretibus pedunculatis geminis. (Funiculis repentibus lanuginoſis longis. Variat ſpicis ſotilariis.) (G.) Flor. dan. t. 126. Lycopodium, officin.

Habitat in ſylvis; Caterinhoffii, in inſulis, apathecaria, baſilenſi et paſſim. Floret Iúlio, Auguſto. 24 Плаунъ. Russ. Волконожіе булавистое. Sobol.

667. LYCOPODIUM SELAGO. Foliis ſparſis octofariis, caule dichotomo erecto faſtigiato, capſulis ſparſis. (G.) Flor. dan. t. 104. Muſcus terreſtris, officin.

Ad fluvium lugam et Lemodícham in ſylvis, nec non Pargelovii, et paſſim in humidis. Floret Auguſto. 24 Баранецъ. Russ. Волконожіе ельчатое. Sobol.

668. LYOPODIUM ANNOTINUM. Foliis ſparſis quinquefariis ſubſerratis, ſurculis annotino-articulatis, ſpicis terminalibus glabris erectis. (Rami

plerumque in tres aut quatuor alios dividuntur. Glumae clavarum latae, ſubmembranaceae nonnihil lacerae, in longum et piliformem apicem excurrunt.) (G.) Flor. dan. t. 127.

In inſula baſileenſi, lapidea, apothearia, Caterinhoffii, et paſſim in nemoribus. Floret Iulio, Auguſto. 24 Волконожіе годочленистое. Russ. Sobol.

669. LYCOPODIUM COMPLANATUM. Foliis bifarium connatis; ſuperficialibus ſolitariis, ſpicis geminis. (Variat ſpicis ſolitariis.) (G.) Flor. dan. t. 78.

Habitat in monte Poclonnaja, Pargelovii, et paſſim in ſylvis-montoſis arenoſis, et ericetis ſterilibus. Floret Auguſto, Septembri. 24 Волконожіе плоское. Russ. Sob.

OPHIOGLOSSUM. Spica diſtica, articulata: articulis tranſverſim dehiscentibus, ſubgloboſis. (Capſulae numeroſae membrana connatae, maturae tranſverſim dehiſcentes, annulo nullo.)

670. OPHIOGLOSSUM VULGATUM. Fronde ovata, ſcapo unifolio, (flaveſcente, folio avato-oblongo.) (L.) Flor. dan. t. 147.

Habitat in pratis ſylvaticis ſubhumidis rariſſima. In ſylva circa Caterinhoffium duo tantum ſpecimina Invenit. D. Laxmann. In ſulva inſulae baſileenſis unum Exemplar legit Sobolewſki. Floret Majo. 24 Змѣиный языкъ. Russ.

OSMUNDA. Spica ramoſa: capſulis ſubgloboſis, ſeſſilibus, tranſverſe dehiſcentibus. Annulo nullo.

671. OSMUNDA LUNARIA. Fructificationibus caŭli ad baſin frondis inſidentibus, ſcapo ſolitario, racemo laterali, fronde ſolitaria pinnata. (Variat fronde ſimplici et compoſita.) (G.) Flor. dan. t. 18.

In inſulis Nevae fluvii locis apertis et ſiccis, atque in pratis montoſis, et ad margines ſylvarum Pargelovii, aliarumque. Floret Iunio, Iulio. ♃ Богородицына ручка. Russ. Чистоустъ полумѣсячный. Sobol.

672. OSMUNDA REGALIS. Fructificationibus frondi inſidentibus, fronde bipinnata, racemo terminali ſupradecompoſito. (Pinnis lanceolatis, apice racemiferis.) (L.) Flor. dan. t. 217.

Habitat in nemoribus humidis, ad rivulos, circa pagum Lembalova. Floret Auguſto. ♃ Чистоустъ царскій Russ. Sob.

673. OSMUNDA STRUTHIOPTERIS. Fructificationibus frondi inſidentibus, in frondibus diſtinctis: frondibus ſterilibus bipinnatis, ſcapo fructificante pinnato diſticho. (G.) Flor. dan. t. 169.

In inſulis Nevae fluvii, lapidea, baſileenſi, crucis, et in umbroſis montis Pulcovi frequentiſſima planta eſt. Floret Iulio, Auguſto. ♃ Черный папоротникъ. Russ. Чистоустъ струсопѣристый. Sob.

674. OSMUNDA RAMOSA. Racemis lateralibus, frondibus bipinnatis: pinnulis inciſis. (Minor, ramis plerum tribus bipinnatis, ſcapo laterali, infra nudo, ſupra racemoſo.) (Sob.) Roth. flor. german. p. 444.

Habitat in pratis declivibus, ad margines ſylvarum, locis apricis, et in ripis lacuum Oſinovae Roſchczae. Floret Auguſto, Septembri. 24 Чистоустъ вѣтвистый. Russ. Sob.

PTERIS. Fructificationes ſive capſulae in lineam digeſtae, ſubtus cingentem frondis marginem.

675. PTERIS AQUILINA. Frondibus ſupradecompoſitis, pinnis pinnatis; pinnulis lanceolatis; infimis pinnatifidis, ſuperioribus minoribus. (G.) Blackw. herb. t. 325. Filix foemina, officin.

Creſcit copioſiſſime in ſylvis ceduis montoſis; in monte Poclonnaja, Pargelovii, circa fabricam pyriam Ochtenſem et paſſim. Floret Auguſto, Septembri. 24 Орлякъ, ſive женскій папоротникъ. Russ. Крыло орлиное. Sob.

ASPLENIUM. Fructificatlones ſive capſulae in lineas rectas ſubparallelas in diſco frondis paginae inferioris congeſtae.

676. ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Frondibus pinnatis, pinnis ſubrotundis crenatis. (R.) Flor. dan. t. 119. Polytrichum, officin.

Habitat in montoſis circa Petropolim. Floret Majo. 24 Роса каменная. Russ.

POLYPODIUM. Fructificationes ſive capſulae per inferiorem frondis partem in globulos diſpoſitae.

677. POLYPODIUM VULGARE. Frondibus pinnatifidis, laciniis oblongis ſubſerratis obtuſis, radice ſquamata, (paleis ferrugineis.) (F.) Zorn plant. offic. ic. 1. t. 46. Polypodium, officin.

Habitat in ſaxoſis circa Petropolim. Floret Majo. 2 Папоротникъ солодковый. Russ.

678. POLYPODIUM PHEGOPTERIS. Frondibus ſubbipinnatis, pinnis oppoſitis: ſuperioribus pinnula trapezoide conjunctis infimo pari deflexo, pinnulis obtuſis, glomerulis capſularum dimidiam marginis partem occupantibus. (G.) Bolton. fil. Brit. 1. t. 20.

Creſcit ubique in ſylvis humidis umbroſis. Floret Iulio, Auguſto. 2 Папоротникъ вязовый. Russ. Sob.

679. POLYPODIUM CRISTATUM. Frondibus ſubbipinantis, pinnulis oblongis obtuſis ſerratis: ſerraturis ciliatis, glomerulis capſularum duplici ſerie diſpoſitis. (Sob. R.) Bolton fil. Brid. 1. t. 23.

Habitat in ſeptentrionali regione montis Duderovii, alias nullibi obſervatum. Floret Auguſto. 2 Папоротникъ гребенчатый. Russ. Sob.

680. POLYPODIUM FILIX MAS. Frondibus bipinnatis, pinnulis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo, (ſemicylindrico. Flores reniformes.) (G.) Blackw. herb. t. 323. Filix mas officin.

Ad radices arborum in ſylvis umbroſis humidis paſſim. Floret Iunio, Iulio. 2 Папоротникъ. Russ. Папоротникъ мужескій. Sob.

681. POLYPODIUM FILIX FOEMINA. Fronde bipinnata: pinnulis lanceolatis pinnatifidis acutis. (Flores ovati, ſubciliati, ſolitarii.) (G.) Blackw. herb. t. 325.

In umbroſis inſulae lapideae et paſſim. Floret Iulio. 2 Папоротникъ женскій. Russ. Sob.

682. POLYPODIUM THELYPTERIS. Fronde bipinnata: pinnis pinnatifidis integerrimis ſubtus undique glomerulis capſularum tectis. Olim Acroſtichum Thelipteris. (G.) Flor. dan. t. 760.

Ad radices arborum frequens eſt. Floret Iulio. 2 Папоротникъ мягкокрылый. Russ. Sob.

683. POLYPODIUM REGIUM. Frondibus bipinnatis, pinnis ſuboppoſitis; pinnulis alternis laciniatis. (Sob.) Vaillant. flor. paris. t. 9. f. 1.

Habitat in ſylvis humidis umbroſis inter Sarſcoje ſelo et urbem Gatczinam. Floret Iulio, Auguſto. 2 Папоротникъ Царскій. Russ. Sobol.

684. POLYPODIUM DRYOPTERIS. Frondibus ſupradecompoſitis: foliolis ternis bipinnatis. (G.) Flor. dan. t. 759.

Creſcit ad arborum radices in locis humidis paſſim. Floret Iunio, Iulio. 2 Папоротникъ дубовый. Russ. Sob.

ISOETES. Flores maſculi: Anthera intra baſin frondis ſeſſilis. Fructificatio foeminea: Capſula bilocularis intra baſin frondis.

685. ISOETES LACUSTRIS. Foliis ſubulatis ſemiteretibus recurvis. (Folia cepacea faſciculata radicalia, baſi interiori florifera.) (P.) Flor. dan. t. 195.

Habitat circa Petropolim in fundis lacuum. Floret Iulio. 2 Полушилица озерная. Russ. Sobol.

MUSCI.

I.

Frondoſi petalo calyptrato ſtyligero, baſi dehiſcente; capſula operculata. Hedwigii.

SPHAGNUM. Flos malculus? clavatus: antheris planis, (e ramulis ſuperioribus.) Capſulae in eadem planta; operculatae ſeſſiles ſine calyptra integra: ore laevi.

686. SPHAGNUM PALUSTRE. Ramis deflexis. (Foliis ovato-carinatis, reticulato punctatis pellucidis. Capſulae diſſiliunt cum ſono et crepitu.) (G.) Flor. dan. t. 474.

Habitat ubique in paludibus. In diſtrictu coporienſi integras paludes tegit. Variet etiam colore rubro. Floret Iunio, Iulio. ♃ Moxb. Russ. Мохъ обыкновенный. Sob.

FONTINALIS. Gemma in eadem planta cum capſula ſubſeſſili perichaetiis imbricato-obvoluta et calyptra minuta.

687. FONTINALIS PENNATA. Foliis bifariis patentibus, antheris (capſulis) lateralibus. Lin. (R.) Dillen. muſc. 250. t. 32. f. 9.

Habitat in ſylvis umbroſis humidis ad trrncos arborum circa Petropolim. Floret Aprili. ♃ источница перистая. Russ. Sob.

BUXBAUMIA. Gemma orbicularis. Capſula pedunculata: periſtomate externo ſexdecim dentato: interno membranaceo plicato.

688. BUXBAUMIA APHYLLA. Aphylla, pedunculo elongato. (R.)

Habitat in ſylvis diſtrictus Carelienſis. Floret Iunio. ♃ Мохъ безлиſтный. Russ. Soъ.

SPLACHNUM. Gemma orbicularis, terminalis. Capſula in alia planta cylindrica cum calyptra et apophyſi maxima: periſtomate octodentato.

689. SPLACHNUM AMPULLACEUM. Umbraculo ampullaceo obconico. (G.) Flor. dan. t. 822.

In paluſtribus circa Kalinkinam et Caterinhoffium. Floret Iunio, Iulio. ♃ Мохъ пузыриſтый. Russ. Sob.

POLYTRICHUM. Gemma orbicularis, terminalis. Capſula in alia planta calyptra munita, periſtomatis externi dentibus triginta duobus.

690. POLYTRICHUM COMMUNE. Surculo ſimplici prolifero, foliis lineari lanceolatis, ferrulalatis, capſulis oblongis tetraëdris, calyptris villoſis. (G.) Hedwig. hiſt. muſc. frond. 1. t. 9. f. 62 - 64. et 2. t. 7. f. 37. Adianthum aureum, officin.

In locis humidis circa Murinam, et ad Cemeterium ſti. Iohannis integros colliculos veſtit. Floret Majo. ♃ Кокушкинъ ленъ обыкновенный. Russ. Sob.

691. POLYTRICHUM JUNIPERINUM. Surculo ſimplici prolifero, foliis lineari-lanceolatis integerrimis mucronatis, capſulis oblongis tetraëdris: calyptris villoſis. (Sob.) Flor. dan. t. 195.

Habitat in uliginoſis et umbroſis Pargelovii, et Murinae. Floret Majo. 24 Кокушкинъ ленъ гладколистый. Russ. Sob.

692. POLYTRIBHUM PILIFERUM. Surculo ſimplici, foliis lanceolatis integerrimis, apice piliferis, capſulis cylindricis: operculi acumine longe producto: calyptris villoſis. P. commune γ. Linn. (Sob.) Dillen. muſc. t. 54. f. 3.

Habitat in locis turfaceis circa Monaſterium Alexandronewsky. Floret Aprili, Majo. 24 Кокушкинъ ленъ волосковатый. Russ. Sob.

693. POLYTRICHUM UNDULATUM. Surculo ſimplici, foliis lanceolatis ſerratis undulatis, capſulis cylindricis: operculi acumine longe producto; calyptris dimidiatis glabris. Bryum undulatum. Linn. (R.) Hedwig. crypt. 2. p. 46. t. 15. /3

Habitat in ſylvis humidis. Floret Majo. Кокушкинъ ленъ волнистый. Russ. Sob.

MNIUM. Gemma orbicularis, rarius capitata. Capſulae, ut plurimum in alia planta, calyptra munitae: periſtomatis dentibus ſexdecim, rarius quatuor.

I.

Gemmis capſulisque in eadem planta. Periſtomate interno ciliis ſexdecim membranaceis planis. Funaria, ſeu Koelreutera.

Obſerv. Muſci frondoſi Hedwigii omnes ſunt, ut videt. perennes, florent primo vero et autumno, in his regionibus, in temperatioribus vero plurimi hyeme.

694. MNIUM HYGROMETRICUM. Surculo subsimplici, foliis oblongis acuminatis, capsulis ovatis nutantibus: operculis planis. (R.) Flor. dan. t. 648.

Habitat in sylvis apricis circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ водомѣрный. Russ. Sob.

2.

Gemmis capsulisque in diversa planta, illis capitatis harum peristomate simplici; peristomatis dentibus quatuor. Tetraphis, sive Georgia.

695. MNIUM PELLUCIDUM. Surculo simplici, foliis ovatis, capsulis cylindricis. (R.) Flor. dan. t. 300.

In uliginosis circa Petropolim. Floret Aprili. Звѣздочный мохъ прозрачный.

3.

Peristomatis dentibus sexdecim. Dicranum.

696. MNIUM PURPUREUM. Surculo ramoso, foliis oblongis acutis carinatis, capsulis subcylindricis, setis axillaribus. (R.) Dillen. musc. t. 49. f. 51.

In pratis et pascuis. Floret. Majo. Звѣздочный мохъ пурпуровый. Russ. Sob.

697. MNIUM SCOPARIUM. Surculo ramoso, foliis lineari-lanceolatis recurvis secundis, capsulis erectis, oblongo-cylindricis-operculis conicis acuminatis. Olim Bryum scoparium. Linn. (G.) Hedwig. fund. hist. musc. frond. 2. t. 8. f. 41. 42.

In ſylvis inſulae Baſileenſis et paſſim. Floret Majo. Звѣздочный мохъ вѣничный Russ. Sob.

698. MNIUM HETEROMALLUM. Surculo ſimplici, foliis ſetaceis recurvis, capſulis ovatis: operculis acuminatis recurvis. Bryum heteromallum. Linn. (G.) Hedw. crypt. 3. p. 72. 4. 26.

Ad foſſas viarum. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ разносторонный. Russ. Sob.

4.

Periſtomate interno e membrana ciliis difformibus.

699. MNIUM FONTANUM. Surculo ſubramoſo erecto, foliis lanceolatis apice ſetaceis incurvis, capſulis ſubrotundis obliquis: operculo conico umbilicato obtuſo. (R.) Flor. dan. t. 299.

Habitat ad fontes et rivulos paludoſos. Floret Majo. Звѣздочный мохъ ручейный. Russ. Sob.

700. MNIUM PALUSTRE. Surculo ramoſo dichotomo, foliis ſubulatis acutis carinatis, capſulis oblongis; operculis conicis. (R.) Dillen. muſc. t. 31. f. 3.

In paludibus frequens eſt. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ болотный. Russ. Sob.

701. MNIUM CAESPITITIUM. Capſulis pendulis, foliis lanceolatis acuminato-ſetaceis, pedunculis longiſſimis. (R.) Hedwig. fnnd. hiſt. muſc. frond. 2. 4. 3. f. 12. et. 4. 10. f. 67.

5.

702. MNIUM SERPYLLIFOLIUM. Capſulis cernuis, pedunculis aggregatis, foliis obovatis inte-

gerrimis obtusis punctatis. (G.) Dillen. musc. t. 53. f. 81.

Habitat in monte Duderovo, et in insulis apothecaria lapidea, Basileensi que frequens est. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ кругло-листный. Russ. Sob.

703. MNIUM CUSPIDATUM. Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis foliis ovatis acutis serratis. (G.) Vaill. paris. 26. f. 18.

In sylvis humidis passim. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ остролистый. Russ. Sob.

704. MNIUM PROLIFERUM. Capsulis nutantibus pedunculis aggregatis, foliis rosaceo-congestis lanceolatis acutis. (G.) Dillen. musc. t. 52. f. 77.

Habitat in sylvis humidis, et hortis. Floret Aprili, Majo. Звѣдочный мохъ плодовитый. Russ. Sob.

705. MNIUM UNDULATUM. Capsulis nutantibus, pedunculis aggregatis, foliis oblongis undulatis serrulatis. (Sob.) Dillen. musc. t. 52. f. 76.

Habitat in memoribus humidis circa fabricam pyriam Ochtensem et passim. Floret Aprili, Majo. Звѣздочный мохъ волнистый. Russ. Sob.

BRYUM. Gemmae saepe axillares, nunc in alia, nunc in eadem planta cum capsulis calyptra munitis, pedunculo terminali ex tuberculo exeunti insidentibus.

1.

Gemmis conſpicuis nullis. Webera

706. BRYUM POMIFORME. Surculo ramoſo, foliis lineari-lanceolatis ſeta terminatis imbricato-patulis, capſulis ſphaericis: operculo plano. (G.) Dill. muſc. t. 44. f. 1.

Habitat circa Murinam in ſylvis, et paſſim. Floret Majo. Узловый мохъ яблочковый. Russ. Sob.

707. BRYUM MNIOIDES. Surculo ſubſimplici, foliis linearibus, capſulis pyriformibus nutantibus: operculis conicis. Olim Mnium pyriforme. Linn. (G.) Hedwig. Cryptog. 1. t. 3. et fundam. hiſt. muſc. frond. 1. t. 3. f. 12.

Habitat in ſylvis ad Saxa. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ грушкоголовый. Russ. Sob.

2.

Periſtomate ſexdecim-dentato, ſimplici; gemmis axillaribus. Leerſia.

708. BRYUM PULVINATUM. Surculo ramoſo, foliis oblongis piliferis, capſulis, ſubrotundis nutantibus: calyptris minutis. (R.) Dillen. muſc. t. 50. f. 65.

Habitat in tectis et ſaxis. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ пыльный.

3.

Periſtomate praeter dentes ciliis ſpiraliter convolutis munito: Tortula.

709. BRYUM SUBULATUM. Surculo breviſſimo ſimplici, foliis ovatis obtuſiuſculis, capſulis cy-

lindricis: operculo conino acuto. (R.) Hedwig. fund. hiſt. muſc. frond. 2. t. 8. f. 38 - 40.

Habitat in pratis et ſylvis humidis circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ шилистый. Russ. Sob.

4.

Gemmis in alia, capſulis in alia planta; periſtomate nudo : Gymnoſtomum.

710. BRYM TRUNCATULUM. Foliis explanatis mucronatis, capſulis truncatis. (R. B.) Hedwig. crypt. 1. p. 13. t. 5.

Habitat ad agros, foſſas, et ſepes. Floret Majo. Узловый мохъ тупоголовый. Russ. Sob.

5.

Periſtomate ſexdecimdentato, ſimplici; gemmis ſparſis : Grimmia.

711. BRYUM APOCARPUM. Capſulis ſeſſilibus terminalibus, calyptra minima. (B. R.) Hedwig. crypt. 1. 4. p. 104. t. 39.

Habitat ad truncos arborum. Floret Aprili. Узловый мохъ верхоголовый. Russ. Sobol.

712. BRYUM SETACEUM. Foliis ſetaceis, capſulis pyriformibus : pedunculis recurvatis. Olim Mnium ſetaceum. Linn. (R.) Hedwig. crypt. 4. p. 102. t. 38.

Habitat in aggeribus, ſepibus et muris ſaxiſque, circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ щетинистый. Russ. Sob.

6.

Gemmis terminalibus capitatis. Weiſſia.

713. BRYUM VIRIDULUM. Capſulis ovatis erectis, foliis lanceolatis acuminatis imbricato patulis. (Folia viridiſſima. Capſulae flaveſcentes, ciliatae.) (G.) Curtis Flor. Londin. 132. *a.*

Habitat in agris, et aggeribus. Locis ſiccis delectatur et terram tapetis inſtar tegit. Узловый мохъ зелененькій. Russ. Sobol.

7.

Periſtomate interno ciliato, ciliis ſpiraliter convolutis. Barbula.

714. BRYUM RURALE. Surculo ramoſo, foliis reflexis obovatis obtuſis apice piliferis, capſulis cylindricis: operculis conicis acutis. (G.) Dillen. muſc. t. 45. f. 12.

Habitat in truncis arborum et tectis ruſticorum. Circa montem Duderovum, et paſſim. Floret Majo. Узловый мохъ деревенскій. Russ. Sob.

8.

Ciliis difformibus e membrana carinata.

715. BRYUM ANDROGYNUM. Surculo ramoſo erecto, foliis lanceolatis patulis, capſulis cylindricis: opecrulis acuminatis, ſeta terminali. Olim Mnium androgynum. Linn. (G.) Flor. dan. t. 299.

In ſylvis humidis frequens. Floret Aprili, Majo. Узловый мохъ мужноженскій. Russ. Sob.

716. BRYUM SQUARROSUM. Capſulis obliquis, foliis quinquefariis imbricatis recurvis, caule ferrugineo tomentoſo. (G.) Buxb. cent. 4. t. 65. f. 1.

In pratis humidis circa Caterinhoffium et paſſim. Floret Majo. Узловый мохъ шелушчатый. Russ. Sob.

HYPNUM. Gemmae in alia ut plurimum planta. Capſulae pedunculo laterali ex perichaetio prodeunti inſidentes: periſtomate exteriori ſexdecim-dentato.

I.

Gemmis capſulis que in eadem planta, periſtomate ſimplici. Fiſſidens.

Fronde pinnata.

717. HYPNUM TAXIFOLIUM. Fronde ſimplici baſi ſetifera: pinnis oblongis acutis, capſulis oblongis: operculo acuminato. (B. R.) Flor. dan. t. 473. f. 2.

Habitat in ſylvis umbroſis circa Petropolim. Floret Majo. Сучковый мохъ тисолистый. Russ. Sob.

718. HYPNUM BRYOIDEES. Fronde ſimplici apice ſetifera: pinnis oblongis acutis; capſulis oblongis: operculis acutis. (B. R.) Flor. dan. t. 473. f. 1.

In umbroſis paſſim. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ узловатый. Russ. Sob.

2.

Gemmis in alia, capſulis in alia planta, periſtomatis interni ciliis apice liberis. Neckera.

719. HYPNUM DENDROIDES. Surculo erecto inferne nudo ſuperne faſciculato ramoſo folioſo, foliis linearilanceolatis imbricatis, capſulis ſubcylindricis erectis: operculi roſtello incurvo. (B. R.) Flor. dan. t. 823. f. 2.

In pratis ſylvisque ſubhumidis paſſim. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ древообразный. Russ. Sob.

720. HYPNUM CURTIPENDULUM. Surculis erectis ramoſis teretibus folioſis, foliis oblongo-ovatis acutis imbricatis, capſulis nutantibus ovatis: operculis acuminatis. (B. R.) Dillen. muſc. t. 43. f. 69.

Habitat ad radices arborum et ſaxorum. Floret Majo. Сучковый мохъ висячеголовый. Russ. Sobol.

721. HYPNUM SERICEUM. Surculo ramoſo repente, foliis oblongis ſeta terminatis ante imbricatis, capſulis erectis cylindricis: operculis acuminatis recurvis. (G.) Curtis fl. Londin. t. 126.

Habitat in pratis ſiccis et ad truncos arborum. Floret Majo. Сучковый мохъ шелковистый. Russ. Sob.

3.

Periſtomatis internis ciliis uniformibus baſi membranacea connexis. Leskea.

722. HYPNUM FILIFOLIUM. Surculis ramoſis; ramis breviſſimis, foliis ſubulatis acutis, capſulis

oblongis: operculis conicis obtuſis. (B. R.) Dillen. muſc. t. 42. f. 62.

Habitat ad radices arborum in humidis. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ нитчатый. Russ. Sob.

723. HYPNUM COMPLANATUM. Frondibus complanatis ramoſiſſimis, foliis diſtichis imbricatis ovato-obtuſis complicatis, capſulis ovatis: operculo conico. (B. R.) Dillen. muſc. t. 34. f. 7.

Habitat at truncos arborum paſſim. Floret Majo. Сучковый мохъ сплюснутый. Russ. Sob.

724. HYPNUM SERPENS. Surculis repentibus filiformibus, foliis ſetaceis, capſulis cylindricis inflexis: operculo conico. (B. R.) Dillen. muſc. t. 42. f. 65. A.

Habitat ad ligna, ſaxa, caudices arborum. Floret Majo. Сучковый мохъ ползучій. Russ. Sob.

4.

Surculis vagis.

725. HYPNUM FLUITANS. Surculis ramoſis, foliis ovatis acutis patulis. Capſulis oblongis obliquis: operculis conicis. (G.) Wilden. prodr. fl. berol. n. 957.

Habitat ad ripas humidas et rivulos. Floret Majo. Сучковой мохъ плывущій. Russ. Sob.

726. HYPNUM TRIQUETRUM. Ramis recurvis, foliis ovatis recurvatis patulis, ſurculis pinnatis. (B. R.) Dillen. muſc. t. 38. f. 28.

Habitat in pratis et ſylvis humidis. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мохъ троесторонній. Russ. Sob.

5.

Surculis pinnatis.

727. HYPNUM FILICINUM. Surculo ſimpliciter pinnato, foliis oblongis acuminatis reflexis ſecundis, capſulis ſubcylindricis: operculis convexis. (G.) Dillen. muſc. t. 36. f. 19.

Paſſim in ſylvis humidis. Floret Majo. Сучковый мохъ папоротный. Russ. Sob.

728. HYPNUM PROLIFERUM. Surculis proliferis plano-pinnatis, pedunculis aggregatis. (G.) Curtis fl. Londin. t. 9.

Habitat in truncis arborum circa limites diſtrictus coporienſis et Jamburgenſis, et paſſim. Floret Majo. Сучковый мохъ плодовитый. Russ. Sob.

729. HYPNUM PRAELONGUM. Surculis ſubpinnatis decumbentibus: ramulis remotis, foliis ovatis, capſulis cernuis. (G.) Dillen. muſc. t. 35. f. 15.

Habitat in ſylvis humidis. Floret Majo. Сучковый мохъ предлинный. Russ. Sob.

730. HYPNUM CRISTA CASTRENSIS. Ramulis approximatis; apicibus recurvis. (B. R.) Dillen. muſc. t. 36. f. 20.

Habitat ad radices abietinos. Floret Majo et Septembri. Сучковый мохъ, военное перо. Russ. Sob.

6.

Surculorum foliis reflexis.

731. HYPNUM CUPRESSIFORME. Surculis subpinnatis, foliis secundis recurvis apice subulatis. (B. R.) Dillen. musc. t. 37. f. 23.

Habitat in sylvis ad arborum truncos, et radices. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ кипарисный. Russ. Sob.

732. HYPNUM SQUARROSUM. Surculis ramosis, foliis lanceolatis acutis, capsulis oblongis: operculis acutis. (B. R.) Flor. dan. t. 535. f. 2.

In nemoribus subhumidis. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ шелушчатый. Russ. Sob.

7.

Surculis fasciculatis.

733. HYPNUM ALOPECURUM. Surculo erecto-ramis fasciculatis terminalibus subdividis, capsulis subnutantibus. (B. R.) Dillen. musc. t. 41. f. 49.

In sylvis humidiusculis. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мохъ лисехвостый. Russ. Sob.

8.

Surculis teretiusculis.

734. HYPNUM PURUM. Surculis pinnato-sparsis subulatis, foliis ovatis obtusis subulatis. (B. R.) Curtis flor. Londin. t. 207.

Habitat in nemoribus et pratis pascuis. Floret Majo. Сучковый мохъ чистый. Russ. Sob.

735. HYPNUM RIPARIUM. Surculis teretibus ramoſis, foliis acutis patulis diſtantibus. (B. R.) Flor. dan. t. 649. f. 1.

Habitat ad ripas Nevae fluvii. Floret Aprili, Majo. Сучковый мохъ береговый. Russ. Sob.

736. HYPNUM CUSPIDATUM. Surculis pinnato-ramoſis apice longe cuſpidatis, foliis oblongo-acuminatis, capſulis cylindricis: operculis conicis. (B. R.) Dillen. muſc. t. 39. f. 34.

Habitat in paludibus paſſim. Floret Aprili et Septembri. Сучковый мохъ остроконечный. Russ. Sob.

9.

Surculis confertis.

737. HYPNUM VELUTINUM. Surculo repente: ramis confertis erectis, foliis ſubulatis, capſulis ſubnutantibus. (G.) Flor. dan. t. 475.

Habitat in tectis vetuſtis et muris. (G.) In ſylvis umbroſis ad radices arborum, Murine et Pargelovii. (Sob.) Сучковый мохъ бархашный. Russ. Sobol.

II. Muſci hepatici, petalo calyptrato ſtyligero, ex apice dehiſcente; capſula quadrivalvi. Hedwigii.

JUNGERMANNIA. Scyphuli veſiculiferi ſquamulae gemmiferae laterales aut capitula pulverulenta. Capſula pedunculata, nuda, quadrivalvis: ſeminibus ſubrotundis.

* Cauleſcentes, frondibus compoſitis, pinnatis.

738. JUNGERMANNIA BIDENTATA. Surculis procumbentibus ramoſis apice pedunculiferis; pinnis ovatis bicuſpidatis: ſtipulis lanceolatis quadridentatis. (R.) Dillen. muſc. 15. t. 70. f. 11.

Habitat in umbroſis ericetis cira Petropolim. Floret Majo. Тѣнный мохъ двузубистый. Russ. Sob.

739. JUNGERMANNIA BICUSPIDATA. Frondibus medio pedunculiferis: pinnis diſtichis inciſo-bifidis. (R.) Dillen. muſc. t. 70. f. 13.

Habitat in umbroſis humidis. Floret Majo. Тѣнный мохъ двуострѣйный. Russ. Sob.

** Frondibus ſubbipinnatis.

740. JUNGERMANNIA REPTANS. Surculis decompoſitis medio pedunculiferis, foliis quadratis anterius inciſis: ſtipulis quadrifidis (R.) Dillen. muſc. t. 71. f. 24.

Habitat in ericetis udis. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ ползущій. Russ. Sobol.

*** Frondibus imbricatis.

741. JUNGERMANNIA COMPLANATA. Surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-imbricatis, ramis aequalibus. (R.) Curtis Flor. Londin. t. 271.

Habitat ad truncos et radices arborum. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ сплюснутый. Russ. Sob.

742. JUNGERMANNIA DILATATA. Surculis repentibus, foliis inferne auriculatis duplicato-

imbricatis, ramis apice latioribus. (R.) Dillen. muſc. t. 72. f. 27.

Adtruncos arborum in ſylvis umbroſis. Floret Majo. Тѣнный мохъ розширенный. Russ. Sob.

743. JUNGERMANNIA TAMARISCIFOLIA. Surculis decompoſitis apice pedunculiferis, foliis ſubrotundis ſubtus auriculatis : ſtipulis ovatis emarginatis. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 72. f. 31.

Habitat ad truncos arborum in monte Duderovo, et Murinae. Floret Aprili, Majo et Septembri. Тѣнный мохъ гребенщиколистый. Russ. Sob.

744. JUNGERMANNIA PLATYPHYLLA. Surculis procumbentibus ſubtus imbricatis, foliis cordatis acutis. (R.) Dillen. muſc. t. 72. f. 32. 33.

Habitat in ſylvis circa Petropolim. Floret Aprili, Majo. Тѣнный мохъ широколистый. Russ. Sob.

745. JUNGERMANNIA CILIARIS. Surculis repentibus ſupra tomentoſis, foliis integris tomentoſiſſimis. (Sob.) Villant. flor. Pariſ. t. 26. f. 11.

Habitat ad truncos arborum betulae in inſula apothecaria, et lapidea, et paſſim. Floret Aprili, Septembri. Тѣнный мохъ реснистый. Russ. Sob.

746. JUNGERMANNIA PUSILLA. Surculis breviſſimis apice floriferis, foliis imbricatis antherius crenatis, cauliculo ſubtus villoſo. (R. Sob.) Dillen. muſc. t. 74. f. 46.

Habitat in ericetis humidis circa Murinam. Floret Majo. Тѣнный мохъ мѣлкій. Russ. Sob.

*** Acaules.

747. JUNGERMANNIA EPIPHYLLA. Foliolo frondi innato. (R.) Flor. dan. t. 359.

Habitat in ripis umbrosis udis Nevae fluvii Floret Aprili. Тѣнный мохъ верхолистый. Russ. Sob.

748. JUNGERMANNIA PINGUIS. Fronde oblonga sinuata pingui. (R. Sob.) Dillen. musc. t. 74. f. 42.

Habitat in paludibus et ad rivulos circa fabricas lateriiias, et porcellaneam. Floret Aprili, Majo et Septembri. Тѣнный мохъ жирный. Russ. Sob.

MARCHANTIA. Capsula sessilis, campanulata. Gemma peltata pedunculata, inferne seminifera. (Filamentum unum.)

749. MARCHANTIA POLYMORPHA. Surculis obtuse lobatis, capsulis stellatim decemfidis. (Ex antheris proliferis exit lana lutea quae sponte movetur in anthera, dum pollen atomi instar exstillat. D. Sahlberg.) (G.) Schmidel ic. plant. et anal. part. t. 9.

Habitat in sylvis umbrosis humidis, et hortis cultis, juxta aquas, in que Scaturiginibus passim. Floret Iulio, Augusto. ♃ Лепесточница многообразная. Russ. Sob.

Observatio. Omnes Jungermanniae sunt perennes, aut durant per plures annos, et florent primo vere, et profundo autumno; in regionibus temperatioribus hyeme.

750. MARCHANTIA UMBELLATA. Capſulis multilobis: pedunculo tetraëdro. (Sob.) Dillen. muſc. t. 76. f. 6. C. D. et t. 77. f. 7. D.

Rabitat in inſulae apothecariae rivulo umbroſo, paludoſo verſus inſulam lapideam, et in monte Pulcovo circa et intra puteum, alibique frequens. Floret Iulio. ♃ Лепесточница шапковидная. Russ. Sob.

751. MARCHANTIA HEMISPHAERICA. Surculis crenatis, capſulis hemiſphaericis quinquefidis. (Capitulum hemiſphaericum ſubtus globulis quinque diſſilientibus pollenque effundentibus.) (Sob.) Flor. dan. t. 762.

Habitat in foſſis circa Noſocomia terreſtre, et maritimum atque in paludoſis paſſim. Floret Aprili. ♃ Лепесточница полукруглая. Russ. Sob.

ALGAE.

BLASIA. Flos maſculus? ſeſſilis, ſubgloboſus, frondi immerſus.

Flos foemineus? Piſtillum unum. Capſula ovata, unilocularis, tubo coronata, per quem ſemina Prorumpunt.

752. BLASIA PUSILLA. Bl. fronde lobata, lobis ſubrotundis, nervis ſetiferis. Hall. B. puſilla lichenis pixidati facie. Michel. (R.) Flor. dan. t. 45.

Habitat ad latera foſſarum arenoſa Caterinhoffii. Floret Iulio. an. ♃? Пидлепесточница мѣлкая. Russ. Sob.

RICCIA. Capſulae ſeſſiles, globoſae, uniloculares, frondi ad apicem innatae, ſemina viginti ad triginta alba vel fuſca hemiſphaerica continentes.

753. RICCIA CRYSTALLINA. Frondibus ſuperficie papilloſis, (margine incraſſatis, reticulatis, denticulatis, obtuſis, ſimplicibus et cordatis.) (R. Sob.) Dillen. muſc. t. 78. f. 12.

Habitat in inſula Beſileenſi, et Caterinhoffii locis umbroſis ſubhumidis. Floret Iulio, Auguſto. an. 2? Решетница хрустальная. Russ. Sob.

754. RICCIA MINIMA. Frondibus glabris bipartitis acutis. (Nitida, ſegmentis anguſtioribus, ſuper terram expanſis. Eſt tantum varietas Ricciae glaucae obſervante D. Schmidelio.) (R. Sob.) Dillen muſc. t. 78. f. 11.

Habitat in ripis Nevae fluvii inundatis. Floret Iunio. an. 2? Решетница малѣйшая. Russ. Sob.

755. RICCIA FLUITANS. Frondibus dichotomis lineari-filiformibus, (lineari-ramoſis, planis, primordialibus obtuſis.) (L.) Dillen. muſc. t. 74. f. 47.

Habitat in foſſis ad ripas ſupra aquam extenſa. Floret Iunio, Iulio. an. 2? Решетница волненная. Russ. Rob.

ANTHOCEROS. Scyphuli ſeſſiles, cylindrici integras gemmas granuloſas exhibentes. Capſula ſubulata, ſubbivalvis: ſeminibus diſſepimento adhaerentibus.

756. ANTHOCEROS LAEVIS. Fronde plana crenata. (A. frondibus indivisis sinuatis laevibus. Leers. — Folia in caespites orbiculatos congeruntur, superne concava, ovalia aut subrotunda, margine leviter sinuata, laete viridia, splendentia, glabra. Cornu e perichaetio cavo surgit, erectum, teres, filiforme, glabrum, laeteviride, apice flavicans, maturitate inchoante dissiliens, et filamentum valvas interstinguens.) (R.) Dillen. musc. t. 68. f. 2.

Habitat in nemoribus Caterinhoffii. Floret Majo. an. 2? Цѣѣторогъ гладкій. Russ. Sob.

LICHEN. Receptaculum seminum subrotundum, planiusculum, verruciforme, tuberculosum, scutellatum aut peltatum. (saepe marginatum.)

I.

Leprosi tuberculati. Verrucariae.

757. LICHEN SCRIPTUS. Albicans lineolis atris planis divisis simplicibusque. (Sob.) Hofman. lichen. t. 11. f. 2. a. b. c. d. et

β.) Lichen hebraicus. Hoffm. lichen. p. 13. t. 3. f. 2. e.

γ.) Lichen pulicaris. Hoffm. lichen. p. 14. t. 3. f. 2. f.

Obsevatio. Lichenes videntur esse fere omnes Longaevi sive perennes, et florent primo vere vel autumno, in regionibus vero temperatioribus etiam hyeme, aut potius omni tempore.

Habitat in corticibus arborum, praecipue Alni, Sorbi aucupariae et Populi tremulae, paſſim. Лишай, ſive поростъ. Russ. Лишай писменный. β. Лишай Еврейскій. γ. Лишай блошный. Sob:

758. LICHEN RUGOSUS. Albicans, lineolis ſimplicibus punctis que nigris confertis. (R.) Dillen. muſc. t. 18. f. 2.

Habitat in ſylvis ſupra arborum truncos. Лишай морщиноватый. Russ. Sob.

759. LICHEN ATROVIRENS. Viridis, margine tuberculis que atris. (Sob.) Wulfen. ap. Iacq. coll. 11. t. 14. f. 2.

Habitat in ſaxis antiquis circa fabricam pyriam Ochtenſem. Лишай чернозеленый. Russ. Sob.

760. LICHEN BYSSOIDES. Farinoſus, peltis ſtipitatis ſubgloboſis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 14. f. 5.

In Saxis antiquis graniticis et in terra nuda, Pargelovii, et ultra Ochtam. Лишай шелковистый Russ. Sob.

761. LICHEN ERICETORUM. Albidus, tuberculis ſtipitatis convexis carneis. (Sob.) Hoffm. lich. t. 8. f. 3.

Habitat in ericetis paſſim. Лишай вересный. Russ. Sob.

762. LICHEN LACTEUS. Albus, tuberculis concoloribus haemiſphaericis. (Sob.) Wulffen. ap. Iacq. coll. 3. t. 4. a. b.

Habitat in lapidibus aëri expoſitis, et rupibus atque in lignis ſemiputridis. Лишай молочный. Russ. Sob.

763 LICHEN RUPICOLA. Albidus, tuberculis pallidis albo-marginatis. (Sob.) Hoffm. lich. t. 6. f. 3.

Habitat in ſaxis, ad littora marina. Лишай каменогорный. Russ. Sob.

764. LICHEN PERTUSUS. Verrucis ſubteſſellatis laevigatis pertuſis, poro uno alterove cylindrico. (Sob.) Flor. dan. t. 766.

Habitat in corticibus arborum et in lapidibus. Лишай проколотый. Russ. Sob.

765. LICHEN SANGVINARIUS. Cinereo vireſcens, tuberculis atris. (Tubercula majuſcula, gibba, atra, at diffracta intus rubra ſunt.) Wullffen. ap. Iacq. coll. 3. t. 5. f. 3. b.

Habitat in truncis arborum et ſaxis circa pagum Rjabova, et Pargelovii. Лишай кровавистый. Russ. Sob.

766. LICHEN FUSCO-ATER. Fuſcus tuberculis atris. (Sob.) Wullffen. ap. Iacq. coll. 2. t. 14. f. 3. 4. et 3. t. 6. f. 2. bb.

Habitat ad ſaxa antiqua Peterhoffii. Лишай темночерный. Russ. Sob.

767. LICHEN CALCAREUS. Candidus, tuberculis atris. (R.) Dillen. muſc. t. 18. f. 8.

Habitat in rupibus circa Peterhovum. Лишай известочный. Russ. Sob.

768. LICHEN NIGER. Ater, tuberculis ſubrotundis concoloribus. (Sob.) Flor. dan. t. 879. f. 1.

Habitat in ſaxis circa Strelinam, et Oranienbaumium. Лишай черный. Russ. Sob.

769. LICHEN FAGINEUS. Albus, tuberculis albis farinaceis. (Sob.) Hoffm. lichen. t. 2. f. 4.

Habitat in truncis arborum. Лишай вязовый. Russ. Sob.

2.

Scutellato - tuberculati.

770. LICHEN CANDELARIUS. Cruſtaceus luteus: junior pulverulentus ſcutellatus; aetate ſubfoliaceus tuberculoſus. (Sob.) Hoffm. lichen. 2. t. 9. f. 3.

Habitat in truncis arborum, in parietibus et ſepimentis ligneis ac tectis domorum antiquis. Лишай свѣчный. Russ. Sob.

3.

Scutellati. Scutellariae.

771. LICHEN SUBFUSCUS. Cruſtaceus albicans, ſcutellis ſubfuſcis; margine cinereo ſubcrenato. (R.) Wilden. prodr. flor. berol. n. 1005.

Habitat in truncis arborum et rupibus ſaxoſis. Лишай темноватый. Russ. Sob.

772. LICHEN SALICINUS. Flavus, ſcutellis convexiuſculis aurantiis margine pallidioribus. (Sob.) Schrader.

Habitat in truncis annoſis ſalicum circa viam Sarſcoſelienſem. Лишай вербовный. Russ. Sob.

773. LICHEN PALLESCENS. Cruſtaceus albicans aerrucoſus, ſcutellis pallidis. (Sob.) Wullffen. vp. Iacq. coll. 3. t. 5.

Habitat in corticibus arborum in Oſinova Roſchcza et Pargelovii. Лишай блѣднѣющій. Russ. Sob.

774. LICHEN CORALLINUS. Ramoſus teres faſciculatus faſtigiatus confertiſſimus albus ſcutellis terminalibus minutiſſimis concoloribus. (Sob.) Wulffen. ap. Iacq. coll. 2. t. 13. f. 2.

Habitat in rupibus ac lapidibus Peterhoffii in monte prope quercum cavernoſam antiquiſſimam, et ad littus marimum prope Oranienbaum. Лишай коральковый.

775. LICHEN VERRUCOSUS. Crustaceus cinereus, ſcutellis vireſcentibus. (Sob.) Dillen· muſc. t. 18. f. 9.

Habitat in ericetis, terreſtris, ad viam Wiburgenſem, prope pargelovium, et in multis aliis ſylvis ſiccis montoſis. Лишай бородавчатый. Russ. Sob.

4.

Foliacei. Pulmonariae.

776. LICHEN CENTRIFUGUS. Foliolis obſolete multifidis laevibus albidis centrifugis, ſcutellis rufo-fuſcis. (Sob.) Hoffm. lichen. 2. t. 10. f. 3.

Habitat in ſaxis, Pargelovii. Лишай средобѣгущій. Russ. Sob.

777. LICHEN STELLARIS. Foliolis oblongis laciniatis anguſtis cinereis ſcutellis pullis. (G.) Hoffm. lichen. 2. t. 13. f. 1. 2.

Habitat in truncis et ramis arborum praeſertim abiegnis paſſim. Лишай звѣздочный. Russ. Sob.

778. LICHEN PULLUS. Foliolis lobatis olivaceis ſcutellis integerrimis. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 13. f. 4. B.

Habitat in corticibus arborum circa viam Sarſcoſelienſem. Лишай темный. Russ. Sob.

779. LICHEN OLIVACEUS. Foliolis lobatis nitidis olivaceis ſcutellis crenatis. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 13. f. 5.

In truncis et ramis alneis, ſalicinis aliisque paſſim. Лишай оливчатый. Russ. Sob.

780. LICHEN SAXATILIS. Foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis badiis. (Sob.) Hoffm. lichen. 3. t. 15. f. 1.

Habitat paſſim in ſaxis circa viam Peterhoffianam ad ripam maritimam cum lichene paſchali. Лишай каменистый. Russ. Sob.

781. LICHEN PARIETINUS. Foliolis criſpis fulvis, peltis concoloribus. (Sob.) Hoffm. lich. 3. t. 18. f. s.

Habitat in parietibus ligneis, ſepibus que ſuburbiorum, et in lignis corticibus ve arborum, paſſim. лишай стѣнный. Russ. Sob.

782. LICHEN PHYSODES. Foliolis anguſtis apice inflatis, ſcutellis pedicellatis. (G.) Wulf. ap. Jacq. coll. 3. t. 8.

In truncis Belulae vulgatiſſimus. лишай надутый. Russ. Sob.

783. LICHEN ATRATUS. Scutellis atratis concoloribus. (Sob.) Hedwig. Cryptogam. II. 3. t. 21. f. A.

Habitat in corticibus Alni, Populi et Sorbi aucupariae paſſim. Лишай черненый. Russ. Sob.

5.

Gelatinoſi.

784. LICHEN CRISPUS. Foliolis imbricatis lobatis truncatis crenatis atroviridibus, ſcutellis crenulatis. (Sob.) Wulffen. ap. jacq. coll. 3. t. 10. f. 1.

Habitat in truncis arborum et lapidibus circa Caterinhoffium et Pargelovii. Лишай кудрявый. Russ. Sob.

785. LICHEN FASCICULARIS. Foliaceus erectus, ſcutellis terminalibus: junioribus concavis virescentibus; aetate turbinatis rufeſcentibus. (Sob.) Flor. dan. t. 462. f. 2.

Лишай пучечный. Russ. Sob.

6.

Foliacei laciniоſi.

786. LICHEN CILIARIS. Erectiuſculus, laciniis linearibus ciliatis, ſcutellis pedunculatis crenatis. (Sob.) Flor. dan. t. 711.

Habitat in truncis arborum Caterinhoffii, et Strelinae. Лишай реснистый. Russ. Sob.

787. LICHEN ISLANDICUS. Adſcendes marginibus elevatis ciliatis, peltis terminalibus. (G.) Flor. dan. t. 155. Lichen iſlandicus, officin.

Habitat in ſylvis ſteriliſſimis ſiccis montoſis Pargelovii, in monte Poclonnaja, Oſinovae Roſchczae, ad cimeterium ſti Johannis, et in monte Duderovo aliis que ſimilibus. Terreſtris. Лишай исландскій. Russ.

788. γ LICHEN TENUISSIMUS. LINN. Coralloides tenuiſſimum nigricans, mundi muliebris inſtar textum. (Sob.) Dillen. muſc. 113. t. 17. f. 32.

Habitat Pargelovii ſatis copioſe cum lichene Iſlandico. Лишай тончайшій. Russ. Sob.

789. LICHEN PULMONARIUS. Repens ſupra reticulato-lacunoſus ſubtus fuſco-tomentoſus, peltis marginalibus. (G.) Hoffm. lichen. faſcic. 1. t. 1. f. 2. Pulmonaria arborea, officin.

Habitat in truncis arborum circa Sarſcoje ſelo et paſſim. Лишай грудный. Russ. Sob.

790. LICHEN FURFURACEUS. Decumbens, furfuraceus laciniis acutis ſubtus lacunoſis atris. (G.) Hoffm. pl. lichen. faſc. 2. p. 45. t. 9. f. 2.

Habitat circa Harawaldam et in ſylvis uliginoſis circa Petropolim, et paſſim in corticibus arborum. Лишай отрубяный. Russ. Sob.

791. LICHEN FARINACEUS. Erectus compreſſus ramoſus, verrucis marginalibus farinoſis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 23. f. 63.

In arboribus betulinis inſularum apothecarie et lapideae occurrit, ſed parva quantitate. Лишай мучный. Russ. Sob.

792. LICHEN CALYCARIS. Erectus linearis ramoſus lacunoſus convexus mucronatus. (Sob.) Dillen. muſc. t. 23. f. 62. A. B. C.

Habitat in arboribus et ſaxis circa Peterhoffium. Лишай чашечный. Russ. Sob.

793. LICHEN FRAXINEUS. Erectus oblongus lanceolatus ſublaciniatus lacunoſus glaber, ſcutellis ſubpedunculatis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 22. f. 59.

Habitat in truncis arborum Oſinovae Roſchczae et circa Sarſcoje Selo. Лишай ясеньный. Russ. Sobol.

794. LICHEN PRUNASTRI. Erectiuſculus lacunoſus ſubtus tomentoſus albus. (G.) Dillen. muſc. t. 22. f. 54. 55.

Habitat in arboribus annoſis Pargelovii et Murinae. Лишай терновный. Russ. Sob.

795. LICHEN JUNIPERINUS. Criſpus fulvus, peltis fuſcis. (Sob.) Hoffm. lichen. faſc. 2. p. 35. t. 7. f. 2.

Habitat in juniperetis ad truncos arborum circa Strelinam, et Oranienbaumium. Лишай можжевельный. Russ. Sob.

796. LICHEN CAPERATUS. Pallide viridis rugoſus margine undulatus. (Sob.) Dillen. muſc. 193. t. 25. f. 97.

Habitat ad arborum truncos et in ſaxis paſſim. Лишай сморщенный. Russ. Sob.

797. LICHEN GLAUCUS. Depreſſus lobatus glaber, margine criſpo farinaceo. (Subtus nigricans.) (Sob.) Flor. dan. t. 598.

Habitat in truncis et ramis betulinis, inſylvis et in ſepimentis ligneis hortorum ſuburbanorum. Лишай сизый. Russ. Sob.

7.

Coriacei. Peltigerae.

798. LICHEN APHTHOSUS. Repens lobatus obtuſus planus, verrucis ſparſis, pelta marginali adſcendente. (G.) Flor. dan. t. 767. f. 1. Muſcus cumatilis, officin.

Habitat in ſylva antiqua circa limites diſtrictus Coporienſis et Jamburgenſis, et circa Craſnoje ſelo, terreſtris. Лишай прыщеватый. Russ. Sobol.

799. LICHEN CANINUS. Repens lobatus obtuſus planus, ſubtus venoſus villoſus, pelta marginali adſcendente. (Supra ſaturate viridis, deſiccatione cinereus, ſubtus niveus, longitudinaliter venoſus ſubvilloſuſque, peltis ovalibus adſcendentibus, normaliter concavo-convexis rubris. (G.) Flor. dan. t. 767. f. 2. Muſcus caninus, officin.

Habitat in ſylvis humidis et pratis ubique, praeſertim ad fabricam pyriam Ochtenſem. Лишай собачій. Russ. Sobol.

8.

Umbilicati. Umbilicarie.

800. LICHEN DEUSTUS. Undique laevis, ſupra cinereus, tuberculis nigris. (Sob.) Wulf. ap. Jacq. coll. 3. t. 15. f. 3.

Habitat in corticibus Populi tremulae et in ſaxis, in monte duderovo. Лишай обожженый. Russ. Sobol.

9.

Scyphiferi.

801. LICHEN COCCIFERUS. Simplex integerrimus, ſtipite cylindrico, tuberculis coccineis. (G.) Dillen. muſc. t. 14. f. 7. Muſcus pyxidatus, officin.

Habitat in Pinetis ſterilibus ad radices arborum, uti montem Poclonnaja. Лишай червецоносный. Russ. Sob.

802. LICHEN CORNUCOPIOIDES. Simplex folio breviore, tuberculis coccineis. (R.) Dillen. muſc. t. 14. f. 9.

Habitat in pinetis ſiccis circa Petropolim terreſtris. Лишай изобилорогій. Russ. Sob.

803. LICHEN PYXIDATUS. Simplex crenulatus, tuberculis fuſcis. (G.) Dillen. muſc. t. 14. f. 6. B. C. et f. 8. B.

In pinetis ſiccis ad radices arborum. Лишай коробчатый. Russ. Sob.

804. LICHEN FIMBRIATUS. Simplex denticulatus, ſtipite cylindrico. (R.) Dillen. muſc. t. 14. f. 8. 9.

Habitat in Pinetis montoſis circa Petropolim. Лишай бахромчатый. Russ. Sob.

805. LICHEN GRACILIS. Dichotomo ramoſus tuberculis fuſcis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 14. f. 13. C.

Habitat in ericetis montoſis ſylvaticis, ad viam Wiburgenſem Pargelovii et Oſinovae Roſchczae. Лишай тощій. Russ. Sob.

806. LICHEN DIGITATUS. Ramoſiſſimus: ramis cylindricis, calycibus integris nodoſis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 15. f. 19.

Habitat in pinetis montoſis ſterilibus ad fabricam ferream Debunicam et in declivibus Pargelovii. Лишай перстоватый. Russ. Sob.

807. LICHEN DEFORMIS. Simpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus dentatis. (Sob.) Flor. lapp. t. 11. f. 3.

Habitat in ericetis circa pagum Rjabova et Oſinovae Roſchczae atque Pargelovii. Лишай безобразный. Russ. Sob.

808. LICHEN CORNUTUS. Simpliciuſculus ſubventricoſus, calycibus integris. (G.) Hoffm. plant. lichen. II. 1. p. 1. t. 25. f. 1.

Habitat in pinetis ad arborum radices. Лишай рогатый. Russ. Sob.

10.

Fruticuloſi. Coralloides.

809. LICHEN RANGIFERINUS. Perforatus ramoſiſſimus, ramulis nutantibus. (G.) Variet. *a*) alpeſtris. (cinereus.) Flor. dan. t. 180. (Sob.) β) Sylvaticus. (Candicans, ramis capitatis, corniculis rufescentibus. (Sob.) Flor. dan. t. 539.

Habitat in ſylvis ſterilibus montoſis paſſim, praecipue ad pagum Rjabova, et fabricam pyriam Ochtenſem. Лишай оленій. Russ. Sob.

810. LICHEN UNCIALIS. Perforatus, ramulis breviſſimis acutis. (Sob) Dillen. muſc. t. 16. f. 22.

Habitat in ericetis ſiccis ultra pagum Ochtam. Лишай дюймовый. Russ. Sob.

811. LICHEN SUBULATUS. Subdichotomus, ramis ſimplicibus ſubulatis. (R.) Dillen. muſc. t. 16. f. 26.

Habitat in ſylvis et ericetis paſſim. Лишай шиловатый. Russ. Sob.

812. LICHEN PASCHALIS. Solidus tectus foliolis cruſtaceis. (G.) Flor. dan. t. 251.

Habitat ad fluvium Lugam magna copia, et ad ripam maritimam Strelinae, nec non in montoſis Pargelovii, ſiccis, terreſtris. Лишай воскресный. Russ. Sob.

813. LICHEN FRAGILIS. Solidus, ramulis teretibus obtuſis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 17. f. 34.

Habitat in ſylvis montoſis ſiccis Oſinove Roſchczae ad ſaxa granitica antiquiſſima. Лишай ломкій. Russ. Sob.

II.

Filamentoſi. Uſneae.

814. LICHEN FLORIDUS. Ramoſus erectus, ſcutellis radiatis. (Sob.) Hoffm. pl. lichen. II. 1. t. 30. f. 2. Tenax.

Habitat in ſylvis antiquis Oſinovae Roſchczae ad arborum truncos. Лишай цвѣтный. Russ. Sob.

815. LICHEN PLICATUS. Pendulus, ramis implexis, ſcutellis radiatis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 1. Muſcus arboreus, quercinus, officin.

Habitat in Oſinova Roſchcza et in monte Duderovo, ad truncos arborum annoſarum, in locis umbroſiſſimis. Лишай сплетенный. Russ. Sob.

816. LICHEN BARBATUS. Pendulus ſubarticulatus, ramis patentibus. Longiſſimus cinereus. (Sob.) Dillen. muſc. t. 12. f. 6. Tenax.

Habitat in ſylvis umbroſis antiquis Oſinovae Roſchczae, et montis Duderovi atque ad Pagum Rjabova, ad truncos et ramos abietinos, alioſque. Лишай бородатый. Russ. Sob.

817. LICHEN JUBATUS. Pendulus, axillis compreſſis. (Longiſſimus, Nigricans.) (G.) Dillen. muſc. t. 12. f. 7. Fragilis.

Habitat in ſylvis antiquis umbroſiſſimis ad ramos pini abietis, et ad ſaxa, Oſinovae Roſchczae et montis Duderovi, atque in aliis locis ſimilibus paſſim. Лишай черногривый. Russ. Sob.

818. LICHEN CHALYBEIFORMIS. Ramoſus divaricatus decumbens implicato-flexuoſus. (Sob.) Flor. dan. t. 262. Fragilis.

Habitat in ſylvis umbroſiſſimis Oſinovae Roſchczae et montis Duderovi ad truncos ramoſque arborum, inter lichenes, barbatum alioſque, atque ad ſaxa. Лишай проволочный. Russ. Sob.

819. LICHEN HIRTUS. Ramoſiſſimus erectus, tuberculis farinaceis ſparſis. (G.) Hoffm. pl. lichen. II. 1. p. 17. t. 30. f. 1. Tenax.

Habitat in vetuſtis arboribus paſſim. Лишай шершавый. Russ. Sob.

LEPRA. Wiggers prim. p. 95.

Pulvis ſubtiliſſimus, per lentem e glebis varie formatis conſtans. Wildenow.

820. LEPRA ANTIQUITATIS. Pulvis ater. Byſſus antiquitatis. Linn. (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 18.

Habitat in lignis et lapidibus aëri in ſylvis expoſitis, atque in muris antiquis. Проказа древности. Russ. Sob.

821. LEPRA CINEREA. Pulverulenta cinerea rupes operiens. (Sob.) Byſſus ſaxatilis. Lin. Flor. ſvec. 2. n. 1179.

Habitat in Saxo omni diutiùs aëri expoſito, quod perehni cinereo colore obducit, ipſa vix manifeſta; uti Pargelovii, Peterhovii et ad ripam maritimam Strelinae. Проказа сѣрая. Russ. Sob.

822. LEPRA JOLITHUS. Pulverulenta ſanguinea ſaxis innaſcens, violas olens. (Sob.) Byllus Jolithus. Linn. Flor. dan. t. 899. f. 1.

Habitat in ſylvis opacis circa Oſinova Roſchcza, urbem Gatczinam ac Peterhoffium ſupra ſaxa ante unum alterumve annum everſa et ſupinata. Проказа фіалкокаменная. Russ. Sob.

823. LEPRA FLAVA. Pulverulenta flava lignis adnaſcens. (Sob.) Byſſus candelaris. Linn. Flor. dan. t. 840. f. 2.

Habitat in corticibus arborum, parietibus antiquis, tectis vento humido expoſitis, et lignis in ſylvis dejectis. Проказа желтая. Russ. Sob.

824. LEPRA INCANA. Pulvis albus, globulis rotundatis. (R. Sob.) Byſſus incana. Linn. Dillen. muſc. 3. t. 1. f. 3.

Habitat ad latera foſſarum circa Petropolim et ad vias publicas paſſim. Проказа сѣдая. Russ. Sob.

825. LEPRA BOTRYOIDES. Pulverulenta viridis. (R. Sob.) Byſſus botryoides. Linn. Flor. dan. t. 840. f. 3.

Habitat in terra diutius humida, ut ad lacum Pargelovianum, et in ollis hortulanorum. Проказа зеленая. Russ. Sob.

826. LEPRA LACTEA. Pulvis albus. Wildenow. Byſſus lactea, pulverulento cruſtacea albiſſima. Linn. (Sob.) Flor. dan. t. 740. f. 4.

Habitat frequens in lignis, muſcis et arborum corticibus. Проказа млечная. Russ. Sob.

827. LEPRA RUBENS. Pulvis ruber. Wildenow. (Sob.) Hoffm. enumer. n. 5. Tab. 1. f. 5.

Habitat in corticibus arborum Oſinovae Roſchczae, et ſaepe occurrit in lignis diutius aëri humido expoſitis. Проказа краснѣющая. Russ.

ULVA. Gemmae vel Gongyli rotundi in membrana diaphana.

828. ULVA INTESTINALIS. Tubuloſa ſimplex aequalis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 9. f. 7.

Habitat in ripis maritimis verſus Peterhoffium et Oranienbaum. Мѣшечница кишковатая. Russ. Sob.

CONFERVA. Fibrae ſimplices aut ramoſae, (continuae vel articulatae,) intra quas gemmae globuloſae.

829. CONFERVA RIVULARIS. Filamentis ſimpliciſſimis longiſſimis. (G.) Flor. dan. t. 881.

In ramis Nevae fluvii lente fluentibus, circa insulam crucis et lapideam. Нитчанка ручейная. Russ. Sob.

830. CONFERVA FONTINALIS. Filamentis simpliciſſimis digito brevioribus. (Sob.) Flor. dan. t. 651. f. 3.

Habitat in fonte, e regione ſeptentrionali montis Duderovii, e terra prorumpente et in lacum vicinum fluente. Нитчанка родниковая. Russ. Sob.

831. CONFERVA FLUVIATILIS. Filamentis simpliciſſimis ſetiformibus rectis: geniculis craſſioribus angulatis. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 7. f. 47. 48.

Habitat in fluvio Neva et Toſna. prope Pellam. Нитчанка рѣчная. Russ. Sob.

832. CONFERVA CAPILLARIS. Filis geniculatis ſimplicibus: articulis alternatim compreſſis. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 5. f. 25.

Habitat in lacubus Oſinovae Roſchczae, in paludibus, et foſſis aquoſis paſſim. Нитчатка волосная. Russ. Sob.

833. CONFERVA BULBOSA. Filamentis aequalibus ramoſis, bullas aëreas includentibus. (R. Sob) Dillen. muſc. t. 3. f. 11.

Habitat in inſulae lapideae, et Strelinae aquis ſtagnantibus et paſſim. Нитчанка пузырочная. Russ. Sob.

834. CONFERVA CANALICULARIS. Filamentis aequalibus baſin verſus ramoſioribus. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 4. f. 15.

Habitat in canalibus molendinariis, et rivulis Strelinae et Peterhoffii. Нитчанка канальная. Russ. Sob.

235. CONFERVA RETICULATA. Filamentis reticulato-coadunatis. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 4. f. 14.

Habitat ad littora fluvii Nevae, prope portum triremium inſulae baſileenſis, et paſſim. Нитчанка сѣтчатая. Russ. Sob.

836. CONFERVA DICHOTOMA. Filamentis. aequalibus dichotomis. (Sob. R.) Dillen. muſc. t. 3. f. 9.

Habitat in ſtagnis et foſſis circa Caterinhoffium, et paſſim. Нитчанка развилистая. Russ. Sob.

837. CONFERVA GELATINOSA. Foliis ramoſis moniliformibus: articulis globoſis gelatinoſis. (Sob.) Dillen muſc. 36. t. 7. f. 42.

Habitat in fontibus ad vicum Hoſtilitza et in Sarſcoje ſelo ac Peterhoffii. Нитчанка студенистая. Russ. Sob.

838. CONFERVA GLOMERATA. Filamentis geniculatis, ramulis brevioribus multifidis. (Sob.) Flor. dan. t. 651. f. 2.

Habitat in rivulis circa pagum Ribaczja, et in ramis fluvii Nevae. Нитчанка сборная. Russ. Sob.

BYSSUS. Fibrae ſimplices uniformes lanuginoſae.

889. BYSSUS SEPTICA. Capillacea molliſſima parallela fragiliſſima pallida. (R. Sob.)

Habitat in domibus ſub pavimentis, et in ſylvis umbroſiſſimis ad ligna putrida; corrodit truncos duriſſimos. Жилочница гноющая. Russ. Sob.

840. BYSSUS FLOS AQUAE. Filamentis plumoſis natantibus. (Farinacea vireſcens, ramoſa.) (R. Sob.) β Dillen. muſc. t. 1. f. 1.

Habitat in aquis ſtagnantibus; Prima aeſtate; nocte deſcendit parum, die natat fere. Жилочница водоцвѣтная.

841. BYSSUS PHOSPHOREA. Lanuginoſa violacea lignis adnaſcens. (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 6.

Habitat in lignis et truncis arborum putreſcentibus, in ſylvis humidis circa fabricam pyriam Ochtenſem, et paſſim. Мышій огонь. Russ. Жилочница свѣтоносная. Sob.

842. BYSSUS VELUTINA. Capillacea viridis, filamentis ramoſis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 14.

Habitat in terra et corticibus Betulae albae antiquis dejectis. Жилочница зеленобархатная. Russ. Sob.

843. BYSSUS FULVA. Filamentis ramoſis Fulvis (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 17.

Habitat in ſylvis Oſinovae Roſchcze et paſſim, ad ligna putrida. Жилочница свѣтлооранжевая. Russ. Sob.

844. BYSSUS CANDIDA. Filamentis ramoſiſſimis: ramis faſtigiatis albidis. (Sob.) Dillen. muſc. t. 1. f. 15.

Habitat In ſylvis Oſinovae Roſchczae inter folia dejecta putreſcentia, autumno. Жилочница бѣлая. Russ. Sob.

AGARICUS. Fungus horizontalis: pileo ſubtus lamelloſo.

I.

Stipitati. Stipite volva et annulo cincto.

845. AGARICUS MUSCARIUS. Pileo ſanguineo, verrucis, lamellis ſtipiteque albis: hoc baſi globoſo. (G.) Schaeff. fung. t. 28.

Habitat in pratis ficcioribus et ſylvis arenoſis paſſim. Iulio, Auguſto. Грибъ мухоморъ. Russ. Мухоморъ красный. Sob.

846. AGARICUS MARGARITACEUS. Pileo palleſcente verrucis carneis tuberculisque albidis aſpero, lamellis albis. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 316.

In pratis ſylvoſis rarius occurrit. Aeſtate. Мухоморъ желто-блѣдный. Russ. Sob.

847. AGARICUS MACULATUS. Pileo badio lividove: margine verrucis albis inaequali, lamellis albidis brevibus latis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 90.

Habitat in ſylvis ficcioribus Pargelovii et Oſinovae Roſchczae. Aeſtate. Мухоморъ темносѣрый. Russ. Sob.

848. AGARICUS MAPPA. Pileo convexo ex flaveſcenti cineraſcente, lamellis alternatim longioribus ſtipiteque flaveſcentibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 20.

Habitat in montnfis ſylvoſis. Aeſtate, et autumno. Мухоморъ сѣрожелтый. Russ. Sob.

849. AGARICUS PRAEALTUS. Pileo hemiſphaerico, junioris tomentoſo, ſtipite quadruplo longiore gracili cinereo, lamellis ferreis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. p. 189. t. 81. f. 3.

Habitat in ſylvis circa Rjabovam. Septembri. Лѣснякъ. Russ. Sob.

850. AGARICUS BULBOSUS. Pileo glaberrimo integerrimo carneoniveo, ſtipite lineari concolore: baſi ſemiovata ſupra truncata, lamellis pallidiſſime flaventibus ſtipiti contiguis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 241.

Habitat in pratis ſylvoſis. Autumno. Поганка лѣсная блѣдная. Russ. Sob.

851. AGARICUS EXCORIATUS. Pileo convexo ex lateritio dilute cinereo: diſco tela dilute carnea tecto, lamellis inaequalibus, ſtipiteque fiſtuloſo baſi bulboſo albidis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 18.

In ſimetis hortorum et vaporariis rarius occurrit. autumno. Поганка навозная рыжая. Russ. Sob.

2.

Stipite annulato: volva nulla.

852. AGARICUS CAMPESTRIS. Pileo convexo caneſcente: maculis piloſo-ſquamoſis, lamellis inaequalibus introrſum (adulti) rufeſcentibus, ſtipite albido recto. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 134.

Habitat in arvis, et agris atque in hortis oleraceis, frequens. Iulio. Eſculentus. Печерица, ſive Шампиньіонъ. Russ. Печерица полевая. Sob.

853. AGARICUS PRATENSIS. Pileo convexo albido vel ex thalaſſino dilute cinereo ſtriato, lamellis ſordide carneis, ſtipite craſſo albido: baſi inflexa fuſceſcente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 96.

Habitat in pratis ſiccis paſſim. Iulio, Auguſto. Eſculentus. Печерица луговая. Russ. Sob.

854. AGARICUS FLOCCOSUS. Pileo convexo piloſo-ſquamoſo, lamellis flavicantibus, ſtipite farcto annuloque ſquamoſis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 91.

Habitat in ſylvis gregatim. Iunio, Iulio. Опенокъ охлопчатый. Russ. Sob.

855. AGARICUS MUTABILIS. Pileo glabro fuſco-ochraceo, lamellis dilute fuſcis, ſtipite pallidiori lineari ſyperne ſquarroſo; inferne laevi albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 9.

Habitat gregatim ad radices arborum, Coryli aliorumque. Eſculentus. Подорѣшникъ. Russ. Sobol.

3.

Stipite annulo volvaque deſtituo.

856. AGARICUS VIRGINEUS. Niveus, lamellis arcuatim per ſtipitem cylindricum farctum decurrentibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 39.

Habitat in ſylvis, autumno. Eſculentus. Молочникъ. Russ. Sobol.

857. AGARICUS INTEGER. Solitarius, pileo viſcido purpureo, lamellis albis integris aequalibus. (G.) Krapf. Oeſterr. Schw. 1. t. 1. f. 1. 7. et t. 2. f. 4. 6. (Variat pileo rubro. et albicante purpureo. Sob.)

Habitat in ſylvis et pratis ſylvoſis. Iulio, Auguſto et Septembri. Eſculentus. Сыроѣжка красная. Russ. Vaeriet. β Сыроѣжка бѣлая. Russ. Sobol.

858. AGARICUS EMETICUS. Acris graveolens ſolitarius, pileo ſanguineo, lamellis aequalibus craſſis fragilibus apice bifurcis ſtipiti farcto tereti intus albo continuis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 15. 16.

In pratis ſylvaticis ſiccioribus frequens eſt. Iulio, Auguſto et Septembri. Eſculentus. Волуй ſive волуекъ. Russ.

859. AGARICUS CYANOXANTHUS. Pileo pallido vel ſubrubello: margine caeruleſcente, lamellis aequalibus albidis craſſis, ſtipite farcto brevi terete. (Sob.) Krapf. Oeſterr. Schw. t. 6. f. 1. 6.

Habitat in ſylvis antiquis circa pagum Rjabova, et Oſinovae Roſchczae. Путникъ васильковый ſive синякъ. Russ. Sob.

860. AGARICUS VIRESCENS. Pileo vario luridove viſcido, lamellis albidis aequalibus, ſtipite tereti farcto. (Sob.) Krapf. Oeſterr. bchw. t. 9. f. 6. 7.

Habitat in declivibus ſylvarum graminoſarum. Septembri, Octobri. Зеленчакъ. Russ. Sob.

861. AGARICUS GLUTINOSUS. Pileo viſcido nitente ochroleuco exſiccatione nigreſcente, lamellis concoloribus craſſis ramoſis aequalibus, ſtipite tereti farcto incurvo baſi incraſſato. (Sob.) Krapf. Oeſterr. Schw. t. 11. f. 1. 7.

Habitat in ſylvis humidis circa Ochtam. Septembri. Поганка клейкая. Russ. Sob.

862. AGARICUS VIOLACEUS. Pileo convexo aſpero punctato: margine violaceo, lamellis dilute badiis margine purpuraſcentibus, ſtipite caeruleſcente craſſo baſi bulboſo. (G.) Kern. Schw. t. 1. f. 1.

Habitat ad margines humidos ſylvarum. Auguſto, Septembri. Eſculectus. Голубецъ. Russ. Sob.

863. AGARICUS CROCEUS. Luteus, ſtipitis parte inferiori pileo que conico villoſis, lamellis numeroſis denſis ſtipitiſque parte ſuperiori albis. (Sob.) Bolton fung. 2. t. 51. f. 2.

Habitat gregatim ad truncos et radices arborum. Septembri, Octobri. Опенка шафранная. Russ. Sobol.

864. AGARICUS GEORGII. Pileo flavo convexo: lamellis albis. (Sob.) Sterb. fung. t. 11. f. 3.

Habitat in ſylvis ficcioribus elatioribus. Iulio, Auguſto. Eſculentus. Сыроѣжка желтая. Russ. Sobol.

865. AGARICUS CLYPEATUS. Pileo hemiſphaerico acuminato viſcido, lamellis ſtipiteque elongato cylindrico albis. (Sob.)

Habitat gregatim in ſylvis umbroſis ad radices arborum. Ольшанка ſive опенка ольховая. Russ. Sob.

866. AGARICUS FRAGILIS. Pileo convexo viſcido pellucido lamellisque luteis. (Sob.) Vaillant. fl. paris. t. 11. f. 16. 18.

Habitat in ſylvis et ad vias. Iulio. Опенокъ мелкій, трухлый. Russ. Sob.

867. AGARICUS STRIATUS. Pileo caſtaneo: margine dilutius ſtriato, ſtipite tereti craſſo brevi farcto albido. (Sob.) Schaeff. fung. t. 38.

Habitat in ſylvis gregatim ad truncos arborum putridos. Auguſto, Septembri. Опенка струйчатая. Russ. Sob.

868. AGARICUS ADHAERENS. Pileo atro glutinoſo, lamellis ſordidis ramoſis ſubdecurrentibas, ſtipite farcto tereti albido. (Sob.) Schaeff. fung. t. 36.

Habitat in pratis elatioribus ſylvoſis Oſinovae Roſchczae, ad radices arborum. Septembri, Octobri. Путникъ осиновый. Russ. Sob.

869. AGARICUS FASTIGIATUS. Pileo conico umbonato luteo longitudinaliter ſtriato, lamellis fuſceſcentibus, ſtipite tereti farcto elongato lineari flaveſcente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 26.

Habitat in ſylvis ad radices arborum gregatim. Septembri, Octobri. Опенковой колпачокъ. Russ. Sob.

870. AGARIGUS CINNAMOMEUS. Tenax pileo ſicco laevi rufo, lamellis teneris coriaceis dilute cinnamomeis triplici ordine diſpoſitis, ſtipite luteo inferne anguſtato compreſſo fibroſo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 4.

Habitat in ſylvis humidiuſculis inter muſcos. Septembri. Опенка коричновая. Russ. Sob.

871. AGARICUS NIVOSUS. Niveus, pileo parvo convexo: margine ſtipiteque craſſo elongato ſolido furfuraceo-pruinoſis, lamellis anguſtis confertis ſtipiti continuis: brevioribus intermiſtis. (Sob.) Batſch el. fung. cent. 49. f. 64.

Habitat ad radices arborum in ſylvis humidis circa Ochtam et Rjabovam et paſſim. Septembri. Eſculentus. Плѣснякъ. Russ. Sob.

872. AGARICUS CRASSIPES. Pileo fuſco ſicco convexo: margine involuto, ſtipite concolore fuſiformi, lamellis dilute fuſcis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 87.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum putridos gregatim. Octobri. Веретенникъ. Russ. Sob.

873. AGARICUS FLAVIDUS. Pileo ochroleuco, lamellis albidis, ſtipite tereti flexuoſo inferne craſſiori fuſceſcente, ſuperne flaveſcente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 35.

Habitat gragatim in ſylvis inſulae apothecariae et circa Ochtam ad radices arborum. Septembri. Опенковая желтушка. Russ. Sob.

874. AGARICUS FASCICULARIS. Pileo luteo, lamellis cinereis margine flavicantibus, ſtipite flavo lineari elongato. (Sob.) Schaeff. fung. t. 49.

Habitat in ſylvis umbroſis ad truncos et radices arborum gregatim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Опенка березовая. Russ. Sob.

875. AGARICUS TESTACEUS. Pileo albido: margine pallidiſſime ochraceo, centro luteſcente,

lamellis albis, ſtipite elongato baſi adſcendente pallide ochraceo. (Sob.) Planer fung. Erf. p. 14. n. 49.

Habitat in pratis ſylvoſis gregatim. Septembri. Eſculentus. Солянка пестрая. Russ. Sob.

4.

Pileo infundibuliformi vel obliquo.

876. AGARICUS INFUNDIBULIFORMIS. Siccus albus ſenio ſubtinctus, pileo maximo umbonato, lamellis inaequalibus ramoſis, ſtipite laevi. (Sob.) Buxb. cent. 4. t. 1.

Habitat in pratis arenoſo-argilloſis ſylvoſis Oſinovae Rolchczae et montis Duderovii. Auguſto, Septembri. Eſcucentus. Грибная воронка. Russ. Sobol.

877. AGARICUS DEGENER. Pileo carneo-fulveſcente circulis concentricis ſaturatioribus picto: margine lacero, ſtipite concolore lineari elongato ſurſum ampliato, lamellis pallide carneo-ochraceis decurrentibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 243.

Habitat in ſylvis Oſinovae Roſchczae in cavitatibus et truncis arborum. Septembri, Octobri. Eſculentus. Дуплянка рыжая. Russ. Sob.

878. AGARICUS FLABELLATUS. Pileo difformi fuſco vel lurido vario. Lamellis ſubrepandis ſtipiteque brevi cylindrico ſordide albis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 43. 44.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum putridos. Septembri. Eſculentus. Лисочка темная. Russ. Sobol.

5.

Pileo dimidiato, ſtipite laterali.

879. AGARICUS AGGREGATUS. Gregarius, pileo fuſco: margine lobato criſpo, lamellis rufescentibus ramoſis ſubdecurrentibus, ſtipite craſſo curvo farcto fuſceſcenti-albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 233.

Habitat in cavitatibus arborum vivarum Oſinovae Roſchczae. Septembri, Octobri. Лисочка сборная. Russ. Sob.

880. AGARICUS CONCHATUS. Pallide cinnamomeus, pileo conchiformi, lamellis inaequalibus longioribus decurrentibus, ſtipite arcuato farcto. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 298.

Habitat in truncis vivis et cavitatibus arborum Oſinovae Roſchczae. Octobri. Eſculentus. Пакушникъ. Russ. Sob.

881. AGARICUS GLAUCUS. Canus, pileo ſericeo tenello, lamellis diſtantibus alterne brevioribus, ſtipite albidiore brevi pruinato. (Sob.) Batſch. el. fung. cent. vro. f. 123.

Habitat in ſylvis umbroſis circa Rjabovam. Septembri. Eſculentus. Сизякъ. Russ. Sob.

882. AGARICUS OBESUS. Craſſus ochroleucus, pileo pulvinato inaequali, ſtipite brevi rufeſcente. (Sob.) Batſch. el. fung. cent. 2. p. 89. t. 39. f. 216.

Habitat in ſylvis et hortis ad radices Betulae albae. Septembri, Octobri. Eſculentus. Свинушка коренная. Russ. Sob.

6.

Sauciati ſuccum fundentes, lactiflui.

883. AGARICUS DELICIOSUS. Pileo luteo-fuſceſcente: vertice depreſſo, ſtipite tereti maculato, lamellis luteis ſucco luteo refertis inaequalibus: longioribus decurrentibus. (G.) Kern. Schwaemm. t. 6. f. 1.

Habitat in monticulis ſylvoſis arenoſis paſſim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Рыжикъ. Russ. Рыжикъ ранній желтый. Sob.

884. AGARICUS TORMINOSUS. Pileo luteſcente: vertice depreſſo, margine piloſo ſtriato, lamellis inaequalibus luteis ſucco luteo refertis. (Sob.) Schaeff. fung. t. 12.

Habitat in pratis et ſylvis arenoſis. Septembri, Octobri. Eſculentus. Волнушка красная позняя. Russ. Sob. (Var. ⅓ pileo lamellisque albicantibus.) Волнушка бѣлая ранняя. Russ. Sob.

885. AGARICUS ZONARIUS. Pileo ſpadiceo concentrice ſtriato: vertice depreſſo, lamellis albidis, ſtipite fuſceſcenti-albido brevi farcto tereti. (Sob.) Schaeff. fung. t. 235.

Habitat in pratis ſylvoſis ubique. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Дубянка красная. Russ. Sob.

886. AGARICUS DULCIS. Sordide ruber intus albus, ſuccum album dulcem fundens, pileo (adulti) infundibuliformi, lamellis numeroſis ſubdecurrentibus. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 224.

Habitat in ſylvis arenoſis umbroſis paſſim. Auguſto, Septembri. Бѣлянка. Russ. Sob.

887. AGARICUS RUFUS. Pileo aurantio: vertice adulti umbilicato, lamellis tenuibus anguſtis fragilibus fuſceſcentibus ſuccum luteum fundentibus: ſecundi tertiique ordinis inaequalibus, ſtipite farcto fragili. (Sob.) Bolton fung. 9. t. 9.

Habitat in paſcuis ſylvoſis montoſis. Auguſto, Septembri et Octobri. Eſculentus. Рыжикъ красный поздній. Russ. Sob.

888. AGARICUS SCROBICULATUS. Succum lacteum demum ſulphureum ſundens, pileo luteo piloſo convexo: vertice depreſſo, lamellis pallidioribus ramoſis, ſtipite tereti craſſo brevi. (Sob.) Schaeff. fung. t. 227.

Habitat in pratis ſylvoſis elatioribus. Auguſto, Septembri, et Octobri. Eſculentus. Подгруздень. Russ.

889. AGARICUS ACERRIMUS. Inodorus aut graveolens acris ſuccum acerrimum fundens, pileo fuſceſcente firmo, lamellis fragilibus flavicantibus carneisve, ſtipite farcto tereti ſpongioſo. (Sob.) Krapf. Oeſterr. Schw. 2. t. 3. f. 5.

Habitat in ſylvis ad radices arborum. Septembri, Octobri. Eſculentus. Грибная скрипица. Russ.

890. AGARICUS CIMICARIUS. Ferrugineo-fulvus, pileo opaco humeſcente infundibuliformi, lamellis triplicis longitudinis per regulas ſaepe connexis, ſtipite teretiuſculo fiſtuloſo. (Sob.) Batſch el. fung. cent. 59. f. 60.

Habitat in ſylvis circa fabricam pyriam Ochtenſem et paſſim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Дуплянка темножелтая. Russ. Sob.

891. AGARICUS OPACUS. Succum acrem album fundens, pileo rigido humeſcente viſcoſo, fuſceſcente-cinereo: vertice excavato obſolete concentrice faſciato, lamellis latis triplicis longitudinis utrinque anguſtioribus ochaceo-carneis, ſtipite albido. (Sob.) Batſch el. fung. cent. 57. f. 68.

Habitat in pratis ſylvoſis et ad vias paſſim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Свинушка ſive дуплянка темная. Russ. Sob.

892. AGARICUS PIPERATUS. Albus ſuccum acrem fundens, pileo laevi fragili: vertice (ſeneſcentis) excavato, margine deflexo, lamellis inaequalibus, irregularibus anguſtis, ſtipite farcto utrinque anguſtato. (G.) Bolton fung. 21. t. Schaeff. fung. t. 83.

Habitat in ſylvis paſcuis ubique. Auguſto. Septembri. Eſculentus. Груздь. Russ.

893. AGARICUS AMARUS. Succum acrem fundens, pileo ochroleuco: vertice (adulti) excavato, margine undulato, ſtipite concolore craſſo tereti farcto, lamellis ramoſis flavicantibus. (Sob.) Kern. Schw. t. 9. f. 1.

Habitat in ſylvis montoſis circa fabricam pyriam Ochtenſem et paſſim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Горькуша. Russ.

7.

Laeves membranacei, vix carnoſi. Coriacei, pileo lamellisque coriaceis.

894. AGARCUS MELLEUS. Pileo convexo pallide ſulphureo ferrugineoque: margine pallido

ſtriato, lamellis albidis, ſtipite elongato tereti ſublineari fiſtuloſo cereo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 45.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum. Septembri. Опенка осиновая. Russ. Sob.

895. AGARICUS CEREOLUS. Pileo campanulato pallide ſulphureo: margine ochraceo-ferrugineo, lamellis cinereo-fuſcis, ſtipite elongato niveo farcto. (Sob.) Schaeff. fung. t. 51.

Habitat in ſylvis ad radices arborum putridas. Autumno. Опенка мелкая рыжая. Russ. Sob.

896. AGARICUS FUSCESCENS. Pileo convexo fuſco, lamellis fuſco-fulventibus, ſtipite lineari ſubelongato pallido fiſtuloſo. (Sob.) Scheff. fung. t. 60.

Habitat in ſylvis humidis. Iulio, Auguſto. Опенкатемная. Russ. Sob.

897. AGARICUS JANTHINUS. Violeceo-rubens, pileo ſubconvexo, lamellis diſtantibus convexis decurentibus, ſtipite elongato lineari. (Sob.) Schaeff. fung. t. 13. f. 2. 4. 5. 8.

Habitat in montoſis ſylvaticis Pargelovii et paſſim. Iulio, Auguſto. Опенка синеватая. Russ. Sob.

898. AGARICUS MAMMOSUS. Suaveolens dilute fuſcus, pileo difformi, lamellis latiuſculis diviſis a ſtipite lineari farcto ſpirali diſtantibus. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 144.

In ſylvis arenoſis. Auguſto, Septembri. Опенка сосновая. Russ Sob.

899. AGARICUS ALLIATUS. Allium redolens ſapiensque canus, pilei margine undulato ſtriato, lamellis diviſis ſtipiti contiguis. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 153.

Habitat in pratis et ſylvis ſiccis umbroſis arenoſis. Iulio, Auguſto. et Septembri. Опенокъ чесночный. Russ. Sob.

900. AGARICUS ALLIACEUS. Allium ſapiens reddensque, pileo convexo glabro e fuſco palleſcente, lamellis albidis, ſtipite atro nitido fiſtuloſo. (Sob.) Iacq. flor. auſtr. 1. t. 82.

Habitat in pratis ſiccioribus et ſylvis, in inſula apothecaria, lapidea, et paſſim. Iulio., Auguſto, Septembri. Чесночникъ черностебельный. Russ. Sob.

801 AGARICUS ABIETIS. Pileo glaberrimo ſubviſcido depreſſo-convexo, lamellis albidis, ſtipite lineari elongato fulvo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 99. f. 1. 3. 4.

Habitat gregatim in ſylvis circa montem Poclonnaja et paſſim. Опенокъ еловый. Russ. Sob.

902. AGARICUS CLAVUS. Pileo planiuſculo umbonato luteo: margine ſtriato plicatove, lamellis ſordide albis, ſtipite lineari tereti farcto, inferne torto. (Sob.) Schaeff. fung. t. 59.

Habitat gregatim in ſylvis ad ligna putrida. Iulio, Auguſto. Опенокъ желтоголовый. Russ. Sob.

903. AGARICUS FUMUS. Pileo conico ſubovato acuminato fuſco vel flavente; lamellis rubris: ſtipite lineari elongato pallidiori. (Sob.) Schaeff. fung. t. 63. 70. 229.

Habitat gregatim in pratis et ſylvis humidis. Auguſto. Опенокъ дымчатый. Russ. Sob.

8.

Tenelli, pileo lamellisve et ſtipite pellucidis, ut plurimum concoloribus; illo ſtriato plicato.

904. AGARICUS SULPHURATUS. Pileo luteſcente-cano convexo plicis latis inaequali, lamellis albidis duplicis ordinis, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo ſulphureo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 31.

Habitat in ſylvis ad ligna putrida gregatim. Auguſto. Гнилушка желтоногая. Russ. Sob.

905. AGARICUS ADUSTUS. Fuſcus, pileo convexo-conico late plicato extrorſum pallide griſeo, ſtipite lineari elongato fiſtuloſo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 32.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum et ligna putrida. Iulio, Auguſo. Гнилушка полосатая. Russ. Sob.

906. AGARICUS ANDROSACEUS. Pileo conico pellucido ſtriato crenato lamellisque albidis, ſtipite gracili obſcuro. (Sob.) Schaeff. fung. t. 239.

Habitat in ſylvis inter folia decidua putrida et ſurculos. Septembri, Octobri. Гнилушка прозрачная. Russ. Sob.

907. AGARICUS UMBELLIFERUS. Minutus albus pellucidus, pileo hemiſphaerico: margine plicato, lamellis diſtantibus, ſtipite filiformi. (G.) Bolton. fung. 39. t. 39. f. A.

In ſylvis et locis humidis umbroſis foliis aut ramulis dejectis putridis adhaeret. Auguſto, Septembri. Гнилушка тоненькая. Russ. Sob.

908. AGARICUS CANDIDUS. Minutus albus, pileo hemiſphaerico margine involuto, lamellis flexilibus, ſtipite tereti flexuoſo. (Sob.) Bolton. fung. t. 39. f. D.

Habitat ad margines ſylvarum et ſepes hortorum. gregatim. Iulio, Auguſto. Гнилушка крапивная. Russ. Sob.

909. AGARICUS RADIATUS. Pileo cinereo radiato plicato ſtipiteque filiformi pellucidis. (Sob.) Bolton. fung. 39. t. 39. f. C.

Habitat in ſylvis et ad vias gregatim. auguſto, Septembri. Гнилушка струйчатая. Russ. Sob.

910. AGARICUS CONICUS. Pileo campanulato acuto nitido livido ſtriato, lamellis albis, ſtipite fiſtuloſo cinereo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 52. f. 1. 6.

Habitat in ſylvis umbroſis ad ligna putrida. Autumno. Гнилушка колокольчатая. Russ. Sob.

9.

Partim in liquorem nigrum diffluentes aut lamellis nigris inſtructi.

911. AGARICUS FASCICULATUS. Fuſceſcendo difluens, pileo convexo laevi luteo, lamellis numeroſis anguſtis olivaceis, ſtipite flexuoſo fiſtuloſo flavo. (Sob.) Bolton. fung. 29.

Creſcit in agris ſtercoratis, gregatim. Iulio, Auguſto, et Septembri. Поганка навозная желтая. Russ. Sob.

912. AGARICUS SORDIDULUS. Pileo ſquamoſo ſordide luteo, lamellis terreis nigro pulverulentis, demum atris, ſtipite gracili elongato fiſtuloſo fuſceſcente. (Sob.) Schaeff. fung. t. 210.

Creſcit ad margines viarum ſylvaticarum et in fimetis hortorum. Iulio, Auguſto et Septembri. Поганка рыжая, навозная. Russ. Sob.

10.

Fuliginoſi, pileo opaco conico, lamellis feneſcendo fuliginoſis tandem in ſaniem nigram difluentibus, ſtipite fiſtuloſo.

913. AGARICUS AQUEUS. Pileo glabro lacero cano-fuſceſcente leviter ſtriato plicatoque, lamellis nigro-fuſcis, ſtipite ſubelongato albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 17.

Creſcit in fimo hortorum diu in aere repoſito, et in agris ſtercoratis. Iulio, Auguſto. Поганка ſive навозный колпачокъ. Russ. Sob.

914. AGARICUS CINEREUS. Pileo caneſcente umbonato confertiſſime ſtriato, lamellis connatis, ſtipite elongato fuſceſcente albo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 100.

Habitat in fimetis paſſim. Iunio, Iulio, Auguſto. Поганка сѣрая, ſive Конскій грибъ. Russ. Sob.

915. AGARICUS OVATUS. Pileo ſquamato ſtriato cano, ſtipite annulato elongato albo terete deorſum craſſiori: volva ovata ſquamoſa. (Sob.) Schaeff. fung. t. 7. Поганка, ſive Навозное яйцо. Russ. Sob.

916. AGARICUS VAILLANTII. Gregarius, pileo ſtriato cinereo ovato tandem ſpadiceo campanulato, lamellis latiuſculis ſerrulatis, ſtipite lineari tereti albo. (Sob.) Vaillant. flor. pariſ. t. 12. f. 10. 11.

Habitat in ſimetis circa pagos et in hortis oleraceis. Iunio, Iulio. Поганка струистая. Russ. Sob.

917. AGARICUS PORCELLANEUS. Pileo aquoſe albo ſtriis longitudinalibus purpuraſcentibus ſquamisque luteſcentibus vario fuſiformi demum campanulato, lamellis utrinque acuminatis, ſtipite flexuoſo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 47. 48.

Habitat in ſtercoratis circa pagos et in ſimetis hortorum. Iulio, Auguſto. Поганка. ſive Навозный коровякъ. Russ. Sob.

918. AGARICUS STERCORARIUS. Pileo convexo diaphano cineraſcente nigro: margine lacero revoluto, lamellis canis, ſtipite ſubobliquo anguſto inferne in craſſato. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 68.

Habitat in ſimetis paſſim. Iulio, Auguſto. Поганка навозная черная. Russ. Sob.

919. AGARICUS DIGITALIS. Pileo ſemiovato crenulato livido-caneſcente extrorſum confertiſſime ſtriato: vertice glabro ferrugineo, lamellis triplicis longitudinis atris, ſtipite adſcendente elongato palidiſſimo. (Sob.) Batſch. el. fung. 61. f. 1.

Habitat circa pagos in ſimetis paſſim. Iulio, Auguſto. Поганка долгохвостая. Russ. Sob.

II.

Acaules.

920. AGARICUS PERENNIS. Subacaulis ſuberoſo-coriaceus, pallide ochraceus, lamellis pallidioribus. (Sob.) Plan. fung. Erf. p. 8. n. 25.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum putridos, Oſinovae Roſchczae et paſſim. Auguſto, Septembri, Octobri. Дереванка гребенчатая. Russ. Sob.

921. AGARICUS CAESPITOSUS. Spatulatus convexus luteus glabriuſculus, lamellis terreis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. p. 123. t. 65. f. 5. 6.

Habitat in ſylvis ad truncos vivos arborum Alni. Autumno. Наростень пеніовый. Russ. Sob.

922. AGARICUS GELATINOSUS. Pileo difformi albido ſublanato, lamellis ochroleucis ſimplicibus inaequalibus. (Sob.) Schaeff. fung. t. 213.

Habitat in ſylvis umbroſiſſimis Oſinovae Roſchczae ad ſtipites arborum recenter ceduis, rarius. Septembri, Octobri. Студенецъ наростный. Russ. Sob.

MERULIUS. Fungus Subtus venoſus.

923. MERULIUS CORNUCOPIOIDES. Stipitatus: fuſcus tenax, pileo lobato, venis ſubquadruplici ordine decurrentibus. (Sob.) Bolton fung. 8. t. 8.

Habitat in pratis montoſis ſylvaticis circa fabricam pyriam Ochtenſem, et Murinam. Eſculentus. Сухарь, ſive Чернушка. Russ. Sob.

924. MERULIUS CYATHUS. Stipitatus, coloris lignei, pileo infundibuliformi, venis decurrentibus, ſtipite tereti fiſtuloſo. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 208.

Habitat in alnetis umbroſis montoſis Oſinovae Roſchczae. Eſculentus. Лисочка сѣрая. Russ. Sobol.

925. MERULIUS CANTHARELLUS. Stipitatus: vitellinus ſuaveolens, pileo (ſeneſcentis) excavato: margine undulato lobato, venis ſubcriſpis decurrentibus, ſtipite tereti farcto ſurſum dilatato. (Sob.) Agaricus Cantharellus. Linn. (G.) Schaeff. fung. t. 82.

Habitat in pratis elevatis ſylvaticis Pargelovii et paſſim. Eſculentus. Лисочка желтая. Russ. Sobol.

926. MERULIUS ALNEUS. Acaulis, coriaceus albidus cano tomentoſus, ſemiorbicularis, margine repando, venis ramoſis. (Sob.) Agaricus alneus. Linn. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 346.

Imbricatim adnaſcitur Betulis et Populis tremulis. Трутовица. Russ. Трутовица ольховая. Sobol.

927. MERULIUS RETICULATUS. Acaulis, verticulis ſubrotundis membranaceus laevis canus, venis reticulatis cineraſcentibus. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 289. t. 498. f. 1.

Habitat ad truncos arborum in Oſinova Roſchcza. Трутовица сѣтчатая. Russ. Sob.

928. MERULIUS DIMIDIATUS. Acaulis, membranaceus horizontalis laevis fuſceſcens. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 290. t. 498. f. 2.

Habitat in truncis arborum, Oſinovae Roſchczae et in monte Duderovo. Трутовица половинчатая. Russ. Sob.

929. MERULIUS BETULINUS. Acaulis, coriaceus villoſus ſuborbicularis margine obtuſo, venis confertis anaſtomoſantibus ochroleucis flavisve. (Sob.) Agaricus betulinus. Linn. Bulliard herb. Franc. t. 290.

Habitat in ſylvis ad truncos Betulae albae. Трутовица березовая. Russ. Sob.

930. MERULIUS QUERCINUS. Acaulis, ſuberoſo-coriaceus planus villoſus ſemiorbicularis annulis diverſi coloris pictus, venis confertis cartilagineis anaſtomoſantibus albidis vel fuſceſcentibus. (Sob.) Agaricus quercinus. Linn. (G.) Schaeff. fung. t. 57.

Habitat in truncis arborum circa Sarſcoje Selo et paſſim. Трутовица дубовая. Russ. Sob.

BOLETUS. Fungus horizontalis, ſubtus poroſus.

* Stipitati.

931. BOLETUS PERENNIS. Perennis, pileo utrinque planiuſculo peltato fuſco, poris punctiformibus, Ochraceo albis, ſtipite laevi. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. 1. p. 334. t. 28. et. t. 449. f. 2.

Habitat in ſylvis ſiccis arenoſis inter Pinos ſylveſtres et Abietes Pargelovii et paſſim Autumno. ♃ Грибокъ сухлянка. Russ. Sob.

932. BOLETUS NUMMULARIUS. Perennis, pileo albo: centro concavo papillato, margine de-

flexo, ſtipite baſi nigro. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 124.

Habitat in ſylvis montoſis Pargelovii et Oſinovae Roſchczae, et paſſim Autumno. 2ſ. Сухлянка бѣлоголовая. Russ. Sob.

933. BOLETUS LEPTOCEPHALUS. Pileo plano tenui ſupra cervino ſubtus albo. (Sob.) Iacq. miſc. auſtr. 1. p. 142. t. 12.

Habitat ad radices arborum in ſylvis umbroſis montoſis Pargelovii et paſſim Autumno. Eſculentus. Полусухлянка тоненькая. Russ. Sob.

934. BOLETUS VISCIDUS. Pileo pulvinato viſcido, poris teretibus convexis immerſis diſtinctis, ſtipite lacero. (Sob.) Schaeff. fung. t. 103. 104.

Habitat in pratis ſylvoſis. Iulio, Auguſto. Eſculentus. Грибъ березовикъ. Russ. Sob.

935. BOLETUS LUTEUS. Pileo pulvinato viſcido, poris rotundatis convexis flaviſſimis, ſtipite annulato. (G.) Schaeff. fung. t. 114. 115.

Habitat in ſylvis umbroſis muſcoſis. Iulio, Auguſto. Eſculentus. Масленникъ. Russ. Sob.

936. BOLETUS BOVINUS. Pileo pulvinato glabro marginato, poris acutis compoſitis: porulis angulatis brevioribus. (G.) Bulliard herb. Franc. 1 p. 322. t. 60. 494.

Habitat in pratis ſylvoſis ſubhumidis inter muſcos. Iulio, Auguſto et Septembri. Eſculentus. Моховикъ. Russ. Sob.

937. BOLETUS MUTABILIS. Pileo pulvinato fuſco, tubis flaveſcentibus rubiſve (Seneſcentis,

in juvene albidis,) ſtipite incraſſato brevi fuſceſcente rubellove. (Stipite albo infra bulboſo ſive tuberoſo reticula oblonga rubra ſtriato. farcto ſolido.) (Sob.) Schaeff. fung. t. 108. 133.

Habitat in Pinetis montoſis umbroſis ſiccioribus. Auguſto, Septembri. Eſculentus, optimus. Боровикъ, ſive бѣлый грибъ. Russ. Sob.

938. BOLETUS FERRUGINEUS. Pileo pulvinato ochraceo-fuſco glabro poris ferrugineo-brunneis, ſtipite ſubferrugineo. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 318. t. 451. f. 2.

Habitat in pratis et ſylvis humidis muſcoſis gregatim. Auguſto, Septembri. Eſculentus. Козлякъ, ſive козьякъ. Russ. Sob.

939. BOLETUS TUBEROSUS. Pileo pulvinato ſtramineo, poris flavis, ſtipite brevi baſi tuberoſo. (Pileo, in umbroſis, pallido, in apricis, ochraceo-ruberrimo; ſtipite albo ferrugineo-ſquamoſo, tuberoſo, ſolido.) (Sob.) Billiard herb. Franc. t. 100.

Habitat in nemoribus paſſim. Iulio, Auguſto et Septembri. Eſculentus. Подосиновикъ, ſive красный грибъ. Russ. Sob.

940. BOLETUS LACTEUS. Pileo convexo peltato orbiculato fuſco, ſtipite lineari valido diffuſo poriſque linearibus confertiſſimis catenulatis niveis. (Sob.) Batſch el. fung. p. 103. f. 42.

Habitat in ſylvis circa Rjabovam et fabricam pyriam Ochtenſem ad radices arborum, gregatim. Septembri. Eſculentus. Корнячокъ. Russ. Sobol.

941. BOLETUS SQUAMOSUS. Pileo flaveſcente ſquamoſo, poris difformibus oblonge flexuoſis niveis, ſtipite laterali. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 344. t. 19. et t. 312.

Habitat in nemoribus gramineis Oſinovae Roſchczae, rarius. Septembri, Octobri. Eſculentus. Заечникъ. Russ. Sob.

942. BOLETUS RAMULORUM. Coriaceus, pileo orbiculari, ſtipite laterali. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 124.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum putridos, gregatim. Autumno. Обабокъ. Russ. Sob.

** Acaules.

943. BOLETUS SUBEROSUS. Pulvinatus albus laevis poris acutis difformibus. (G.) β?) Bulliard herb. Franc. t. 491. f. 1.

Habitat in truncis arborum praecipue betulinis. Губа пробчатая. Russ. Sob.

944. BOLETUS FOMENTARIUS. Pulvinatus inaequalis obtuſus, poris teretibus aequalibus glaucis. (Sob.)

Creſcit in truncis arborum betulinis, in inſula apothecaria et paſſim. Губка огнивная. Russ. Sobol.

945. BOLETUS IGNIARIUS. Pulvinatus laevis, poris tenuiſſimis. (Unguis equini facie.) (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 72. 401. et 454.

Habitat in truncis arborum Belulae albae aliisque, paſſim. Трутъ, ſive губка. Russ. Губка высѣкальная. Sob.

946. BOLETUS MEMBRANACEUS. Submembranaceus prolifer, gregarius laevis radiatus albus, poris erosis difformibus. (Sob.) Swarts nov. pl. gen. et sp. p. 148.

Habitat in truncis arborum putridis, Osinovae Roschczae et alibi in sylvis humidis umbrosis. Губа плѣвистая. Russ. Sob.

947. BOLETUS VERSICOLOR. Fasciis discoloribus, poris albis. (Fasciis, in juvene, caeruleis albisve, in senescente rubris.) (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 86.

Habitat in sylvis Osinovae Roschczae et alibi ad truncos arborum antiquos. Губа разноцвѣтная. Russ. Sob.

948. BOLETUS SUAVEOLENS. Totus albus superne laevis poris inaequalibus. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 310.

Habitat in sylvis humidis ad truncos Salicinos antiquos. Губа пахучая. Russ. Sob.

949. BOLETUS GLOBATUS. Convexus subglobatus rufus laevis, poris teretibus flavis. (Sob.) Wildenow prodr. flor. berol. n. 1133.

Habitat in sylvis umbrosis circa fabricam pyriam Ochtensem humi ad ligna putrida. Горбачокъ. Russ. Sob.

950. BOLETUS HIRSUTULUS. Semicircularis plano convexus niveus supra hirsutus: lineis concentricis alternis depressis. (Sob.) Wulff. ap. Iacq. coll. 2. p. 149.

Habitat in sylvis Osinovae Roschcze ad truncos arborum putridos. Мохнатикъ. Russ. Sob.

951. BOLETUS PAPYRACEUS. Albus ſiccus papyraceus, poris inconſpicuis. (Sob.) Schranck Flor. bav. 2. p. 618. n. 1739.

Habitat in ſylvis umbroſiſſimis Oſinovae Roſchczae ad truncos arborum ſemiputridos. Бѣлобумажникъ. Russ. Sob.

952. BOLETUS OBLIQUUS. Ligneus poris obliquis roſtratis inaequalibus. (Sob.) Bolton fung. 2. t. 74.

Habitat in truncis arborum vivarum Oſinovae Roſchczae Pargeloviique. Деревянникъ кривый. Russ. Sob.

HYDNUM. Fungus ſubtus ſibris ſubulatis echinatus.

953. HYDNUM IMBRICATUM. Stipitatum fuſcum: pileo ſubconvexo ſquamoſo: ſquamis imbricatis ſubrectis. (Sob. R.) Schaeff. fung. t. 140.

Habitat circa Petropolim in ſylvis acerofis. Autumno. Eſculentus. Ежовикъ чешуйчатый. Russ. Sob.

954. HYDNUM TOMENTOSUM. Stipitatum: pileo plano infundibuliformi. (R. Sob.) Flor. dan. t. 534. f. 3.

Habitat in ſylvis acerofis Pargelovii et paſſim. Autumno. Ежовикъ мохнатый. Russ. Sob.

955. HYDNUM PARASITICUM. Acaule, arcuato-rugoſum ſubvilloſum. (Sob.) Willden. bot. mag. 4. p. 12. f. 5.

Habitat in truncis arborum circa Oranienbaum. Autumno. Ежовикъ наростовый. Russ. Sob.

956. HYDNUM CANDIDUM. Acaule, album aculeis longis concoloribus. (Sob) Willden. bot. mag. 4. p. 14. f. 7.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum, in inſula opothecaria et ad fabricam pyriam Ochtenſem, rarius. Septembri. Eſculentus optimus. Шестрецъ, Russ. ſive ежовикъ бѣлый. Sob.

THAELAEPHORA. Fungus ſuberoſus ſubtus papillatus fructificans.

957. THAELAEPHORA MESENTERICA. Horizontalis, acaulis gelatinoſo-coriacea imbricata tortuoſa, ſupra villoſa faſciata, ſubtus glabra violacea. (Sob.) Bulliard. herb. Franc. t. 290.

Habitat iu ſylvis humidis umbroſis Oſinovae Roſchczae ad truncos arborum. Autumno. Пупырничекъ извилистый. Russ. Sob.

958. THAERAEPHORA SERICEA. Horyzontalis, acaulis imbricata coriacea, ſupra ſericea faſciata palleſcens, ſubtus glabra flaveſcens. (Sob.) Schrader fung. ined.

Habitat in ſylvis humidis Oſinovae Roſchczae ad truncos arborum et ligna putrida. Septembri, Octobri. Пупырничекъ желтошелковый. Russ. Sob.

CLAVARIA. Fungus elongatus glaber clavatus aut ramoſus (ſimilaris) ſubſolidus; in ſuperficie omni fructificans.

959. CLAVARIA PISTILLARIS. Acaulis, clavaeformis ſimpliciſſima glabra fiſtuloſa ſolida (Sob. B.) Schaeff. fung. t. 169.

Habitat in ſylvis umbroſis Caterinhoffii et paſſim. Autumno. Булавастикъ кругленькій. Russ. Sob.

960. CLAVARIA OPHIOGLOSSOIDES. Acaulis, clavata integerrima compreſſa obtuſa. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 372.

Habitat in ſylvis umbroſis humidis inſulae apothecariae et circa Strelinam. Iulio, Auguſto, et Septembri. Булавастикъ сплюснутый. Russ. Sob.

961. CLAVARIA CORALLOIDES. Ramoſa, ramis confertis ramoſiſſimis inaequalibus. (Sob. B.) Schaeff. fung. t. 175. 177.

Habitat in ſylvis umbroſis inſulae apothecariae in parte occidentali, et circa viam Sarſcoſelienſem. Iulio, Auguſto et Septembri. Булавастикъ сучковатый. Russ. Sob.

962. CLAVARIA MUSCOIDES. Ramoſa, ramis ramoſis acuminatis inaequalibus luteis. (B. Sob.) Flor. dan. t. 775.

Habitat in ſylvis umbroſis Strelinae inter muſcos. Iunio, Iulio et Auguſto. Булавастикъ мшистый. Russ. Sob.

TREMELLA. Fungus gelatinoſus, uniformis diaphanus feminibus latitantibus.

963. TREMELLA GRANULATA. Sphaerica aggregata viridis. (Sob.) Ulva granulata. Linn. Flor. dan. t. 705.

Habitat ad ripas Nevae fluvii circa Caterinhoffium, et paſſim. Iulio, Auguſto. Дрожалка зернистая. Russ. Sob.

964. TREMELLA PRUNIFORMIS. Subgloboſa ſolitaria intus ſucculenta. (Sob.) Ulva pruniformis. Linn. Weig. obſ. bot. t. 2. f. 4.

Habitat in lacu ad radicem montis Duderovii. Iulio, Auguſto. Дрожалка грушковидная. Russ. Sob.

965. TREMELLA HEMISPHAERICA. Hemiſphaerica ſparſa. (Sob.) Weig. obſ. bot. t. 2. f. 3.

Habitat in ripis maritimis circa Peterhoffium et Oranienbaum. Дрожалка полушаристая. Russ. Sob.

966. TREMELLA ARBOREA. Subrotunda ſeſſilis undulata nigreſcens. (Sob.) Hoffm. veg. crypt. 1. p. 37. t. 8. f. 1.

Habitat in ſylvis Oſinovae Roſchczae et paſſim in ligno putrido et ramulis moribundis. Auguſto. Septembri et Octobri. Дрожалка древесная. Russ. Sob.

967. TREMELLA MESENTERICA. Subrotunda ſeſſilis plicato-undulata aurea. (R. Sob.) Iacq. miſc. auſtr. 1. t. 13.

Habitat in ſylvis humidis ad fabricam pyriam Ochtenſem et paſſim ad arborum deciduarum ramos emortuos. Autumno. Дрожалка извилистая. Russ. Sob.

968. TREMELLA NOSTOC. Plicata undulata. (Sinuoſa pinguis et fugax undulata ſordide rufeſcens.) (Sob.) Flor. dan. t. 885. f. 1.

Habitat in pratis ſiccis ſylvoſis poſt pluvias aeſtivas. Возгрица, ſive хмара. Russ. Дрожалка возгривая. Sob.

969. TREMELLA CINNABARINA. Plicata mollis craſſa ramoſa rubra. (Sob·) Bulliard. herb. Frac. t. 306.

Habitat in ſylvis inſulae apothecariae et Oſinovae Roſchczae Septembri, Octobri. Дрожалка киноварная.

970. TEMELLA VERRUCOSA. Seſſilis tuberculoſa ſolida. (Sob.) Hoffm. veg. crypt. 1. p. 39. t. 8. f. 2.

Habitat in fluvio Nevae ad ripam inſulae apothecariae ſupra lapillos et ligna putrida demerſa, copioſiſſime. Iulio, Auguſto. Дрожалка бородавчатая. Russ. Sob.

PHALLUS. Fungus ſubtus laevis, ſupra cellulis reticulatus.

971. PHALLUS ESCULENTUS. Pileo ovato margine adnato, rugis undulatis undique anaſtomoſantibus, ſtipite tenuiori. (G.) Schaeff. fung. t. 298 - 300.

Habitat in ſylvis paſſim. Primo vere. Eſculentus. Сморчокъ. Russ. Сморчокъ кухонный. Sob.

HELVELLA. Fungus pileo inflato difformi concavoque laevi ſemina ſuperne elaſtice protrudente.

972. HELVELLA MITRA. Stipitata, ſtipite fiſtuloſo ſulcis lacunisque inaequali pileo deflexo multilobato adnato. (Sob.) Schaeff. fung. t. 154. 162.

Habitat in ſylvis ad truncos arborum putridos. Iunio, Iulio. Eſculentus. Строчокъ. Russ. Строчокъ кухонный. Sob.

973. HELVELLA CERASINA. Stipitata, ſubſeſſilis gregaria pyriformi - campanulata rubra: margine dentato. (Sob.) Wulfen. ap. Iacq. collect. 1. p. 347.

Habitat in ſylvis umbroſis humidis Oſinovae Roſchczae ſupra ramulos arborum dejectos. Septembri, Octobri. Строчокъ вишневый. Russ. Sob.

974. HELVELLA COCCINEA. Acaulis ſubgloboſo-campanulata intus coccinea margine integro. (Sob. R.) Schaeff. fung. t. 148. Olim, Tremella coccinea.

Habitat in nemoribus inſulae lapideae et ad Goreloy cabac, ad radices et truncos arborum. Auguſto, Septembri. Строчокъ алый. Russ. Sob.

PEZIZA. Fungus ſaepe concavus, ſine capſulis aut ſeminibus nudo oculo conſpicuis.

975. PEZIZA PURPUREA. Stipitata, purpurea ſtipite coriaceo, in cyathum exterius exalbidum terminato. (Sob.) Hedwig. crypt. II. 3. p. 77. t. 22. f. A. Tremella purpurea. Linn.

Habitat in ſylvis circa fabricam pyriam Ochtenſem in ramis Belûlae deciduis. Autumno. Чашница красносиняя. Russ. Sob.

976. PEZIZA MINUTISSIMA. Stipitata, alba minutiſſima convexo - depreſſa patens, ſtipite brevi diſtincto. (Sob.) Batſch el. fung. cent. 1. p. 206. f. 143.

Habitat in umbroſis ſupra ſurculos arborum putreſcentes, in inſula apothecaria et paſſim. Autumno. Чашница малѣйшая. Russ. Sob.

977. PEZIZA HIRTA. Seſſilis hemiſphaerica extrinſecus piloſa ſpadicea, intus coccinea glabra. (Sob.) Hedwig. crypt. II. 1. p. 15. t. 3. f. B. 1 - 6.

Habitat in nemoribus umbroſis ficcioribus elatioribus et ericetis Pargelovii alibique, nec non in inſulae apothecariae locis ficcioribus poſt pluvias Auguſto et Septembri. Чашница косматая. Russ. Sob.

978. PEZIZA ACETABULUM. Gelatinoſa, cyathiformis ſeſſilis exterius angulata: venis ramoſis. (G.) Schaeff. fung. t. 150. 155. 156.

Habitat in ſylvis gramineis poſt pluvias. Autumno. Чашница жилистая. Russ. Sob.

CYATHUS. Fungus campanulatus cylindricusve capſulas lentiformes intus gerens.

979. CYATHUS LAEVIS. Campanulatus exterius villoſus intus laevis. (Sob.) Peziza lentifera. Lin. (G.) Flor. dan. t. 105.

Habitat in agris, lignis putridis, ſepimentis et areis hortorum. Aeſtate et autumno. Стаканничокъ гладкій. Russ. Sob.

980. CYATHUS STRIATUS. Campanulatus exterius hirſutus intus ſtriatus. (Sob.) Flor. dan. t. 469. f. 1.

Habitat in lignis putridis et agris, aeſtate et autumno. Стаканничокъ струйчатый. Russ. Sob.

981. CYATHUS CRUCIBULIFORMIS. Ventricoſus glaber aurens. (Sob.) Schaeff. fung. t. 179. 181.

Habitat in ſylvis et hortis, ad ligna putrida. Aeſtate et autumno. Стаканничокъ кушинистый. Russ. Sob.

982. CYATHUS CORONARIUS. Cyathiformis utrinque glaber: limbo laciniato erecto. (Sob.) Jacq. muſc. auſtr. 1. p. 140. t. 10.

Habitat in ſylvis montoſis arenoſis Oſinovae Roſchczae, Pargelovii et paſſim, poſt pluvias aeſtate et autumno. Стаканничокъ корончатый. Russ. Sob.

LYCOPERDON. Fungus: Fila ſeminifera cum thecae parietibus internis connexa.

983. LYCOPERDON PROTEUS. Pulverulentum, ſubrotundum ſubſtipitatum lacero-dehiſcens, carne alba ſeminibus atris. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 148. *a*) L. cepaeforme. t. 435. f. 2.

Habitat in pratis montoſis circa Kraſnoſelium et paſſim. Auguſto. Дожжевикъ многообразный. Russ. Sob.

984. LYCOPERDON CIRCUMSCISSUM. Pulverulentum ſubſeſſile ſubrotundum exaſperatum: parte inferiore peſiſtente circumſciſſo-lacera, polline brunneo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 186. 189. - 191.

Habitat in pratis montoſis apricis arenoſis Pargelovii et circa Caterinhoffium et paſſim. Auguſto. Дожжевикъ обрѣзный. Russ. Sob.

985. LYCOPERDON CAPITATUM. Pulverulentum, ſubgoboſum glabrum ſtipite valido incraſſato, radicibus fuſiformibus flexuoſis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 98. f. 1.

Habitat in montoſis Duderovii, et Gatczinae. Auguſto. Дожжевикъ головастый. Russ. Sob.

986. LYCOPERDON BOVISTA. Globoſum lacero-dehiſcens ſtipite validiſſimo clavato ventricoſo, carne alba, ſeminibus atris. (G.) Schaeff. fung. t. 292. 295. Boviſta five crepitus lupi, officin.

Habitat in campis, collibus et pratis paſcuis paſſim. Auguſto, Septembri et Octobri. Дожжевикъ бычачій. Russ. Sob.

987. LYCOPERDON GIGANTEUM. Ochraceo-album glabrum ſeſſile deforme globoſum, filamentis teneris denſis flavo-virentibus. (Sob.) Batſch el. fung. cent. 1. p. 237. f. 165.

Habitat in pratis montoſis Oſinovae Roſchczae. Auguſto, Septembri. Дожжевикъ великанскій. Russ. Sob.

988. LYCOPERDON MURICATUM. Seſſile pyriforme extrinſecus muricatum, ore ſubrotundo. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 97. f. 5.

Habitat in pratis montoſis ficcioribus circa Kraſnoſelium. Auguſto. Дожжевикъ шероховатый. Russ. Sob.

989 LYCOPERDON STELLATUM. Volva multifida, capitulo ſubrotundo ſeſſili; ore integro. (Sob.) Flor. dan. t. 360.

Habitat in pratis montoſis et nemoribus circa pagum Kuzmino et Sarſcoſelium, rarius. Iulio, Auguſto. Дожжевикъ звѣздочный. Russ. Sob.

990. LYCOPERDON EPIDENDRUM. Paraſiticum, cortice farinaque purpurea. (G.) Flor. dan. t. 720.

Habitat in lignis purtidis paſſim. Auguſto, Septembri. Дожжевикъ древесный. Russ. Sob.

991. LYCOPERDON NITIDULUM. Paraſiticum, luteum fragile nitens, pulvere atro arenaceo. (Sob.) Schaeff. fung. t. 192.

Habitat in ſylvis montoſis Pargelovii et alibi ad ramos arborum deciduos putreſcentes. Auguſto, Septembri et Octobri. Дожжевикъ свѣтленькій. Russ. Sob.

992. LYCOPERDON GREGARIUM. Paraſiticum, congeſtum ſphaericum, cortice fuſco nitente, pulvere aureo. (Sob.) Retz obſ. bot. 1. p. 33.

Habitat in pratis elevatis et ſilvis apricis prope pagum Dranitzi et in Oſinová Roſchcza ad ſurculos Arborum putreſcentes. Дожжевикъ стадовый. Russ. Sob.

FULIGO. Fungus cortice celluloſo - fibroſo: fibris per maſſam ſeminalem reticulatim penetrantibus.

993. FULIGO SEPTICA. Flava laciniata. (Sob.) Mucor ſepticus. Linn. Flor. dan. t. 778.

Habitat in ſylvis inter folia putrida et in vaporariis deferveſcentibus, viſibili incremento; matura ſemina explodens, minimo attactu coliabitur in pultem. Маралка гноючая. Russ. Sob.

994. FULIGO PANICEA. Minima alba ſeſſilis, panici granum referens. (Sob.) Gled. meth. fung. p. 158. n. 11. var. b.

Habitat in ſylvis humidis inſulae apothecariae et lapideae atquae in aliis locis ſimilibus inter

folia dejecta, et in ſurculis putridis. Auguſto, Septembri. Маралка просовидная. Russ. Sob.

STEMONITIS. Fungus: cortice (fugaci membranaceove) thecae rupto fila ſeminifera reticulato-compacta elaſtice ſeſe expandentia.

995. STEMONITIS TYPHINA. Capitulo elongagato, fuſco rubens ſtipite tereti aequali. (Sob.) Bulliard herb. franc.. p. 119. t. 477. f. 1.

Habitat in pratis et ſylvis humidis ad ligna putrida. Autumno. Гвоздочникъ темнокрасный. Russ. Sob.

996. STEMONITIS EMBOLUS. Stipite nigro albo-villoſo, capitulo elongato fuſco. (Sob.) Mucor Embolus Linn. (G.) Hall. enumer. ſtirp. Helv. t. 1. f. 1.

Habitat in lignis putridis aëri expoſitis. Гвоздочникъ темноголовый. Russ. Sob.

997. STEMONITIS SPHAEROCEPHALA. Stipite filiformi nigro, capitulo globoſo cinereo. (Sob.) Hoffm. Crypt. veget. 2. t. 4. f. 2.

Habitat in lignis putridis, parietibus et lapidibus. Aeſtate. Гвоздочникъ круглоголовый. Russ. Sob.

998. STEMONITIS LICHENOIDEIS. Stipite ſubulato nigro, capitulo lentiformi cinereo. (Sob.) Hoffm. Crypt. veget. 4. t. 4. f. 13.

Habitat in corticibus Pini, Oſinovae Roſchczae. Auguſto. Гвоздочникъ лишайчатый. Russ. Sob.

999. STEMONITIS FULVA. Capitulo globoſo coccineo: filis ſeminiferis fuſcis. (Sob.) Bolton fung. t. 93. f. 3.

Habitat in ſylvis humidis Oſinovae Roſhczae ad truncos arborum putridos. Гвоздочникъ желтый. Russ. Sob.

1000. STEMOMITIS VESICULOSA. Acaulis, globuloſa, ſeminibus ferrugineo-ochraceis. (Sob.) Batſch. el. fung. cent. 1. f. 171.

Habitat in ſylvis humidis ad ligna putrida et furculos deciduos. Гвоздочникъ пузыристый. Russ. Sob.

1001. STEMONITIS VITELLINA. Acaulis, ſubrotunda glabra lutea: ore fuſco. (Sob.) Iacq. muſc. auſtr. 1. p. 138. t. 5.

Habitat in truncis arborum et furculis putreſcentibus. Гвоздочникъ темноустый. Russ. Sob.

RETICULARIA. Fungus ſubrotundus: theca rigida ſeminibus inter fila reticulata diſperſis repleta.

1002. RETICULARIA, USTILAGO. Acaulis fuſco-nigricans. (Sob.) Bulliard herb. Franc. 1. p. 90. t. 472. f. 2.

Habitat in deſtructis granis Hordei, Tritici, graminumque aliorum, inque floſculis Tragopogonis, Scorzenerae, forma pulveris nigri. Сѣточница горѣлая. Russ. Sob.

AECIDIUM. Fungus: Theca (membranacea) utrinque glabra ſeminibus nudis non cohaerentibus plena.

1003. AECIDIUM TUSSILAGINIS. Caeſpitoſum, thecis ſubprominentibus flavis, ſeminibus aurantiis. (Sob.) Olim lycoperdon epiphyllum. Linn.

Habitat in dorſo foliorum tuſſilaginis aliorumque vegetabilium. Бородавочникъ листовый. Russ. Sob.

SPHAERIA. Fungus: Thecae ſubrotundis ſeminibus nudis, gelatinoſis repletae.

1004. SPHAERIA MILITARIS. Mollis pileo clavato elongato rubro, ſtipite laeviuſculo. (Sob.) Clavaria militaris. Linn. Flor. dan. t. 637.

Habitat in truncis arborum et lignis putreſcentibus Oſinovae Roſchczae. Шаровница красноголовая. Russ. Sob.

1005. SPHAERIA HYPOXYLON. Suberoſa, pileo ramoſo compreſſo. (Sob.) Clavaria hypoxylon. Linn. (G.) Bulliard. herb. Franc. t. 180.

Habitat in cellis, navibus et in ſcrobibus obſcuris nunquam ſole illuſtratis ad ligna putrida. Шаровница древесная. Russ. Sob.

TUBER. Fungus ſubgloboſus carnoſus: carne intus venis diſtincta.

1006. TUBER GULOSORUM. Globoſum ſolidum muricatum radice deſtitutum. (F.) Lycoperdon tuber. Linn. Michel. nov. nov. pl. gen. t. 102.

Habitat circa Sarſcoje ſelo, et Cojrova, in diſtrictu Oranienbaumii, ſub terra, rarius. Autumno. Eſculentus. Труфель обжорный. Russ. Sob.

MUCOR. Fungus fugax: Capitula rorida primo diaphana demum opaca; ſtipitibus ſimplicibus ramoſisve affixa.

1007. MUCOR ALBUS. Albus capitulo globoſo. (Sob.) Bulliard herb. Franc. t. 407. f. 3.

Habitat in corticibus arborum et lignis putridis. Aeſtate et autumno. Плѣсня бѣлая. Russ. Sob.

1008. MUCOR. FLAVUS. Luteus capitulo globoſo. (Sob.) Hall. hiſt. ſtirp. Helv. n. 2151.

Habitat in ſylvis humidis ad truncos arborum putridos et in pane putreſcente. Плѣсня желтая. Russ. Sob.

1009. MUCOR ARANEOSUS. Canus telam aranearum referens. (Sob.) Schranck. fl. bav. 2. p. 638. n. 1796.

Habitat in lignis putridis. Плѣсня паутинная. Russ. Sob.

1010. MUCOR MUCEDO. Stipitatus capſula globoſa. (G.) Michel. nov. pl. gen. t. 95. f. 2. 4.

Habitat in variis putridis, pane plantis etc. Плѣсня слизкая Russ. Sob.

1011. MUCOR ERYSIPHE. Albus, capitulis fuſcis ſeſſilibus. (G.)

Habitat in foliis plantarum creſcentium Humuli, Aceris, Lamii, Galeopſidis, Lithoſpermi arvenſis. Плѣсня темноголовая. Russ. Sob.

1012. MUCOR VIRENS. Thalaſſinus, capitulo globoſo. (R. Sob.) Batſch. el. fung. p. 157. n. 2.

Habitat in humidis umbroſis ad ligna putrida. Autumno. Плѣсня зеленая.

MONILIA. Fila moniliformia in capitulum congregata.

1013. MONILIA CRUSTACEA. Stipitata, ſpicis digitatis. (Sob.) Mucor cruſtaceus. Linn. (G.) Flor. dan. t. 897. f. 1.

Habitat in cibis corruptis et fructibus. Манисто, ſive ожерелье корочное. Russ. Sob.

1014. MONILIA CESPITOSA. Stipite ramoſo, ſpicis ternatis. (Sob.) Michel. nov. pl. gen. t. 91. f. 3.

Habitat in lignis, foliis, et variis putridis. Манисто дернистое. Russ. Sob.

1015. MONILIA GLAUCA. Cana villoſa, ſtipite ſetaceo brevi, capitulo globoſo. (Sob.) Mucor glaucus. Linn. (G.) Bulliard herb. Franc. t. 504. f. 10.

Habitat in lignis putridis, in Melonibus, citris, Pomis aliisque corruptis. Манисто сизое. Russ. Sob.

1016. MONILIA LEPROSA. Setacea capitulis radicalibus. (Sob.)

Habitat in cavitatibus arborum, cavernulis, et in locis obſcuris, humidis. Манисто бѣложелтое. Russ. Sob.

ADDENDA.

Poſtquam jam textus Florae hujus impreſſus fuerit, inveni menſe Majo et Iunio, hujus anni 1799, nonnullas plantulas cryptogamas, uti merulios, a nemine adhuc deſcriptos atque Agaricos, etc: quos prae feſtinatione in poſterum relinquo; at eas quas definivi hic fiſto breviter.

1017. PEZIZA CYATHOIDES.

Habitat ad ligna putrida in locis umbroſis, humidis. Чашница стаканистая. Russ. Sob.

1018. PEZIZA CILIATA.

Habitat in locis umbroſiſſimis humidis inter Urticam dioicam, ad terram et ad fruſtula ligni putridi. Чашница реснистая. Russ. Sob.

1019. ASCOPHORA FRAGILIS.

Habitat inligno putrido et in ſimeto vetuſto. Кожанка ломкая. Russ. Sob.

INDEX

Plantarum, in Elora Petropolitana enumeratarum, genericus et ſpecificus.

	pag.		pag.
Acer.	238	Agaricus.	
platanoides.	—	aqueus.	302
tataricum.	—	bulboſus.	287
Achillea.	202	campeſtris.	—
millefolium.	—	candidus.	301
ptarmica.	—	cereolus.	298
Aconitum.	125	ceſpitoſus.	304
lycoctonum.	126	cimicarius.	296
Actaea.	122	cinereus.	302
ſpicata.	—	cinnamomeus.	291
Adoxa.	93	clavus.	299
moſchatellina.	—	clypeatus.	290
Aecidium.	322	conchatus.	294
tuſſilaginis.	323	conicus.	301
Aegopodium.	74	craſſipes.	292
podagraria.	75	croceus.	290
Aethuſa.	71	cyanoxanthus.	289
cynapium.	—	degener.	293
Agaricus.	286	delicioſus.	295
abietis.	299	digitalis.	303
acerrimus.	296	dulcis.	295
adhaerens.	291	emeticus.	289
aduſtus.	300	excoriatus.	287
aggregatus.	294	faſcicularis.	292
alliaceus.	299	faſciculatus.	301
alliatus.	—	faſtigiatus.	291
amarus.	297	flabellatus.	293
androſaceus.	300	flavidus.	292

	pag.
Agaricus.	
floccoſus,	288
fragilis.	291
fumus.	299
fuſceſcens.	298
gelatinoſus.	304
Georgii.	290
glaucus.	294
glutinoſus.	290
janthinus.	298
infundibuliformis.	293
integer.	289
maculatus.	286
mammoſus.	298
mappa.	286
margaritaceus.	—
melleus.	297
muſcarius.	286
mutabilis.	288
nivoſus.	292
obeſus.	294
opacus.	297
ovatus.	302
perennis.	304
piperatus.	297
porcellaneus.	303
praealtus.	287
pratenſis.	288
radiatus.	301
rufus.	296
ſcrobiculatus.	—
ſordidulus.	302
ſtercorarius	303
ſtriatus.	291
ſulphuratus.	300
Agaricus.	
teſtaceus.	292
torminoſus.	295
umbelliferus.	300
vaillantii.	303
violaceus.	290
vireſcens.	289
virgineus.	288
zonarius.	295
Agrimonia.	111
eupatoria.	—
Agroſtemma.	106
githago.	107
Agroſtis.	16
alba.	19
arundinacea.	17
calamagroſtis.	—
canina.	18
capillaris.	—
miliacea.	17
rubra.	18
ſpica venti.	16
ſtolonifera.	18
Aira.	19
alpina.	20
aquatica.	19
caneſcens.	20
ceſpitoſa.	—
flexuoſa.	—
ſubſpicata.	19
Ajuga.	134
pyramidalis.	135
Alchemilla.	40
vulgaris.	—
Aliſma.	85

	pag.		pag.
Alismaplantago.	86	Anthemis cotula.	201
Allium.	78	pyrethrum.	—
oleraceum.	—	tinctoria.	202
schoenoprasum.	—	Anthoceros.	266
Alopecurus.	15	laevis.	267
aequalis.	16	Anthoxanthum.	8
geniculatus.	—	odoratum.	—
pratensis.	15	Anthyllis.	167
Alsine.	75	Vulneraria.	—
media.	—	Antirrhinum.	148
Alyssum.	154	cymbalaria.	149
incanum.	—	linaria.	—
Amaranthus.	224	minus.	—
blitum.	—	Aquilegia.	126
Anchusa.	46	vulgaris.	—
angustifolla.	—	Arabis.	158
officinalis.	—	thaliana.	—
tinctoria.	—	Arbutus.	97
Andromeda.	96	uva ursi.	—
calyculata.	—	Arctium.	187
polifolia.	—	lappa.	—
Androsace.	49	Arenaria.	104
maxima.	—	peploides.	—
septentrionalis.	—	rubra.	105
Anemone.	127	serpyllifolia.	—
hepatica.	—	trinervia.	—
nemorosa.	128	Artemisia.	192
pulsatilla.	—	absinthium.	193
ranunculoides.	—	campestris.	192
vernalis.	127	vulgaris.	193
Angelica.	69	Arundo.	29
Archangelica.	70	arenaria.	30
sylvestris.	—	calamagrostis.	—
Anthemis.	201	epigejos.	—
arvensis.	—	phragmites.	—

	pag.
Asarum.	110
europaeum.	—
Asperula.	34
laevigata.	—
Aspsenium.	244
trichomanoides.	—
Athamanta.	67
cervaria.	—
libanotis.	—
Atriplex.	237
patula.	—
Avena.	28
elatior.	—
fatua.	29
pratensis.	—
pubescens.	—
Betonica.	139
officinalis.	—
Betula.	221
alba.	222
alnus.	—
fruticosa.	223
nana.	222
pendula.	—
Bidens.	190
cernua.	191
minima.	190
tripartita.	—
Blasia.	265
pusilla.	—
Boletus.	306
bovinus.	307
ferrugineus.	308
fomentarius.	309
Boletus.	
globatus.	310
hirsutulus.	—
igniarius.	309
lacteus.	308
leptocephalus.	307
luteus.	—
membranaceus.	310
mutabilis.	307
nummularius.	306
obliquus.	311
papyraceus.	—
perennis.	306
ramulorum.	309
squamosus.	—
suaveolens.	310
suberosus.	309
tuberosus.	308
versicolor.	310
viscidus.	307
Brassica.	159
campestris.	—
Napus.	—
Briza.	24
media.	—
Bromus.	27
arvensis.	28
giganteus.	—
mollis.	27
secalinus.	—
squarrosus.	—
tectorum.	28
Bryum.	252
androgynum.	255
apocarpum.	254

	pag.
Bryum.	
mnioides.	253
pomiforme.	—
pulvinatum.	—
rurale.	255
ſetaceum.	254
ſquarrosum.	256
ſubulatum.	253
trunculatum.	254
viridulum.	255
Butomus.	94
umbellatus.	—
Buxbaumia.	247
aphylla.	248
Byſſus.	284
candida.	285
flos aquae.	—
fulva.	—
phoſphorea.	—
ſeptica.	284
velutina.	285
Calla.	213
paluſtris.	214
Callitriche.	1
autumnalis.	2
verna.	—
Caltha.	134
paluſtris.	—
Campanula.	58
cervicaria.	56
glomerata.	55
latifolia.	—
patula.	53
perſicifolia.	54
Campanula.	
rapunculoides.	55
rhomboidea.	54
rotundifolia.	53
Trachelium.	55
uniflora.	53
Cardamine.	155
amara.	—
pratenſis.	—
Carduus.	188
criſpus.	—
heterophyllus.	189
lanceolatus.	188
paluſtris.	—
tataricus.	189
Carex.	217
acuta.	221
arenaria.	218
caeſpitoſa.	220
dioica.	217
elongata.	219
flava.	—
globularis.	220
hirta.	221
leporina.	218
limoſa.	220
muricata.	219
panicea.	220
pulicaris.	217
uliginoſa.	218
veſicaria.	221
vulpina.	218
Carlina.	190
vulgaris.	—
Carum.	74

	pag.
Carum carvi.	74
Cantaurea.	203
Cyanus.	204
jacea.	—
phrygia.	203
Scabioſa.	204
Centunculus.	39
minimus.	40
Ceraſtium.	108
aquaticum.	109
ſemidecandrum.	108
viſcoſum.	—
vulgatum.	—
Chaerophyllum.	72
aromaticum.	—
ſylveſtre.	—
Chara.	214
vulgaris.	—
Chelidonium.	122
majus.	123
Chenopodium.	61
album.	62
glaucum.	63
hybridum.	62
maritimum.	63
polyſpermum.	—
rubrum.	61
urbicum.	—
viride.	62
Chyſanthemum.	199
inodorum.	—
Leucanthemum.	—
ſegetum.	200
Chryſoſplenium.	98
alternifolium.	99
Cichorium.	186
Intybus.	—
Cicuta.	71
viroſa.	—
Cineraria.	198
glauca.	—
ſibirica.	—
Circaea.	2
alpina.	—
lutetiana.	—
Ciſtus.	124
Helianthemum.	125
Clavaria.	312
coralloides.	313
muſcoides.	—
ophiogloſſoides.	—
piſtillaris.	312
Clinopodium.	142
vulgare.	—
Cnicus.	189
oleraceus.	—
Comarum.	121
paluſtre.	122
Conferva.	282
bulboſa.	283
canalicularis.	—
capillaris.	—
dichotoma.	284
fluviatilis.	283
fontinalis.	—
gelatinoſa.	284
glomerata.	—
reticulata.	—
rivularis.	282
Conium.	65

	pag.		pag.
Conium.		Cynosurus.	25
maculatum.	66.	caeruleus.	—
Convallaria.	79	Cypripedium.	213
bifolia.	80	calceolus.	—
majalis.	79		
multiflora.	80	Dactylis.	25
Polygonatum.	—	glomerata.	—
Convolvulus.	52	Daphne.	90
sepium.	—	mezereum.	—
Conyza.	194	Daucus.	65
squarrosa.	195	carota.	—
Coreopsis.	203	Delphinium.	125
bidens.	—	consolida.	—
Cornus.	40	Dianthus.	100
suecica.	—	deltoides.	101
Corylus.	226	plumarius.	—
avellana.	—	Draba.	153
Crataegus.	114	verna.	—
oxyacantha.	—	Drosera.	77
Crepis.	184	longifolia.	—
biennis.	185	rotundifolia.	—
tectorum.	184		
Cucubalus.	101	Echium.	48
bacciferus.	—	vulgare.	—
behen.	102	Elatine.	94
tataricus.	—	hydropiper.	—
Cuscuta.	41	Elymus.	31
europaea.	—	arenarius.	—
Cyathus.	317	caninus.	32
coronarius.	318	sibiricus.	31
crucibuliformis.	317	Empetrum.	232
laevis.	—	nigrum.	—
striatus.	—	Epilobium.	87
Cynoglossum.	47	angustifolium.	—
officinale.	—	hirsutum.	—

	pag.		pag.
Epilobium.		Euphrafia.	
montanum.	88	odontites.	145
paluſtre.	—	officinalis.	—
parviflorum.	—		
Equiſetum.	239	Feſtuca.	26
arvenſe.	240	elatior.	—
fluviatile.	—	fluitans.	—
hyemale.	241	ovina.	—
limoſum.	240	Filago.	204
paluſtre.	—	arvenſis.	205
ſylvaticum.	239	montana.	—
Erica.	90	Fontinalis.	247
vulgaris.	—	pennata.	—
Erigeron.	195	Fragaria.	119
acre.	—	veſca.	—
canadenſe.	—	Fraxinus.	238
Eriophorum.	12	excelſior.	239
polyſtachion.	14	Fuligo.	320
vaginatum.	12	panicea.	—
Ervum.	171	ſeptica.	—
hirſutum.	172	Fumaria.	165
tetraſpermum.	171	bulboſa.	—
Eryſimum.	157	officinalis.	—
barbarea.	—		
cheiranthoides.	—	Galeopſis.	138
officinale.	—	galeobdolon.	139
Evonymus.	60	ladanum.	138
europaeus.	—	tetrahit.	—
Eupatorium.	191	Galium.	35
cannabinum.	—	aparine.	38
Euphorbia.	112	boreale.	37
helioſcopia.	—	glaucum.	—
paluſtris.	—	mollugo.	—
peplus.	—	paluſtre.	35
Euphrafia.	145	ſpurium.	36

	pag.
Galium.	
trifidum.	35
uliginoſum.	36
verum.	—
Gentiana.	64
campeſtris.	—
centaurium.	—
cruciata.	65
pneumonanthe.	64
Geranium.	161
cicutarium.	—
columbinum.	163
lucidum.	—
paluſtre.	162
pratenſe.	—
robortianum.	—
rotundifolium.	163
ſylvaticum.	161
Geum.	121
rivale.	—
urbanum.	—
Glecoma.	136
hederacea.	—
Globularia.	33
vulgaris.	—
Gnaphalium.	193
alpinum.	194
dioicum.	193
ſylvaticum.	194
uliginoſum.	—
Gratiola.	7
officinalis.	—
Gypſophila.	100
muralis.	—
Helvella.	315
ceraſina.	316
coccinea.	—
mitra.	315
Heracleum.	69
anguſtifolium.	—
ſphondylium.	—
Hieracium.	181
aurantiacum.	183
auricula.	182
cymoſum.	—
dubium.	—
murorum.	183
paludoſum.	—
piloſella.	182
praemorſum.	183
ſabaudum.	184
umbellatum.	—
Hippuris.	1
vulgaris.	—
Holcus.	236
lanatus.	—
odoratus.	—
Hottonia.	50
paluſtris.	—
Humulus.	233
lupulus.	—
Hydnum.	311
candidum.	312
imbricatum.	311
paraſiticum.	—
tomentoſum.	—
Hydrocharis.	234
morſus ranae.	235
Hyoſcyamus.	58

	pag.
Hyoſcyamus.	
niger.	58
Hypericum.	177
hirſutum.	178
perforatum.	177
quadrangulum.	—
Hypnum.	256
alopecurum.	260
bryoides.	256
complanatum.	258
criſta caſtrenſis.	259
cupreſſiforme.	260
curtipendulum.	257
cuſpidatum.	261
dendroides.	257
filicinum.	259
filifolium.	256
fluitans.	258
praelongum.	259
proliferum.	—
purum.	260
riparium.	261
ſericeum.	257
ſerpens.	258
ſquarroſum.	260
taxifolium.	256
triquetrum.	258
velutinum.	261
Hypochoeris.	185
maculata.	—
radicata.	186
Impatiens.	207
noli tangere.	208
Inula.	198
dyſenterica.	—
helenium.	—
ſalicina.	199
Iris.	10
Pſeudacorus.	—
ſibirica.	—
Iſoëtes.	246
lacuſtris.	—
Iuncus.	80
articulatus.	82
bufonius.	—
bulboſus.	—
campeſtris.	—
conglomeratus.	80
effuſus.	81
filiformis.	—
piloſus.	82
ſquarroſus.	81
Iungermannia.	261
bicuſpidata.	262
bidentata.	—
ciliaris.	263
complanata.	262
dilatata.	—
epiphylla.	264
pinguis.	—
platyphylla.	263
puſilla.	—
reptans.	262
tamariſcifolia.	263
Iuniperus.	235
communis.	—

	pag.
Lamium.	137
album.	—
amplexicaule.	—
purpureum.	—
Lapſana.	186
communis.	—
Lathraea.	147
ſquamaria.	—
Lathyrus.	168
heterophyllus.	169
latifolius.	—
paluſtris.	—
pratenſis.	168
ſylveſtris.	—
Ledum.	95
paluſtre.	96
Lemna.	215
minor.	—
polyrrhiza.	—
triſulca.	—
Leontodon.	180
autumnale.	181
hiſpidum.	—
taraxacum.	—
Leonurus.	141
cardiaca.	—
Lepidium.	153
raderale.	—
Lepra.	280
antiquitatis.	281
botryoides.	282
cinerea.	281
flava.	—
incana.	—
jolitus.	—
Lepra.	
lactea.	282
rubens.	—
Lichen.	267
aphthoſus.	276
atratus.	273
atrovirens.	268
barbatus.	289
byſſoides.	268
calcareus.	269
calycaris.	274
candelarius.	270
caninus.	276
caperatus.	275
centrifugus.	271
chalybeiformis.	280
ciliaris.	273
cocciferus.	277
corallinus.	271
cornucopioides.	277
cornutus.	278
criſpus.	273
deformis.	278
deuſtus.	276
digitatus.	278
ericetorum.	268
fagineus.	270
farinaceus.	274
faſcicularis.	273
fimbricatus.	277
floridus.	279
fragilis.	—
fraxineus.	275
furfuraceus.	274
fuſco - ater.	269

	pag.
Lichen.	
glaucus.	275
gracilis.	277
hirtus.	280
islandicus.	273
jubatus.	280
juniperinus.	275
lacteus.	268
niger.	270
olivaceus.	272
palleſcens.	271
parietinus.	272
paſchalis.	279
pertuſus.	269
phyſodes.	272
plicatus.	279
prunaſtri.	275
pullus.	272
pulmonarius.	274
pyxidatus.	277
rangiferinus.	278
rugoſus.	268
rupicola.	269
ſalicinus.	270
ſanguinarius.	269
ſaxatilis.	272
ſcriptus.	267
ſtellaris.	271
ſubfuſcus.	270
ſubalatus.	271
tenuiſſimus.	274
uncialis.	278
verrucoſus.	271
Limoſella.	151
aquatica.	—
Linnaea.	150
borealis.	—
Linum.	76
catharticum.	—
Lithoſpermum.	45
arvenſe.	—
officinale.	—
Lobelia.	205
dortmanna.	—
Lolium.	30
perenne.	—
temulentum.	31
Lonicera.	56
caerulea.	—
xyloſteum.	—
Lotus.	176
corniculatus.	—
Lunaria.	155
rediviva.	—
Lychnis.	107
dioica.	108
ſios cuculi.	107
viſcaria.	—
Lycoperdon.	318
Boviſta.	319
capitatum.	318
circumſciſſum.	—
epidendrum.	319
giganteum.	—
gregarium.	320
muricatum.	319
nitidulum.	320
Proteus.	318
ſtellatum.	319

	pag.
Lycopodium.	241
annotinum.	—
clavatum.	—
complanatum.	242
ſelago.	241
Lycopſis.	48
arvenſis.	—
Lycopus.	8
europaeus.	—
Lyſimachia.	50
numularia.	51
thyrſiflora.	—
vulgaris.	—
Lythrum.	111
ſalicaria.	—
Malva.	168
criſpa.	164
rotundifolia.	—
verticillata.	—
Marchantia.	264
hemiſphaerica.	265
polymorpha.	264
umbellata.	265
Matricaria.	200
chamomilla.	—
parthenium.	—
Melampyrum.	146
nemoroſum.	—
pratenſe.	—
ſylvaticum.	147
Melica.	21
altiſſima.	—
caerulea.	—
nutans.	—
Mentha.	135
aquatica.	—
arvenſis.	136
gentilis.	—
ſylveſtris.	135
Menyanthes.	50
trifoliata.	—
Mercurialis.	234
perennis.	—
Merulius.	304
alneus.	305
betulinus.	306
cantharellus.	305
cornucopioides.	304
cyathus.	305
dimidiatus.	—
quercinus.	306
reticulatus.	305
Milium.	16
effuſum.	—
Mnium.	249
caeſpitoſum.	251
cuſpidatum.	252
fontanum.	251
heteromallum.	—
hygrometricum.	250
paluſtre.	251
pellucidum.	250
proliferum.	252
purpureum.	250
ſcoparium.	—
ſerpyllifolium.	251
undulatum.	252
Monilia.	325
caeſpitoſa.	—

	pag.
Monilia.	
cruſtacea.	—
glauca.	—
leproſa.	—
Monotropa.	95
hypopithys.	—
Montia.	32
fontana.	—
Mucor.	324
albus.	—
araneoſus.	—
eryſiphe.	—
flavus.	—
mucedo.	—
virens.	—
Myagrum.	152
paniculatum.	—
ſativum.	—
Myoſotis.	44
arvenſis.	—
lappula.	45
paluſtris.	44
Myoſorus.	77
minimus.	—
Myrica.	232
gabe.	233
Myriophyllum.	224
ſpicatum.	—
verticillatum.	—
Nardus.	13
ſtricta.	—
Nymphaea.	123
alba.	124
lutea.	—
Ophioglosſum.	242
vulgatum.	—
Ophrys.	210
cordata.	211
lilifolia.	—
monorchis.	212
Nidus avis.	210
ovata.	211
paludoſa.	212
Orchis.	208
bifolia.	—
conopſea.	210
latifolia.	209
maculata.	—
odoratiſſima.	210
Origanum.	142
vulgare.	—
Ornithogalum.	79
luteum.	—
minimum.	—
Orobanche.	151
major.	—
Orobus.	167
vernus.	168
Oſmunda.	242
lunaria.	243
ramoſa.	—
regalis.	—
Struthiopteris.	—
Oxalis.	106
acetoſella.	—
Panicum.	14
verticillatum.	—
Papaver.	123

	pag.		pag.
Papaver.		Picris.	179
Somniferum.	—	hieracioides.	—
Parietaria.	237	Pimpinella.	74
officinalis.	—	saxifraga.	—
Paris.	93	Pinus.	227
quadrifolia.	—	Abies.	—
Parnassia.	76	sylvestris.	—
palustris.	—	Plantago.	38
Pastinaca.	73	lanceolata.	39
sativa.	—	major.	38
Pedicularis.	147	maritima.	39
palustris.	148	media.	—
Sceptrum carolinum.	—	Poa.	22
Peplis.	83	angustifolia.	—
Portula.	—	annua.	23
Peucedanum.	68	aquatica.	22
officinale.	—	bulbosa.	24
Silaus.	—	compressa.	—
Peziza.	316	nemoralis.	—
Acetabulum.	317	palustris.	23
hirta.	—	pratensis.	—
minutissima.	316	trivialis.	22
purpurea.	—	Polemonium.	52
Phalaris.	13	caeruleum.	—
arundinacea.	14	Polygala.	166
Phallus.	315	amara.	—
esculentus.	—	vulgaris.	—
Phellandrium.	71	Polygonum.	91
aquaticum.	—	amphibium.	92
Phleum.	14	aviculare.	—
aranarium.	15	Bistorta.	91
nodosum.	—	Convolvulus	93
pratense.	14	Hydropiper.	92
Phlomis.	141	Persicaria.	—
tuberosa.	—	viviparum.	91

	pag.
Polypodium.	214
criſtatum.	245
Dryopteris.	246
Filix foemina.	245
Filix mas.	—
Phegopteris.	—
regium.	246
Thelypteris.	—
vulgare.	244
Polytrichum.	248
commune.	—
juniperinum.	—
piliferum.	249
undulatum.	—
Populus.	233
tremula.	234
Potamogeton.	41
criſpum.	42
gramineum.	—
lucens.	—
natans.	41
perfoliatum.	42
puſillum.	43
Potentilla.	119
Anſerina.	—
argentea.	—
norvegica.	120
reptans.	—
Primula.	49
officinalis.	—
Prunella.	144
vulgaris.	—
Prunus.	114
Padus.	—
Pteris.	244
aquilina.	—
Pulmonaria.	47
officinalis.	—
Pyrola.	97
minor.	—
rotundifolia.	—
ſecunda.	98
umbellata.	—
uniflora.	—
Pyrus.	115
Malus.	—
Quercus.	225
robur	226
Ranunculus.	130
acris.	132
aquatilis.	133
arvenſis.	—
auricomus.	131
bulboſus.	132
caſſubicus.	131
Ficaria.	130
Flammula.	—
Lingua.	—
polyanthemos.	132
repens.	—
reptans.	130
ſceleratus.	131
Raphanus.	160
Raphaniſtrum.	—
Reticularia.	322
Uſtilago.	—
Rhamnus.	59
catharticus.	—
Frangula.	—
Rhinanthus.	144
Criſta galli.	145

	pag.
Ribes.	60
alpinum.	—
nigrum.	61
rubrum.	60
Riccia.	266
cryſtallina.	—
fluitans.	—
minima.	—
Roſa.	116
canina.	117
ſpinoſiſſima.	—
Rubus.	117
articus.	118
Chamaemorus.	—
fruticoſus.	—
idaeus.	117
ſaxatilis.	118
Rumex.	83
Acetoſa.	84
Acetoſella.	85
acutus.	83
aquaticus.	84
criſpus.	83
obtuſifolius.	84
Sagina.	43
erecta.	—
procumbens.	—
Sagittaria.	225
ſagittifolia.	—
Salix.	228
alba.	232
arenaria.	230
aurita.	229
caprea.	231
cinerea.	—
fragilis.	229
fuſca.	230
hermaphroditica.	228
incubacea.	230
lanata.	—
myrtilloides.	229
pentandra.	—
purpurea.	—
roſmarinifolia.	230
triandra.	228
viminalis.	231
Saxifraga.	99
hirculus.	—
Scabioſa.	33
arvenſis.	34
Succiſa.	33
ſylvatica.	34
Scheuchzeria.	85
paluſtris.	—
Schoenus.	11
nigricans.	—
Scirpus.	11
acicularis.	12
caeſpitoſus.	11
lacuſtris.	12
paluſtris.	11
ſylvaticus.	12
Scleranthus.	99
annuus.	100
perennis.	—
Scorronera.	178
humilis.	—
Scrophularia.	150
nodoſa.	—

	pag.
Scutellaria.	144
galericulata.	—
Sedum.	105
acre.	106
Telephium.	105
Selinum.	66
paluſtre.	67
ſylveſtre.	66
Sempervivum.	113
tectorum.	—
Senecio.	196
Iacobaea.	—
paludoſus.	197
ſarracenicus.	—
vulgaris.	196
Serapias.	212
latifolia.	—
rubra.	213
Serratula.	187
arvenſis.	—
tinctoria.	—
Seſeli.	73
annuum.	—
Silene.	102
acaulis.	103
noctiflora.	102
Sinapis.	159
arvenſis.	160
Siſon.	70
inundatum.	—
Siſymbrium.	156
amphibium.	—
naſturtiuui.	—
Sophia.	157
ſylveſtre.	156
Solanum.	58
Solanum.	
dulcamara.	—
nigrum.	59
Solidago.	197
Virgaurea.	—
Sonchus.	179
arvenſis.	180
oleraceus.	—
paluſtris.	179
ſibiricus.	180
Sorbus.	115
aucuparia.	—
Sparganium.	216
erectum.	217
Spergula.	109
arvenſis.	—
laricina.	110
nodoſa.	109
Sphaeria.	323
Hypoxylon.	—
militaris.	—
Sphagnum.	247
paluſtre.	—
Spiraea.	116
Filipendula.	—
Ulmaria.	—
Splachnum.	248
ampullaceum.	—
Stachys.	139
annua.	140
arvenſis.	—
paluſtris.	—
ſylvatica.	—
Stellaria.	103
craſſifolia.	104
Dilleniana.	—

	pag.
graminea.	—
holoſtea.	103
nemorum.	—
Stemonitis.	321
Embolus.	—
fulva.	322
lichenoides.	321
ſphaerocephala.	—
typhina.	—
veſiculoſa.	322
vitellina.	—
Stratiotes.	126
aloides.	127
Subularia.	152
aquatica.	153
Symphytum.	47
officinale.	48
Tanacetum.	191
vulgare.	192
Thaelaephora.	312
meſenterica.	—
ſericea.	—
Thalictrum.	128
anguſtifolium.	129
aquilegifolium.	—
flavum.	—
Thlaſpi.	154
arvenſe.	—
Burſa paſtoris.	—
Thymus.	143
Acinos.	—
Serpyllum.	—
Tilia.	124
europaea.	—
Tormentilla.	120
erecta.	—
Tremella.	313
arborea.	314
cinnabarina.	315
granulata.	313
hemiſphaerica.	314
meſenterica.	—
Noſtoc.	—
pruniformis.	—
verrucoſa.	315
Trientalis.	86
europaea.	—
Trifolium.	172
agrarium.	175
arvenſe.	174
flexuoſum.	176
fragiferum.	175
hybredum.	173
Melilotus officin.	172
montanum.	174
pratenſe.	173
repens.	—
rubens.	—
ſpadiceum.	175
Triglochin.	85
paluſtre.	—
Triticum.	32
repens.	—
Trollius.	133
europaeus.	134
Tuber.	323
guloſorum.	—
Turritis.	158
glabra.	—
hirſuta.	159

	pag.
Tuffilago.	195
Farfara.	—
Petaſites.	196
Typha.	216
anguſtifolia.	—
latifolia.	—
Ulmus.	63
campeſtris.	—
Ulva.	282.
inteſtinalis.	—
Urtica.	223
dioica.	—
urens.	—
Utricularia.	8
vulgaris.	—
Vaccinium.	88
Myrtillus.	89
Oxycoccus.	—
uliginoſum.	—
Vitis idaea.	
Valeriana.	9
officinalis.	
Verbaſcum.	57
nigrum.	
Thaphus.	
Veronica.	3
acinifolia.	7
agreſtis.	6
Anagallis.	5
arvenſis.	6
Beccabunga.	5
Chamaedris.	—
hederaefolia.	6
longifolia.	3
maritima.	—
officinalis.	4
ſcutellata.	5
ſerpyllifolia.	4
ſpicata.	—
ſpuria.	3
triphyllos.	6
verna.	7
Viburnum.	75
Opulus.	—
Vicia.	170
Cracca.	—
monantha.	171
ſativa.	170
ſepium.	171
ſylvatica.	170
Viola.	205
arvenſis.	207
canina.	206
hirta.	—
mirabilis.	207
odorata.	206
paluſtris.	—
tricolor.	207

Addenda.

Aſcophora.	326
fragilis.	—
Peziza.	326
ciliata.	—
cyathoides.	—

РОСПИСЬ.

Россійскимъ наименованіямъ растѣній во флорѣ Санктпетербургской описанныхъ.

	No.
Авранъ.	22
Алабастренникъ.	284
Амарантъ.	622
Арженецъ.	40 — 42
Багонъ.	271
Балдырянъ.	153
Бальсамина.	567
Баранецъ.	667
Башенница.	438 439
Бедринецъ.	211
Безцлодница.	272 273
Белена.	168
Береза.	615 — 617 619
Березовикъ.	934
Бересклетъ.	173
Благодать.	22
Благородникъ.	526
Блекота.	168
Блестецъ.	38
Блошница.	536 537
Богатница.	535
Богородицына ручка.	671
Богородская трава.	399
Болиголовъ.	206
Боровикъ.	937
Боровникъ.	39
Бородавочная трава.	511
Бородавочникъ.	1003
Бородавчица.	511
Борщъ.	198 199
Боръ.	39
Боярешникъ.	323
Брань.	153
Брусника.	255
Будра.	350 283
Буквица.	146 390
Булавастикъ.	959 — 962
Булдырякъ.	26
Быльникъ.	422
Бѣлобумажникъ	951
Бѣлокопытникъ.	538
Бѣлоусъ.	37
Бѣлый грибъ.	937
Бѣлянка.	886
Бѣшеница.	204
Ваенлекъ.	563
Варварка.	433
Вахта.	147 625
Велвотъ.	268
Верба.	630 — 645
Вербейникъ.	149 — 151
Вербовникъ.	316
Веревочникъ.	30
Вереск.	257
Вересъ.	257
Веретенникъ.	872
Вероника.	6 — 21
Веселые глазки.	576
Ветла.	631 632 636 637
Виолетка.	569 — 575
Водопріятность.	651
Водопѣрица.	623 624
Водосборъ.	353
Водяная звѣздочка.	2 3
Водяная сосонка.	1
Возгрица.	963
Волкобой.	352
Волконожіе.	666 — 669
Волнушка.	884
Воловикъ.	136 — 138
Воловый языкъ.	136
Волоснецъ.	96 98
Волуекъ.	858
Волуй.	858
Волчьи бобки.	598
Волчій корень.	352
Волчій перецъ.	258
Волчья нога.	24
Волынчатка.	23

	No.
Воробейникъ.	134 135
Воронецъ.	344
Вороній глазъ.	266
Воронка.	876
Вшивая трава.	410
Вшивица.	410
Вѣтреница.	355 — 359
Гвоздичка.	285 286
Гвоздичникъ.	341
Гвоздочникъ.	995 — 1001
Гирча.	192 193
Глазница.	404 405
Глистникъ.	529
Гнилушка.	904 — 910
Гонобобель.	254
Голубецъ.	862
Голубика.	254
Голубки.	353
Горбачокъ.	949
Горецъ.	259 — 265
Горичникъ.	196 197
Горькуша.	893
Горлянка.	566 567
Горногорошникъ.	460
Гороховникъ.	461 — 465
Горчавка.	186 489
Горчица.	434 437 442
Гоптонка.	148
Гравилатъ.	341 342
Гребенникъ.	76 341 342
Грибъ.	845 1016
Груздь.	892
Грушовка.	275 — 279
Грязница.	417
Губа.	943 947 948
Губка.	944 — 946
Гулявица.	560
Гулявникъ.	431 — 433
Гусиная нога.	177 — 549
Гусиная трава.	334
Двузубецъ.	523 — 625
Девясилъ.	547 — 546
День и ночь.	655
Деревѣй.	560
Деревянка.	920
Деревянникъ.	952
Деренъ.	120
Дивала.	282 283
Дикій кресъ.	423
Дожжевикъ.	983 — 992
Донникъ.	473
Дрема.	305 — 307
Дрожалка.	963 — 970
Дубъ.	626
Дубровка.	378
Дубянка.	885
Дуплянка.	877 890 891
Душица.	398
Дымница.	455 456
Дѣтская трава.	577 582
Дягиль.	200 201
Дягильникъ.	200
Дяглица.	212
Дяшлина.	477
Едкомлечникъ.	318 — 320
Ежа.	75
Ежевика.	331
Ежова голова.	598
Ежоголовка.	598
Ежовикъ.	953 — 956
Ель.	629
Ерникъ.	646
Жабная трава.	566
Жабникъ.	363 — 373
Жабрей.	412
Жалга.	123 — 128
Желтоголовъ.	376
Желтушка.	873
Живучка.	321
Жигалокъ.	173
Жилочница.	839 — 844
Жимолость.	164 165
Жируха.	129 130
Журавлина.	256
Журавлинникъ.	444 — 451
Завязникъ.	340
Завязный корень.	340
Занозка.	77 — 79
Заяя трава.	396
Заразиха.	418
Засплиса.	362
Заячая капуста.	301
Заячьи лапы.	478
Заячникъ.	941
Звѣздочница.	292 — 296

No.

Звѣздочный мохъ. 694 — 705
Звѣробой. 485 — 487
Зеленчакъ. 860
Земляника. 335
Змѣевикъ. 531 — 534
Змѣина трава. 391
Змѣиный языкъ. 670
Золотникова трава. 215
Золотничка. 215
Золотолистникъ. 280
Золототысячникъ. 187
Золотуха. 360 — 363

Ива. 630 632 633 643
Иванъ да марья. 456
Ивановъ цвѣтъ. 550 — 552
Икотка 426
Икотная трава. 426
Илемъ. 185
Истодъ. 457 458

Кавалерскіе шпоры. 351
Калачики. 452
Калина. 213
Каменика. 332
Каменное семя. 134
Каменосѣкъ. 281
Канарейникъ. 38
Капуста. 440
Кашка. 477
Кервель. 206 207
Кипрей. 248 — 252
Кислица. 303
Кленъ. 657 658
Клоповница. 561
Клубочникъ. 101
Клюква. 256
Княжница. 333
Козелецъ. 488
Козлякъ. 938
Козьякъ. 938
Кокушкинъ ленъ. 690 — 693
Кокушкины сапожки. 590
Кокушкины слезы. 577 579
Кокушница. 577 — 581
Колдунница. 4 5
Колокольчикъ. 154 — 163
Колосница. 391 — 394
Колосокъ пахучій. 25
Колючка. 516 — 520

No.

Комышъ. 30 — 34
Конопельникъ. 526
Копытень. 315
Копѣечникъ. 403
Корнячокъ. 940
Косатикъ. 27 28
Костеръ. 80 — 85
Костяница. 332
Кошечья лапа. 531
Кошка. 317
Крапива. 384 385 620 621
Крапивная малина. 122
Красный грибъ. 939
Кресъ. 423 428 — 430
Кривошейка. 142
Кропива. 620
Крушина. 178
Куколь. 304
Купальница. 363
Курослѣпъ. 377
Курятникъ. 387 — 389
Курячья слѣпота. 385
Кушинчикъ. 347 348

Ландышъ. 224 — 227
Львиная лапа. 121
Львиноустъ. 412 — 414
Львинохвостъ. 395
Львиный хвостъ. 418
Лебеда. 179 656
Леденецъ. 484
Ленъ. 416
Ленесточница. 749 — 751
Лизимахія. 149 — 152
Линнея. 416
Липа. 349
Лисье ядро. 588 589
Лисій хвостъ. 43 — 45
Лисочка. 878 879 924 925
Лихорадочная трава. 22
Лишай. 757 819
Лобелія. 568
Лопушникъ. 513
Лоскутница. 562 — 565
Лоскутный цвѣтъ. 562
Лошаково ухо. 141
Лунная трава. 427
Лучокъ. 321
Лѣсникъ. 849

	No.
Лѣщина.	927
Лягушникъ.	651
Макъ.	346
Малина.	330
Мансто.	1013 1016
Манная трава.	79
Маралка.	993 994
Марїинъ башмачокъ.	590
Масленникъ.	936
Мать да мачиха.	538
Материнка	398
Маточная трава.	533
Маточница.	533
Маунъ.	29
Медвежьи ягоды.	274
Медуница.	140
Метелка.	65 — 73
Младенчица.	582 — 587
Млекоссѣдъ.	110
Могущикъ.	336 — 339
Можжевельникъ.	652
Можжуха.	652
Мокрица.	214
Мокричникъ.	100
Молодило.	302
Молоточникъ.	56 — 61
Молочай.	490 — 493
Молочникъ.	856
Морковъ.	190
Морошка.	334
Мохъ.	586 688 689
Мохнатикъ.	936
Мудрость лѣкарская.	433
Мускатница.	267
Мухоморъ.	845 — 848
Мышачїй огонь.	841
Мышье ушко.	131 — 133 497
Мышїй горохъ.	466 — 470
Мышїй хвостъ.	219
Мѣсячникъ.	427
Мѣшечница.	828
Мята.	379 — 382
Мятлика.	65 — 73
Наростень.	921
Нитчанка.	829 — 838
Норычникъ	415
Обабокъ.	942
Обвивальница.	152
Овесъ.	86 — 89
Овсецъ.	80 — 85
Огнецвѣтникъ.	406 — 408
Одуванчикъ.	494 — 496
Ожерелье.	1013
Ольха.	618
Ольшанка.	865
Омегъ.	191
Опенка.	863 867 870 874 894 898
Опенковый колпачокъ.	869
Опенокъ.	854 866 899 901 — 903
Орлиное крыло.	676
Орлякъ.	675
Орѣшникъ.	627
Осетъ.	521
Осина.	649
Осока.	599 — 614
Осотъ.	521
Отдышкая трава.	102 — 104
Очная помощь.	404
Павлинные очки.	353
Папоротникъ.	675 677 — 674
Пасленъ.	179 170
Пастернакъ.	209
Пастушья сумка.	425
Пахучка.	647
Пепельникъ.	545 546
Первоцвѣтъ.	146
Перловникъ.	62 — 64
Пестикъ.	259
Пестрецъ.	956
Петровъ крестъ.	409
Петрушечникъ.	202
Печерица.	852 853
Пижма	527
Плакунъ.	316
Плаунъ.	666
Плевелъ.	94 95
Плѣсня.	1007 — 1012
Плѣснякъ.	871
Повилица.	122 153
Повиличные колокольчики.	152
Поганка.	850 851 861 911 — 919
Подбѣлъ.	539

	No.
Подгруздень.	888
Подлепесточница.	752
Подлѣсникъ.	316
Подмаренникъ.	106 114
Подорожникъ.	115 — 118
Подорѣшникъ.	855
Подосиновикъ.	939
Полевица.	47 — 55
Полусухлянка.	933
Полушильница.	685
Полынь.	529
Полѣска.	650
Попово гуменцо.	494
Попутникъ. 115 — 118	245
Поростъ.	757
Порѣзъ.	194 195
Порѣзная трава.	194
Посошокъ.	396
Постельница.	397
Почечуйникъ.	263
Придорожная иголка.	171
Проказа.	820 — 827
Просвирки.	452
Просвирничка.	452 — 454
Просо.	39 46
Прострѣлъ.	357
Просянникъ.	653 654
Птичье гнѣздо.	582
Пшичье млеко	222 223
Пузырникъ.	287 — 289
Пупавка.	555 — 558
Пупыричникъ.	957 958
Путникъ.	859 868
Пуховникъ.	522
Пушица.	35 36
Пчелососка.	384 — 386
Пшеница.	99
Пырей.	99 698
Пѣтушьи головки.	388
Пѣтушій гребень.	403
Пѣтушокъ.	28
Пѣщанка.	297 — 300
Пьяница.	254
Пятилистникъ.	337 — 343
Ракушникъ.	880
Рдестъ.	123 — 128
Ребина.	324
Редька.	443
Репейникъ.	513
Репешникъ.	317
Репникъ.	317
Решетница.	753 — 755
Роговикъ.	308 — 311
Рогоза.	596 597
Ромашка.	554 556
Роса каменная.	676
Росникъ.	121
Рукосвѣчникъ.	592
Румянка.	143
Рыжикъ.	883 887
Рѣзь.	419
Рѣзуха.	419 420
Рѣпа.	441
Рябина.	324
Рябинка.	527
Ряска.	593 — 595
Сабельникъ. 27 28	343
Сальный корень.	141
Сальница.	141
Соломонова печать.	225
Свербѣжница.	102 — 104
Свинушка.	882 891
Свирѣпка.	434 — 436
Сердечная трава,	395
Серебренникъ.	337
Серпуха.	514 515
Сизякъ.	881
Синякъ.	859
Ситникъ.	228 — 236
Ситница.	244
Скипетръ каролинскій.	411
Скрипица.	889
Скрипуха.	507 508
Сладка и горька.	169
Смолевка.	306
Смолянка.	290 291
Смородина.	174 — 176
Сморчокъ.	971
Снить.	212
Собачья голова.	415
Собачія петрушка.	205
Собачій хвостъ.	76
Собачій языкъ.	139
Собачникъ.	139
Сокольникъ.	497 — 506
Солнечная роса.	217 218

	No.
Сольникъ.	459
Солянка.	875
Сосна.	628
Сотенникъ.	119
Спорышъ.	237 264
Стаканничокъ.	979 — 982
Старина.	540 — 543
Стародубка.	186 — 189
Строчокъ.	972 — 974
Стрѣла.	625
Студенецъ.	922
Стѣнная трава.	655
Сусакъ.	269
Сухарь.	923
Сухлянка.	931 — 932
Сучковый мохъ.	717 — 737
Сыроѣжка.	857 864
Сѣточница.	1002
Таволга.	326 327
Тальникъ.	637 — 639
Твердочашечница.	144 145
Тимїянъ.	399 400
Тимонъ.	210
Толокнянка.	274
Торица.	312 — 114 426
Травянка.	285 286
Тривострица.	245
Трилистникъ.	147 355 473 483
Троечный цвѣтъ.	574
Троечница.	247.
Тростникъ.	90 — 93
Трутъ.	945
Трутовица.	926 — 930
Труфель.	1006
Трясучка.	74
Тѣлорѣзъ большой.	354
Тѣнный мохъ.	738 — 748
Уединенница.	270
Ужовникъ.	488
Узловый мохъ.	706 — 716
Укропъ.	203
Хасимъ.	494
Хвощъ.	660 — 665
Хлѣбница.	591
Хмѣль.	473 482 648
Христофорова трава.	344
Царапница.	114
Царица луговъ.	327
Царскій скипетръ.	166 167
Цвѣторогъ.	756
Цихорій.	512
Частуха.	246
Чашница.	975 — 978
Черемха.	322
Черника.	253
Черница.	253
Чернобыльникъ.	523 530
Черноголовъ.	402
Чернушка.	923
Чертополохъ.	562
Чеснокъ.	220 321
Чесночникъ.	900
Чечевица.	471 472
Чистецъ.	208
Чистотѣлъ.	345
Чистоустъ.	671 — 674
Чистякъ.	28 345 366
Чихотная трава.	559
Чумный корень.	539
Шампинїонъ.	852
Шерошница.	105
Шильница.	421
Шиповникъ.	328 329
Щевель.	238 — 243
Щетинница.	37
Щитовка.	401
Яблонь.	325
Ягадки.	258
Ядрушки.	577
Язвенникъ.	459
Яички.	577
Ярутка.	424
Ясенъ.	656
Ясень.	659
Ястребка.	509 510
Ястребная трава.	509

EMENDANDA.

pag.	num.	lin.	
III		1	fecere, lege facere.
—		4	poſt Murrayo pige,
IV			ultima floris, lege Floris.
1			ultima, hermaphroditu, lege hermaphroditus.
3	6	4	poſt villoſis pinge).
4	10	6	poſt veronica pinge,
5	12	5	poſt Beccabunga pinge,
		8	vbique lege ubique.
	13	4	poſt ſucculenta pinge.
6	17	5	deleatur et.
9		10	lin ea, lege linea et vngvibus, lege ungvibus.
11	30	6	poſt five deleatur punctum.
14		2	vnicum. et lin. ultima praemorſa, lege praemorſae.
16	44	3	poſt Ochroleucis pinge.)
	45		poſt aequalibus pinge punctum.
	47	2	patula deleatur. et
		4	poſt bifida Sob. pinge (Sob.)
36		4	canadenſis, lege canadenſis.
38	115	6	viat, lege vias.
42	127		ſtipuia, lege ſtipula.
49	146	1	poſt Primula adde veris. et
		2	veris deleatur.
50		4	Menvanthes, lege Menyanthes.
—	147		Menvanthes, lege Menyanthes.
—	—	—	antepenultima Lvſimachia, lege Lyſimachia.
51	150		Thvrſiflora, lege Thyrſiflora.
—	—	—	метелкоцветный, lege метелкоцвѣтный.

pag.	num.	lin.	
63		7	ante Foliis pinge **
74	210	6	poſt carvi pinge,
78			in titulo Tetragynia, lege polygynia.
79	224	5	poſt convallium pinge.
80	225	4	poſt Salomonis pinge,.
—	227	3	poſt Bifolium pinge,.
84		3	poſt acutum pinge,.
—	241	5	poſt aquaticum pinge,.
—	242	5	poſt Acetoſa pinge,.
85		15	calyci formia, lege calyci-formia.
89	258	7	poſt Myrtillus pinge,.
—	255	4	poſt idaea pinge,.
90	257	6	poſt Erica pinge,.
93	266	4	poſt Paris pinge,.
96	273		ultima loco ſ. lege f.
97	274	6	poſt Urſi pinge,.
—	275	3	pyrola, lege Pyrola. et
		4	poſt pyrola pinge,.
101	287	5	ex ſucca, lege exſucca.
109		1	роговикъ, lege Роговикъ.
—	311	12	роговикъ, lege Роговикъ.
—	312	6	торица, lege Торица.
110		3	торица, lege Торица.
112		4	репникъ, lege Репникъ.
118			ultima officio, lege officin.
124	347	7	кушинчикъ, lege Кушинчикъ.
135	378	7	poſt Bugula pinge,
136	383	6	*y* lege *ɣ*.
139	380	4	quatuordecim-flori, lege quatuordecimflori.
140	392	4	purpuroſcentibus, lege purpuraſcentibus.
148	411	1	Corolinnm, lege Carolinum.
163	451	3	ſemiquinquepartitis, lege ſemiquinque-partitis.
164	452	11	Присвирнячка, lege Просвирничка

pag.	num.	lin.	
—	453	3	ſeſſilibus, lege ſeſſilibus.
169	464	5	Habit, Habitat.
201		7	nnllus, lege nullus.
207	574	3	denticnlo, lege denticulo.
208		14	Diginia, lege Diandria.
240	662	2	poſt frondibus dele punctum.
—	—	—	poſt ſimplicibus pinge punctum.
250	697	3	poſt cylindricis pinge,.
265	752	6	Ппдлепесточница, lege Подлепесточница.
279	815	2	t. 1., lege t. 11.
283	833	1	Bulboſa, lege Bulloſa.
284		4	loco 235, lege 835.
—	836	1	poſt filamentis dele punctum.
—			penultima loco 889, lege 839.
287		1	montnſis, lege montoſis.
332		2	Carum carvi, lege Carvi.
337			Lepidium raderale, lege Lepidium ruderale.
—			Lichen ſimbricatus, lege Lichen ſimbriatus.
340			Myrica Gabe, lege Myrica Gale.
347			Водяная сосойка, lege Водяная сосонка.
348			poſt голубки, lege Гонобобель.
352			Ягадки, lege Ягóдки.

New York Botanical Garden Library
QK 321.3 .S6
Sobolewski, Gregor/Flora Petropolitana.
gen
3 5185 00109 4661